
Höhere Analysis II

Wintersemester 2018/2019

Prof. Dr. D. Lenz

Blatt 1

Abgabe Donnerstag 25.10.2018

(1) Sei E ein Banachraum und $S : E \rightarrow E$ ein beschränkter linearer Operator. Zeigen Sie:

(a) Konvergiert $(\sum_{k=0}^n S^k)_n$ in der Operatornorm, so ist $\text{id} - S$ invertierbar und es gilt

$$(\text{id} - S)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} S^k.$$

(b) Ein hinreichendes Kriterium für die Konvergenz der Reihe ist

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|S^n\|^{1/n} < 1.$$

(2) Sei $g \in C([0, 1])$. Zeigen Sie, dass es genau ein $f_g \in C([0, 1])$ gibt, sodass

$$f(s) - \int_0^1 2stf(t)dt = g(s)$$

für alle $s \in [0, 1]$ gilt. Zeigen Sie, dass die Abbildung $g \mapsto f_g$ stetig bzgl. $\|\cdot\|_{\infty}$ ist. Berechnen Sie f_g für $g = \sin(\pi \cdot)$.

(3) Es sei der Volterra-Integraloperator $T : C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ gegeben durch

$$Tf(s) = \int_0^s f(t)dt, \quad s \in [0, 1].$$

Bestimmen Sie den Spektralradius und das Spektrum von T und Zeigen Sie, daß 0 kein Eigenwert von T ist.

(4) Sei E ein Banachraum und $A, B : E \rightarrow E$ beschränkte lineare Operatoren. Zeigen Sie $\sigma(AB) \setminus \{0\} = \sigma(BA) \setminus \{0\}$.

Hinweis: Drücken Sie zunächst für $|\lambda| > \|A\|\|B\|$ die Resolvente $(\lambda - BA)^{-1}$ durch $(\lambda - AB)^{-1}$ aus (verwenden Sie Aufgabe 1). Zeigen Sie dann, dass dieser Ausdruck für alle $\lambda \in \rho(AB) \setminus \{0\}$ ein Inverses von $\lambda - BA$ liefert.