

# Analysis I und II - Notizen<sup>1</sup>

Daniel Lenz

---

<sup>1</sup>Es handelt sich nicht um ein Skriptum zur Vorlesung. Besten Dank an alle, die zu Verbesserungen der Notizen zur Analysis I beigetragen haben, und besonderen Dank an Daniel Kilian, Stefan Neumann und Frank Nußbaum für systematisches Durcharbeiten und Verschönern



## Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung: Zwei kleine Rechnungen	5
Eine Rechnung	5
Eine andere Rechnung	5
Folgerung	5
Grundlagen	6
1. Mengen	6
2. Funktionen	7
3. Relationen	8
4. Verknüpfungen	8
Kapitel 1. Die natürlichen Zahlen	9
Kapitel 2. Die reellen Zahlen	18
1. Die Körperstruktur	18
2. Die Ordnungsstruktur	22
3. Ordnungsvollständigkeit	26
4. Die Charakterisierung	27
Kapitel 3. Archimedisches Axiom und Intervallschachtelungsprinzip	32
1. Das Archimedische Axiom	32
2. Intervallschachtelungsprinzip	34
3. Eine Äquivalenz	35
Kapitel 4. Konvergenz von Folgen in $\mathbb{R}$	37
1. Definitionen und Rechenregeln	37
2. Aspekte der Vollständigkeit	44
3. Teilfolgen und Häufungspunkte	51
Kapitel 5. Mächtigkeit	54
Kapitel 6. Die komplexen Zahlen	57
Kapitel 7. Summen und Reihen	61
Kapitel 8. Stetigkeit und Grenzwerte von Funktionen	74
Kapitel 9. Funktionen auf Intervallen	85
Kapitel 10. Differenzierbare Funktionen	92
1. Definition und grundlegende Eigenschaften von Differenzierbarkeit in einem Punkt.	92

2.	Differenzierbare Funktionen auf Intervallen	100
3.	Taylorscher Satz und L'Hospital'sche Regel	106
Kapitel 11.	Das Riemann Integral in einer Dimension	116
1.	Grundlegendes zu Riemann Integration	117
2.	Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung	124
3.	Partialbruchzerlegung und Integration rationaler Funktionen	135
4.	Uneigentliche Integrale	138
Kapitel 12.	Die Exponentialfunktion und ihre Verwandten	141
Kapitel 13.	Metrische Räume und topologische Grundbegriffe	150
1.	Metrische Räume	150
2.	Etwas Topologie metrischer Räume	159
3.	Konvergenz und Stetigkeit	163
4.	Kompaktheit	167
5.	Zusammenhang	174
6.	Anwendungen - Der Banachsche Fixpunktsatz	176
Kapitel 14.	Differenzierbarkeit im Höherdimensionalen	180
1.	Zum Aufwärmen: Stetigkeit von Funktionen von $\mathbb{R}^N$ nach $\mathbb{R}^M$	180
2.	Definition der Ableitung und einfache Eigenschaften	181
3.	Höhere Ableitungen und der Satz von Taylor	192
4.	Extrema von Funktionen	197
Kapitel 15.	Implizite Funktionen und lokale Invertierbarkeit	201
Kapitel 16.	Untermannigfaltigkeiten, bedingte Extrema und all das	210
Kapitel 17.	Etwas Integrationstheorie	216
	Probleme des Riemann-Integrals	216
1.	Prämaße	217
2.	Integrale von Elementarfunktionen	219
3.	Integrale	219
4.	Die großen Sätze	219

## **Vorbemerkung: Zwei kleine Rechnungen**

### **Eine Rechnung**

Der Kurs wird mit 9 Leistungspunkten (LP) gewertet. Jeder Leistungspunkt entspricht 30h Arbeit. Damit geht es um

270h Arbeit

Davon gehen ab:

–90h (6 h Vorlesung und Übung in 15 Wochen)

–80h (2 Wochen Prüfungsvorbereitung à 40 h).

Damit verbleiben noch 100 h Arbeit. Auf 15 Wochen verteilt bedeutet dies ca.

7 h Arbeit/ Woche

also

1 h Arbeit / Tag.

### **Eine andere Rechnung**

Der Stoff der ersten drei Semester wurde beginnend mit Newton und Leibniz um 1670 bis etwa 1920 entwickelt. Es handelt sich also um

250 Jahre Entwicklung.

Bei 45 Wochen für die ersten drei Semester, wird also in einer Woche Vorlesung etwa

5 Jahre Entwicklung ~ 260 Wochen

behandelt.

### **Folgerung**

Es muß gearbeitet werden!

# Grundlagen

Wir setzen Grundtatsachen der Mengenlehre voraus und erinnern in diesem Kapitel an einige Begriffe und Bezeichnungen.

## 1. Mengen

Seien  $X$  und  $Y$  Mengen. Dann bedeutet  $Y \subset X$  (lies:  $Y$  Teilmenge von  $X$ ), daß jedes Element von  $Y$  auch zu  $X$  gehört. Es bezeichnet  $X \setminus Y$  (lies:  $X$  ohne  $Y$ ) die Menge der Elemente von  $X$ , die nicht zu  $Y$  gehören. Der Durchschnitt  $X \cap Y$  der Mengen  $X$  und  $Y$  ist gegeben durch

$$X \cap Y := \{z : z \in X \text{ und } z \in Y\}.$$

Die Vereinigung der Mengen  $X$  und  $Y$  ist gegeben durch

$$X \cup Y := \{z : z \in X \text{ oder } z \in Y\}.$$

Die Potenzmenge  $\mathcal{P}(X)$  einer Menge  $X$  ist die Menge aller Teilmengen von  $X$ . Die leere Menge wird mit  $\emptyset$  bezeichnet.

Ist  $A$  eine Menge und zu jedem  $\alpha \in A$  eine Menge  $X_\alpha$  gegeben, so nennt man  $X_\alpha, \alpha \in A$ , eine Familie von Mengen. Für eine Familie  $X_\alpha, \alpha \in A$ , von Mengen definiert man

$$\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha := \{z : z \text{ gehört zu (mindestens) einer der Mengen } X_\alpha\}$$

sowie

$$\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha := \{z : z \text{ gehört zu allen Mengen } X_\alpha\}.$$

Ist  $X_\alpha, \alpha \in A$ , eine Familie von Mengen und  $X$  eine Menge, so gilt (siehe Übung)

$$X \setminus \bigcup_{\alpha} X_\alpha = \bigcap_{\alpha} X \setminus X_\alpha$$

$$X \setminus \bigcap_{\alpha} X_\alpha = \bigcup_{\alpha} X \setminus X_\alpha.$$

Aus zwei Objekten  $a, b$  bilden wir das geordnete Paar  $(a, b)$ . Damit können wir aus zwei Mengen  $X, Y$  das kartesische Produkt

$$X \times Y : \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$$

bilden.

## 2. Funktionen

Eine Abbildung oder Funktion  $f$  von einer Menge  $X$  in die Menge  $Y$  ist eine Zuordnung, die jedem Element von  $X$  genau ein Element von  $Y$  zuordnet. Wir schreiben

$$f : X \longrightarrow Y \text{ oder } X \longrightarrow Y, x \mapsto f(x).$$

Es heißt dann  $X$  der Definitionsbereich von  $f$ ,  $Y$  der Wertebereich von  $f$  und  $\text{Bild}(f) := \{f(x) : x \in X\} \subset Y$  das Bild von  $f$ . Ist  $f : X \longrightarrow Y$  eine Funktion und  $A \subset Y$ , so heißt

$$f^{-1}(A) := \{x \in X : f(x) \in A\}$$

das Urbild von  $A$  unter  $f$ .

**Beispiel.** Sei  $X$  eine beliebige Menge. Dann ist  $\text{id}_X : X \longrightarrow X$  die Abbildung, die  $x \in X$  auf  $x \in X$  abbildet. Etwa:  $X = \{1, 2, 3\} \longrightarrow \{1, 2, 3\}, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3$ .

Die Komposition  $g \circ f$  der Abbildungen  $f : X \longrightarrow Y, g : Y \longrightarrow Z$  ist gegeben durch

$$g \circ f : X \longrightarrow Z, x \mapsto g(f(x)).$$

Komposition ist assoziativ d.h. es gilt

$$g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h.$$

(Denn  $g \circ (f \circ h)(x) = g((f \circ h)(x)) = g((f(h(x)))) = (g \circ f)(h(x)) = (g \circ f) \circ h(x)$ .) Damit können wir also die Klammern weglassen.

Eine Abbildung  $f : X \longrightarrow Y$  heißt surjektiv, wenn zu jedem  $y \in Y$  ein  $x \in X$  existiert mit  $y = f(x)$  (d.h.  $\text{Bild}(f) = Y$ ).

Eine Abbildung  $f : X \longrightarrow Y$  heißt injektiv, wenn aus  $x \neq z$  folgt  $f(x) \neq f(z)$ .

Ist  $f : X \longrightarrow Y$  injektiv und surjektiv, so heißt es bijektiv.

**Behauptung.** Sei  $f : X \longrightarrow Y$  gegeben. Dann sind äquivalent:

- (i)  $f$  bijektiv.
- (ii) Es gibt ein  $g : Y \longrightarrow X$  mit  $f \circ g = \text{id}_Y$  und  $g \circ f = \text{id}_X$ .

In diesem Fall, ist die Funktion  $g$  aus (ii) eindeutig bestimmt. Beweis. (Übung)

Die Funktion  $g$  wird Umkehrfunktion von  $f$  genannt und (oft) mit  $f^{-1}$  bezeichnet.

Schließlich brauchen wir manchmal noch Einschränkungen von Funktionen: Sei  $f : X \longrightarrow Y$  gegeben und  $A$  eine Teilmenge von  $X$ . Dann bezeichnen wir mit  $f_A$  oder  $f|_A$  die Einschränkung von  $f$  auf  $A$  gegeben durch

$$f|_A : A \longrightarrow Y, x \mapsto f(x).$$

### 3. Relationen

Eine Relation auf eine Menge  $X$  ist eine Teilmenge  $R$  von  $X \times X$ . Statt  $(x, y) \in R$  schreibt man oft auch  $x \overset{R}{\sim} y$  oder  $x \sim y$ .

Eine Relation auf  $X$  heißt

- reflexiv, wenn gilt:  $x \sim x$  für alle  $x \in X$ , (Zeichnung)
- symmetrisch, wenn gilt:  $x \sim y \implies y \sim x$ , (Zeichnung)
- transitiv, wenn gilt:  $x \sim y$  und  $y \sim z \implies x \sim z$ . (Zeichnung in Übung)

Eine Äquivalenzrelation ist eine reflexive, symmetrische, transitive Relation.

**Beispiel.**  $X =$  Bewohner von Jena und

$$R = \{(x, y) : x \text{ und } y \text{ haben am selben Tag Geburtstag}\}.$$

Eine Ordnungsrelation oder Ordnung auf einer Menge  $X$  ist eine Relation  $\leq$ , die reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist. Dabei heißt antisymmetrisch, daß

$$x \leq y \text{ und } y \leq x \implies x = y.$$

Ist  $\leq$  eine Ordnungsrelation auf  $X$ , so heißt das Paar  $(X, \leq)$  eine geordnete Menge. Eine geordnete Menge heißt total geordnet, wenn für alle  $x, y \in X$  immer  $x \leq y$  oder  $y \leq x$  gilt.

'Beispiele'.  $(\mathbb{N}, \leq)$ ,  $(\mathbb{Z}, \leq)$ ,  $(\mathbb{Q}, \leq)$ ,  $(\mathbb{R}, \leq)$

### 4. Verknüpfungen

Eine Abbildung  $* : X \times X \longrightarrow X$  heißt Verknüpfung auf  $X$ . Man schreibt oft  $x * y$  statt  $*(x, y)$ . Die Verknüpfung  $* : X \times X \longrightarrow X$  heißt

- kommutativ, wenn gilt  $x * y = y * x$  für alle  $x, y \in X$
- assoziativ, wenn gilt  $x * (x * z) = (x * y) * z$  für alle  $x, y, z \in X$ .

Ist die Verknüpfung assoziativ, so kann man die Klammern auch weglassen.



## KAPITEL 1

### Die natürlichen Zahlen

In diesem Kapitel lernen wir einen axiomatischen Zugang zu den natürlichen Zahlen kennen. Dieser Zugang liefert das Prinzip der vollständigen Induktion und die Möglichkeit der rekursiven Definition. Das werden wir genauer studieren. Der Zugang erlaubt es ebenfalls, die üblichen Rechenregeln und Eigenschaften zu beweisen. Das werden wir nicht verfolgen, da wir diese im folgenden Kapitel als Nebenprodukt einfach erhalten.

Die charakteristische Struktur der natürlichen Zahlen ist folgende:

**Zeichnung.**  $1 \overset{+1}{- - -} > 2 \overset{+1}{- - -} > 3 \overset{+1}{- - -} > 4 \overset{+1}{- - -} > \dots$

Das Problem sind die Punkte '...!' An der Zeichnung lesen wir ab:

- Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger und verschiedene Zahlen haben verschiedene Nachfolger.
- Beginnt man bei 1 und bildet sukzessive die Nachfolger, so erhält man alle natürlichen Zahlen.
- Die Zahl 1 ist keine Nachfolger.

Eine präzise Fassung dieser Eigenschaften liefern die **Peano Axiome**.

**DEFINITION.** (*Peano Axiome*) Ein Tripel  $(N, e, \nu)$  bestehend aus einer Menge  $N$  zusammen mit einem ausgezeichneten Element  $e$  und einer Abbildung  $\nu : N \rightarrow N \setminus \{e\}$  genügt den Peanoaxiomen, wenn gilt:

(P1)  $\nu : N \rightarrow N \setminus \{e\}$  ist injektiv.

(P2) (*Induktionsaxiom*) Enthält eine Teilmenge  $M$  von  $N$  das Element  $e$  und enthält sie mit jedem Element  $n$  immer auch  $\nu(n)$ , so gilt  $M = N$ .

Es heißt  $\nu$  die Nachfolgeabbildung und  $\nu(n)$  der Nachfolger von  $n$ .

**Weiteres Vorgehen:** Die Peano Axiome charakterisieren die natürlichen Zahlen in folgendem Sinne: Man kann beweisen, daß es ein System gibt, daß diesen Axiomen genügt (wenn man Existenz einer unendlichen Menge voraussetzt), und daß ein solches System eindeutig bestimmt ist (bis auf Umbenennung). Dieses System werden wir später mit  $\mathbb{N}$  bezeichnen. Wir werden die Eindeutigkeit eines solchen Systemes bald beweisen und die Rechenoperationen im nächsten Kapitel einführen.

**Bemerkung.** (a) Eine Teilmenge  $M$  von  $N$  mit  $e \in M$  und  $\nu(n) \in M$  für alle  $n \in M$  wird auch induktiv genannt.

(b) Hinter (P1) verbergen sich mehrere Forderungen, insbesondere folgende:

- $\nu$  bildet von  $N$  nach  $N \setminus \{e\}$  ab.
- $\nu$  ist injektiv.
- Es ist  $e$  kein Nachfolger.

Diese Forderungen zusammen mit (P2) werden liefern, daß

- $\nu : N \longrightarrow N \setminus \{e\}$  sogar bijektiv ist (s.u.).

Die vorangegangenen vier Spiegelstriche werden manchmal als eigene Axiome aufgelistet.

(c) Das Induktionsaxiom liefert eine Art mit '...' umzugehen.

(d) In den Peano Axiomen ist die Forderung, daß  $e$  kein Nachfolger ist, wesentlich. Sie garantiert, daß die Menge unendlich viele Elemente hat. Man kann eine endliche Menge  $N$  angeben mit ausgezeichnetem Element  $e$  und einer injektiven Abbildung  $\nu : N \longrightarrow N$ , so daß (P1) und (P2) gelten (Übung).

**FOLGERUNG.** *Es genüge  $(N, e, \nu)$  den Peano Axiomen. Dann ist die Abbildung  $\nu : N \longrightarrow N \setminus \{e\}$  bijektiv (d.h.  $e$  ist kein Nachfolger und jedes andere Element von  $\mathbb{N}$  ist ein Nachfolger) und es gilt  $\nu(n) \neq n$  für alle  $n \in N$ .*

*Beweis.* *Bijektivität.* Es reicht zu zeigen, daß  $\nu$  surjektiv ist.

Sei

$$M := \{e\} \cup \{n \in N : n \text{ ist ein Nachfolger d.h. es existiert } m \in N \text{ mit } \nu(m) = n\}.$$

Dann gilt also:

$$e \in M.$$

$$n \in M \text{ impliziert } \nu(n) \in M \text{ (da jeder Nachfolger in } M \text{ ist).}$$

Aus (P2) folgt also  $M = N$ .

*Es gilt  $\nu(n) \neq n$  für alle  $n \in N$ :* Sei  $T$  die Menge der  $n \in N$  mit  $\nu(n) \neq n$ . Dann gilt  $e \in T$  (klar) und aufgrund der Injektivität von  $\nu$  gilt auch, dass  $n \in T$  impliziert  $\nu(n) \in T$ . Damit ist  $T$  induktiv.  $\square$

---

Ende der 1. Vorlesung

Wir kommen nun zu einer wesentlichen Konsequenz aus den Peanoaxiomen. Diese ist das Prinzip der vollständigen Induktion.

**Prinzip der vollständigen Induktion.** Sei  $(N, e, \nu)$  induktiv. Sei für jedes  $n \in N$  eine Aussage  $A(n)$  gegeben, sodaß gilt:

- $A(1)$  ist wahr. (Induktionsanfang)
- Aus  $A(n)$  folgt  $A(n+1)$ . (Induktionsschluss)

Dann ist  $A(n)$  wahr für alle  $n \in N$ .

*Beweis.* Sei  $T$  die Menge der  $n \in N$ , so daß  $A(n)$  wahr ist. Dann folgt aus dem Induktionsaxiom und der Voraussetzung, daß  $T = N$ . Das ist gerade die Aussage.  $\square$

**Notation.** Statt 'A(1) wahr' und 'Aus A(n) folgt A(n + 1)' schreibt man meist 'n = 1' und 'n  $\implies$  n + 1'.

**'Beispiel.'** Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen  $S_n := \sum_{k=1}^n k$  ist gerade  $n(n + 1)/2$ .

Bew. n = 1: klar

$$n \implies n + 1: S_{n+1} = (n+1) + S_n = (n+1) + (n+1)n\frac{1}{2} = (n+1)(1+n\frac{1}{2}) = (n+1)(2+n)\frac{1}{2}.$$

Eine weitere wesentliche Konsequenz der Peano Axiome ist die Möglichkeit der rekursiven Definition. Um das auszuführen, bedarf es einiger Vorbereitungen. Dabei werden wir einige Folgerungen aus den Peano Axiomen ziehen, die auch schon für sich von Interesse sind.

**FOLGERUNG.** (Menge der Zahlen, die größer als n sind) Es genüge  $(N, e, \nu)$  den Peanoaxiomen. Dann gibt es zu jedem  $n \in N$  eine eindeutige Menge  $M_n \subset N$  mit

- (1)  $n \notin M_n$
- (2)  $\nu(n) \in M_n$
- (3) Ist  $k \in M_n$  so auch  $\nu(k)$ .

Diese Mengen  $M_n$  erfüllen  $M_e = N \setminus \{e\}$  und  $M_{\nu(n)} = M_n \setminus \{\nu(n)\}$  für alle  $n \in N$ .

*Beweis.* Wir zeigen zunächst Existenz und Eindeutigkeit von Mengen  $M_n$  mit den angegebenen Eigenschaften (1), (2), (3). Sei  $T$  die Menge der Elemente  $n \in N$  für die eine eindeutige Menge  $M_n$  mit den gewünschten Eigenschaften existiert. Wir zeigen, daß  $T$  induktiv ist.

**Es gilt  $e \in T$ :**

*Existenz:* Die Menge  $N \setminus \{e\}$  hat die gewünschten Eigenschaften:

- $e \notin N \setminus \{e\}$ : klar.
- $\nu(e) \in N \setminus \{e\}$ : klar (da  $\nu : N \longrightarrow N \setminus \{e\}$ ).
- $n \in N \setminus \{e\} \implies \nu(n) \in M_e$ : klar (da  $\nu : N \longrightarrow N \setminus \{e\}$ )

*Eindeutigkeit:* Ist  $M'_e$  eine Menge mit den gewünschten Eigenschaften, so betrachten wir  $M := \{e\} \cup M'_e$ . Dann gilt  $e \in M$  und  $n \in M$  impliziert  $\nu(n) \in M$  (für  $n = e$  wegen (2) und für  $n \neq e$  wegen (3)). Damit folgt also nach dem Induktionsaxiom  $M = N$  und damit  $M'_e = N \setminus \{e\}$ . Das zeigt die Eindeutigkeit.

**$n \in T$  impliziert  $\nu(n) \in T$ :**

Setze  $m := \nu(n)$ .

*Existenz:* Wir betrachten die Menge  $M_n \setminus \{m\}$ . Diese Menge hat die gewünschten Eigenschaften:

- $m \notin M_n \setminus \{m\}$ : klar .
- $\nu(m) \in M_n \setminus \{m\}$ :  $m = \nu(n) \in M_n$  wegen (2)<sub>n</sub>, also  $\nu(m) \in M_n$  wegen (3) angewendet auf  $M_n$ . Weiterhin  $\nu(m) \neq m$  (s.o.).

- $l \in M_n \setminus \{m\} \implies \nu(l) \in M_n \setminus \{m\}$ :  $l \in M_n$  impliziert  $\nu(l) \in M_n$ . Weiterhin  $\nu(l) \neq m = \nu(n)$ , sonst  $n = l$  Widerspruch zu  $n \notin M_n$ .)

*Eindeutigkeit:* Ist  $M'_m$  eine Menge mit den gewünschten Eigenschaften, so erfüllt  $\{m\} \cup M'_m$  die charakteristischen Eigenschaften der Menge  $M_n$ :

- $n \notin \{m\} \cup M'_m$ :  $n \neq m = \nu(n)$  (s.o.) und  $n \notin M'_m$  (da sonst  $m = \nu(n) \in M'_m$ . Widerspruch zu  $(2)_m$ ).
- $\nu(n) \in \{m\} \cup M'_m$ : klar (da  $m = \nu(n)$ ).
- $l \in \{m\} \cup M'_m$  impliziert  $\nu(l) \in \{m\} \cup M'_m$ : Für  $l = m$  wegen  $(2)_m$  und für  $l \in M'_m$  wegen  $(3)_m$ .

Aufgrund der schon bewiesenen Eindeutigkeit gilt dann  $\{m\} \cup M'_m = M_n$  und damit also  $M'_m = M_n \setminus \{m\}$ . Das zeigt die Eindeutigkeit.

Die letzte Aussage wurde mitbewiesen.  $\square$

*FOLGERUNG.* (Menge der Zahlen, die kleiner gleich  $n$  sind) Es genüge  $(N, e, \nu)$  den Peanoaxiomen. Dann gibt es eine eindeutige Familie von Mengen  $A_n \subset N$ ,  $n \in N$ , mit

$$A_e = \{e\} \text{ und } A_{\nu(n)} = A_n \cup \{\nu(n)\}.$$

Es gilt  $n \in A_n$  für alle  $n \in N$ . Weiterhin gilt für beliebige  $k, n \in N$  noch  $A_k \subset A_n$  falls  $k \in A_n$  und  $A_n \subset A_k$  falls  $k \notin A_n$ .

*Beweis.* Wir zeigen zunächst Existenz und Eindeutigkeit solcher  $A_n$ :

*Existenz.* Seien  $M_n$ ,  $n \in N$ , die Mengen aus der vorangehenden Folgerung. Nach der vorangegangenen Folgerung gilt  $M_e = N \setminus \{e\}$  und  $M_{\nu(n)} = M_n \setminus \{\nu(n)\}$ . Dann erfüllen die Mengen  $A_n := N \setminus M_n$

$$A_e = \{e\}, \text{ sowie } A_{\nu(n)} = A_n \cup \{\nu(n)\}$$

für alle  $n \in N$ .

*Eindeutigkeit.* Sei  $(A'_n)$ ,  $n \in N$ , eine Familie von Teilmengen von  $N$  mit  $A'_e = \{e\}$  und  $A'_{\nu(n)} = A'_n \cup \{\nu(n)\}$ . Sei  $M := \{n \in N : A_n = A'_n\}$ . Dann sieht man sofort, daß  $M$  induktiv ist, und es folgt die Eindeutigkeit.

Die Aussage  $n \in A_n$  folgt (mit der Fallunterscheidung  $n = e$  und  $n \neq e$ ) für alle  $n \in N$  aus den charakteristischen Eigenschaften der  $A_n$ .

$A_k \subset A_n$  falls  $k \in A_n$ :

Sei  $L$  die Menge aller  $n \in N$ , für die gilt  $A_k \subset A_n$  falls  $k \in A_n$ . Dann gilt  $e \in L$  sowie  $\nu(n) \in L$  falls  $n \in L$ . Damit folgt  $L = N$ , und es gilt  $A_k \subset A_n$  falls  $k \in A_n$ .

$A_n \subset A_k$  falls  $k \notin A_n$ :

Wir müssen zeigen, daß  $M_k \subset M_n$  falls  $k \in M_n$ . Es reicht zu zeigen, daß  $M_k = M_k \cap M_n$ . Dazu reicht es aufgrund der Eindeutigkeit zu zeigen, daß  $M'_k := M_k \cap M_n$  die charakteristischen Eigenschaften von  $M_k$  hat. Das folgt einfach:

$k \notin M'_k : k \notin M_k$

$\nu(k) \in M'_k : \nu(k) \in M_k$  und  $\nu(k) \in M_n$  (da  $k \in M_n$  und  $M_n$  der Eigenschaft (3) geneugt).

$l \in M'_k \implies \nu(l) \in M'_k$ : klar (da es für beide Bestandteile von  $M'_k$  gilt).

Damit ist die Folgerung bewiesen.  $\square$

**Bemerkung.** (a) Für die Menge  $A_n$  aus der Folgerung schreiben wir meist  $\{1, \dots, n\}$ .

(b) Die Elemente von  $A_n$  sind die 'Zahlen' die 'kleiner oder gleich'  $n$  sind. Die Elemente von  $M_n$  sind die Zahlen die 'größer' als  $n$  sind. Tatsächlich kann man zeigen, daß

$$x \leq y : \iff A_x \subset A_y$$

eine Ordnungsrelation auf  $N$  definiert und sogar eine Totalordnung. (Übung. Es muss gezeigt werden, daß  $y$  das einzige Element  $z$  ist mit  $z \in A_y$  und  $\nu(z) \in M_y$ . Dazu betrachtet man die Menge  $L$  aller  $y \in N$  mit dieser Eigenschaft. Dann gehört offenbar  $e$  zu  $L$ . Weiterhin gehört mit  $n$  auch  $\nu(n)$  zu  $L$ . Damit gilt die gewünschte Eigenschaft für alle  $y \in N$ .) Bezüglich dieser Ordnungsrelation ist  $N$  wohlgeordnet, d.h. es gilt, daß jede nichtleere Teilmenge von  $N$  ein kleinstes Element besitzt. (Übung. Angenommen:  $M$  ist eine nichtleere Teilmenge von  $N$ , die kein kleinstes Element besitzt. Zeige dann durch Induktion, daß jedes  $A_n$  im Komplement von  $M$  liegt. Damit stimmt dieses Komplement mit  $N$  überein und  $M$  ist die leere Menge.)

(c) Jede Menge, die genauso viele Elemente wie  $A_n$  hat, heißt  $n$ -elementig.

←  
Ende der 2. Vorlesung

**Rekursive Definition von Funktionen.** Sei  $(N, e, \nu)$  induktiv. Sei  $X$  eine Menge und für  $n \in N$  sei  $X^n$  die Menge der Abbildungen von  $A_n$  nach  $X$ . Seien  $a \in X$  sowie zu  $n \in N \setminus \{e\}$  Abbildungen  $V_n : X^n \rightarrow X$  gegeben. Dann existiert eine eindeutige Funktion  $f : N \rightarrow X$  mit

- $f(1) = a$
- $f(\nu(n)) = V_n(f|_{A_n})$ . Hier bezeichnet  $f|_{A_n}$  die Einschränkung von  $f$  auf  $A_n$  gegeben durch  $f|_{A_n} : A_n \rightarrow X, x \mapsto f(x)$ .

**Bemerkung.** Das ist eine präzise Fassung von

$$X^n = \text{Menge der Tupel } (f(1), \dots, f(n))$$

und

$$f(1) = a, \quad f(n+1) = V_n(f(1), \dots, f(n))$$

für alle  $n \in N$ .

*Beweis.* (Skizze) Wir zeigen zunächst die *Eindeutigkeit* eines solchen  $f$ : Seien  $f$  und  $g$  zwei Funktionen mit den gewünschten Eigenschaften. Sei  $L := \{n \in N : f|_{A_n} = g|_{A_n}\}$ . Dann ist  $L$  induktiv (einfach) und muss also mit  $N$  übereinstimmen. Das liefert die Eindeutigkeit.

Wir kommen nun zur *Existenzaussage*. Sei  $\mathcal{A}(n)$  die Aussage:

$\mathcal{A}(n)$  Es existiert eine eindeutige Funktion  $f_n : A_n \rightarrow X$  mit  $f_n(e) = a$  und  $f_n(\nu(k)) = V_k(f_n|_{A_k})$  für  $k \in A_n$  mit  $\nu(k) \in A_n$ .

Wir zeigen zunächst durch Induktion, daß  $\mathcal{A}(n)$  für jedes  $n \in N$  wahr ist:

$n = e$ : klar. ( $f_e(e) = a$ .)

$n \implies \nu(n)$ :

*Existenz*: Definiere  $f_{\nu(n)}$  auf  $A_n$  durch  $f_n$  und setze es auf  $\nu(n)$  als  $V_n(f_n(1), \dots, f_n(n))$ . Dann hat  $f_{\nu(n)}$  die gewünschten Eigenschaften.

*Eindeutigkeit*: Das ist einfach. (Auf  $A_n$  haben wir keine Wahl, da  $\mathcal{A}(n)$  wahr ist, und auf  $\nu(n)$  ist der Funktionswert nach der Vorschrift festgelegt.)

Nun zeigen wir, daß die  $f_n$ ,  $n \in N$ , miteinander verträglich sind:

Seien  $k, n \in N$  gegeben. Dann gilt (s.o.)  $A_n \subset A_k$  oder  $A_k \subset A_n$ . Ohne Einschränkung  $A_n \subset A_k$ . Aufgrund der Eindeutigkeit müssen dann  $f_n$  und  $f_k$  auf  $A_n$  übereinstimmen. Damit kann man dann die  $f_n$  zu einem  $f$  auf  $N$  'zusammensetzen', indem man definiert

$$f : N \rightarrow X, f(n) := f_n(n).$$

Dieses  $f$  stimmt auf jedem  $A_n$  mit  $f_n$  überein und hat also die gewünschten Eigenschaften.  $\square$

**Bemerkung.** ähnlich wie man Funktionen rekursiv definieren kann, kann man auch Mengen rekursiv definieren (siehe Übung).

Damit können wir nun die schon angekündigte Eindeutigkeit der 'natürlichen Zahlen' beweisen.

**THEOREM.** (*Eindeutigkeit der natürlichen Zahlen*) Es genügen  $(N_1, e_1, \nu_1)$  und  $(N_2, e_2, \nu_2)$  den Peano Axiomen. Dann gibt es eindeutige Abbildungen  $k : N_1 \rightarrow N_2$  und  $l : N_2 \rightarrow N_1$  mit

$$k(e_1) = e_2 \text{ und } k(\nu_1(n)) = \nu_2(k(n)) \text{ für alle } n \in N_1$$

bzw.

$$l(e_2) = e_1 \text{ und } l(\nu_2(n)) = \nu_1(l(n)) \text{ für alle } n \in N_2.$$

Es gilt  $l \circ k = id_{N_1}$  und  $k \circ l = id_{N_2}$ . Damit sind also  $l$  und  $k$  bijektiv.

**Zeichnung.** Kommutatives Diagramm.

*Beweis.* Wir widmen uns zunächst der Abbildung  $k$ :

*Existenz von  $k$* : Das folgt durch rekursive Definition.

*Eindeutigkeit von  $k$* : Seien  $k$  und  $k'$  Abbildungen mit der gewünschten Eigenschaft. Sei  $M := \{n \in N_1 : k(n) = k'(n)\}$ . Dann gilt nach Definition  $e_1 \in M$  und  $n \in M$  impliziert  $\nu_1(n) \in M$  da

$$k(\nu_1(n)) = \nu_2(k(n)) = \nu_2(k'(n)) = k'(\nu_1(n)).$$

Damit folgt  $M = N_1$  aus dem zweiten Peanoaxiom.

Analog können wir Existenz und Eindeutigkeit von  $l$  beweisen.

Wir zeigen nun  $l \circ k = id_{N_1}$ : Sei  $S := \{n \in N_1 : l \circ k(n) = n\}$ . Dann folgt ähnlich wie eben, daß  $S = N_1$ .

Die Aussage  $k \circ l = id_{N_2}$  lässt sich analog beweisen.  $\square$

**!!!** Das vorangehende Theorem zeigt, daß es (bis auf Umbenennung) nur ein Triple  $(N, e, \nu)$  gibt, das den Peano Axiomen genügt. Wir bezeichnen dieses eindeutige Tripel ab jetzt als die natürlichen Zahlen und verwenden das Symbol  $\mathbb{N}$ . Weiterhin schreiben wir dann (meist) 1 statt  $e$  und  $n + 1$  statt  $\nu(n)$ .

In gewissen Fällen wird es praktisch sein, noch ein weiteres Element 0 zur Verfügung zu haben und mit  $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$  zu arbeiten. Auf  $\mathbb{N}_0$  zeichnen wir das Element 0 aus und definieren die Nachfolge Abbildung  $\nu_0$  auf  $N$  wie bisher und  $0 + 1 = 1$ . Dann erfüllt  $(\mathbb{N}_0, 0, \nu_0)$  die Peanoaxiome. (Klar!)

**Bemerkung.** Wir können nun  $\mathbb{N}$  mit einer Addition und einer Multiplikation versehen gemäß:

**Addition :  $n + m$ :** Für jedes feste  $n \in \mathbb{N}$  definieren wir die Abbildung  $S_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  rekursiv gemäß

$$S_n(1) = n + 1 := \nu(n) \text{ und } S_n(\nu(m)) := \nu(n + m).$$

Dann liefert  $S_n(m)$  eine präzise Fassung des bisher nicht definierten  $n + m$ .

**Multiplikation :  $kn$ :** Für jedes feste  $n \in \mathbb{N}$  definieren wir die Abbildung  $M_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  rekursiv gemäß

$$M_n(1) = n \text{ und } M_n(\nu(m)) := M_n(m) + n.$$

Wir setzen  $kn := M_n(k)$ .

Weiterhin setzen wir  $0 + n = n = n + 0$  sowie  $0n = n0 = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}_0$ .

Es ist dann möglich zu zeigen, daß Addition und Multiplikation den üblichen Regeln genügen. Wir werden darauf im nächsten Abschnitt (auf andere Art) eingehen. Hier geben wir aber schon einige Anwendungen:

- Die Funktion  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $n \mapsto n!$  (n-Fakultät) wird definiert durch

$$1! = 1 \text{ und } (n + 1)! = (n + 1)n!.$$

Damit ist sinngemäß  $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ . Zweckmässig:  $0! = 1$ .

- Für  $a \in \mathbb{N}$  wird die Funktion  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $n \mapsto a^n$  definiert durch

$$a^1 := a, \quad a^{n+1} := a \cdot a^n.$$

Zweckmässig:  $a^0 := 1$ .

- Zu jedem  $k \in A_n \cup \{0\}$  existiert ein eindeutiges  $m \in N_0$  mit  $k + m = n$ . Wir schreiben dann auch  $n - k$  für  $m$ .

Bew. Sei  $L$  die Menge der  $n \in N_0$  für die  $A_n$  die behauptete Eigenschaft hat. Dann gehört  $0$  zu  $L$ . (Denn  $0 + 0 = 0$  und  $0 + n = n \neq 0$  für alle  $n \in N$ ). Weiterhin gehört mit  $n$  auch  $\nu(n)$  zu  $L$ : (Übung. Sei  $k \in A_{\nu(n)}$ . Zu zeigen Existenz und Eindeutigkeit eines  $m$  mit  $k + m = \nu(n)$ ).

*Existenz:* Falls  $k \in A_n$ , gibt es  $m'$  mit  $k + m' = n$  und wir wählen  $m := \nu(m')$ . Falls  $k = \nu(n)$  setzen wir  $m := 0$ .

*Eindeutigkeit:* Es gelte  $k + m = \nu(n)$ . Ist  $m = 0$  so folgt  $k = \nu(n)$ . Damit ist dann  $m = 0$  die einzige Lösung (denn  $k + n \in M_k$  wie eine einfache Induktion zeigt und  $M_k$  enthält  $k$  nicht.)

Andernfalls ist  $m$  ein Nachfolger, also  $m = \nu(l)$ . Dann gilt  $k + \nu(l) = \nu(n)$ , also  $\nu(k + l) = \nu(n)$  also  $k + l = n$ . Wegen  $n \in L$  ist dann  $l$  eindeutig bestimmt und damit auch  $m = \nu(l)$ .

- Die Anzahl der Teilmengen einer  $n$ -elementigen Menge ist gerade  $2^n$ . (vgl. Übung)

Bew.  $n = 1$ : Es gibt zwei Teilmengen: die leere Menge und gesamte Menge.

$n \implies n + 1$ : Sei eine Menge  $M$  mit  $n + 1$  Elementen gegeben. Sei  $p$  eine Element von  $M$ . Dann gibt es genausoviele Teilmengen, die  $p$  enthalten, wie Teilmengen die  $p$  nicht enthalten (!). Es gibt  $2^n$  Teilmengen von  $M$ , die  $p$  nicht enthalten (also Teilmengen der  $n$  elementigen Menge  $M \setminus \{p\}$  sind). Insgesamt gibt es also  $2 \times 2^n = 2^{n+1}$  Teilmengen. (Zeichnung:  $n$  weiße Kugeln und eine schwarze Kugel.)

Weitere Beispiele in der Übung. Ende der Bemerkung.

Mittels Rekursiver Definition können wir auch  $\sum$  und  $\prod$  definieren. Das wird später oft nützlich sein. Daher gehen wir nun darauf ein.

### Definition von $\prod$ :

Ziel: Präzise Version von  $\prod_{k=1}^n a_k = a_n \dots a_1$ .

Sei  $K$  eine Menge mit einer Verknüpfung  $\cdot$  (Beispiel:  $K = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ). Seien  $a_n \in K$ ,  $n \in N$  gegeben. Wir definieren dazu den Ausdruck  $\prod_{k=1}^n a_k$  rekursiv durch

$$\prod_{k=1}^1 a_k := a_1 \text{ und } \prod_{k=1}^{n+1} a_k := a_{k+1} \prod_{k=1}^n a_k.$$

(Die Funktion  $f : N \longrightarrow K$ ,  $f(n) := \prod_{k=1}^n a_k$ , wird also durch die Bedingungen  $f(1) = a_1$  und  $f(n+1) = a_{n+1}f(n) =: V_n(f_{A_n})$  festgelegt.)



Spezialfall: Sind alle  $a_k = q \in K$  so setze man

$$q^n := \prod_{k=1}^n q.$$

Dann gilt also

$$q^1 = q, q^{n+1} = qq^n.$$

**Definition von  $\sum$ :**

Ziel: Präzise Version von  $\sum_{k=1}^n a_k = a_n + \dots + a_1$ .

Sei  $K$  eine Menge mit einer Verknüpfung  $+$  (Beispiel:  $K = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ).

Seien  $a_n \in K$ ,  $n \in \mathbb{N}$  gegeben.

Wir definieren dazu den Ausdruck  $\sum_{k=1}^n a_k$  rekursiv durch

$$\sum_{k=1}^1 a_k := a_1 \text{ und } \sum_{k=1}^{n+1} a_k := a_{n+1} + \sum_{k=1}^n a_k.$$

(Die Funktion  $f : \mathbb{N} \rightarrow K$ ,  $f(n) = \sum_{k=1}^n a_k$  wird also durch die Bedingungen  $f(1) = a_1$  und  $f(n+1) = a_{n+1} + f(n) =: V_n(f_{A_n})$  festgelegt.)

Spezialfall: Sind alle  $a_k = q \in K$  so setzt man

$$nq := \sum_{k=1}^n q.$$

Dann gilt also

$$1q = q, (n+1)q = q + nq.$$

## KAPITEL 2

### Die reellen Zahlen

Die reellen Zahlen sind charakterisiert durch das Zusammenspiel von drei Strukturen:

- Körperaxiome ('Arithmetik')
- Anordnungsaxiome (' $\leq$ ')
- Vollständigkeitsaxiom ('Existenz von Suprema und Infima')  
(Liefert Existenz von Grenzwerten)

Die natürlichen Zahlen lassen sich als Teilmengen der reellen Zahlen auffassen und erben entsprechend Arithmetik und Anordnung. Darum geht es in diesem Kapitel. Insbesondere werden wir dabei folgende Zeichnung rechtfertigen:

**Zeichnung.** Linie mit

- 0 und Spiegelung (für Inversion im Körper),
- Positiv- und Negativteil (für Ordnung)
- ohne Lücken (für Vollständigkeit).

sowie

- natürlichen Zahlen.

#### 1. Die Körperstruktur

Die reellen Zahlen mit Multiplikation und Addition sind ein Körper:

**DEFINITION.** (*Körper*) Eine Menge  $K$  zusammen mit den Verknüpfungen

$$K \times K \longrightarrow K, (x, y) \mapsto x + y \text{ (Addition)}$$

und

$$K \times K \longrightarrow K, (x, y) \mapsto x \cdot y \text{ (Multiplikation)}$$

heißt Körper, wenn folgende Axiome gelten:

*Axiome der Addition:*

- (A1) *Assoziativgesetz:*  $x + (y + z) = (x + y) + z$  für alle  $x, y, z \in K$ .
- (A2) *Kommutativgesetz:*  $x + y = y + x$  für alle  $x, y \in K$ .
- (A3) *Existenz der 0:* Es gibt ein  $0 \in K$  mit  $x + 0 = x$  für alle  $x \in K$ .
- (A4) *Existenz des Negativen:* Zu jedem  $x \in K$  existiert ein  $-x \in K$  mit  $x + (-x) = 0$ .

*Axiome der Multiplikation:*

- (M1) *Assoziativgesetz:*  $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$  für alle  $x, y, z \in K$ .
- (M2) *Kommutativgesetz:*  $x \cdot y = y \cdot x$  für alle  $x, y \in K$ .

(M3) *Existenz der 1: Es gibt ein  $1 \in K$  mit  $1 \neq 0$  und  $x \cdot 1 = x$  für alle  $x \in K$ .*

(M4) *Existenz des Negativen: Zu jedem  $x \in K$  mit  $x \neq 0$  existiert ein  $x^{-1} \in K$  mit  $xx^{-1} = 1$ .*

*Distributivgesetz:*

(D1) *Distributivgesetz:  $x(y + z) = xy + xz$  für alle  $x, y, z \in K$ .*

**Bemerkung.** Man kann diese Definition auch so fassen:  $(K, +)$  ist eine kommutative Gruppe mit neutralem Element 0.  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  ist eine kommutative Gruppe mit neutralem Element 1. Es gilt das Distributivgesetz  $x(y + z) = xy + xz$  für alle  $x, y, z \in K$ .

**Notation.**  $x - y$  statt  $x + (-y)$ ,  $x/y$  statt  $x \cdot y^{-1}$  und  $xy$  statt  $x \cdot y$ .

**Beispiel - (Kleinsten Körper)**  $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$  mit Addition  $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$  und Multiplikation  $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1$  und  $00 = 0$  ist ein Körper. Es handelt sich gerade um das 'Rechnen modulo zwei'. Dabei steht 1 für alle ganzen Zahlen, deren Rest bei Division durch gerade 1 ist (ungerade Zahlen) und 0 für alle ganzen Zahlen, deren Rest bei Division durch 2 gerade 0 ist (gerade Zahlen). Die Rechenregeln lassen sich dann verstehen als *gerade + gerade = gerade, gerade + ungerade = ungerade*.... Allgemeiner liefert Rechnen modulo  $N$  einen Körper, falls  $N$  eine Primzahl ist (siehe Algebra).

**'Beispiele.'**  $\mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ .

**PROPOSITION.** (*Charakteristische Eigenschaften des Inversen*) Sei  $(K, +, \cdot)$  ein Körper. Dann gilt:

(a)  $y - x$  ist die eindeutige Lösung  $z$  von  $x + z = y$ . Insbesondere sind das Inverse bzgl. der Addition zu einem  $x$  und das neutrale Element der Addition eindeutig bestimmt. Gilt  $x + y = 0$  für  $x, y \in K$  so ist  $x = -y$  und  $y = -x$ .

(b)  $x/y$  ist die eindeutige Lösung  $z$  von  $zy = x$ . Insbesondere ist das Inverse bzgl. der Multiplikation zu einem  $y \neq 0$  und das neutrale Element der Multiplikation eindeutig bestimmt. Gilt  $xy = 1$  für  $x, y \in K$ , so gilt  $x = y^{-1}$  und  $y = x^{-1}$ .

*Beweis.* (a) *Lösung:*  $x + (y - x) = (y - x) + x = y + (-x + x) = y + 0 = y$ .

*Eindeutig:*  $x = y + z \implies x - y = (y + z) - y = -y + (y + z) = (-y + y) + z = 0 + z = z$ .

(b) ähnlich wie (a).

□

**PROPOSITION.** (*Rechnen mit 0 und 1*) Sei  $(K, +, \cdot)$  ein Körper. Dann gilt:

(a) *Es gilt  $0 = -0$  und  $1 = 1^{-1}$ .*

(b)  *$0x = 0$  für alle  $x \in K$ .*

(c)  $(-1)x = -x$  für alle  $x \in K$ .

(d)  $(-x)(-y) = xy$  für alle  $x, y \in K$ .

*Beweis.*

(a) Es gilt  $0 = 0 + 0$  und  $1 = 1 \cdot 1$ . Damit folgt die Aussage aus der vorigen Proposition.

(b)  $0x = (0+0)x = 0x+0x$ . Nun Addieren von  $-0x$  auf beiden Seiten...

(c) Es ist zu zeigen, daß  $z := (-1)x$  das Inverse von  $x$  (bzgl. Addition) ist:

$$z + x = (-1)x + x = (-1)x + 1x = (-1 + 1)x = 0x = 0 \text{ (nach (c)).}$$

(d) Übung (Reicht zu zeigen  $(-1)(-1) = 1$ . Das ist klar nach (c).)

□

**FOLGERUNG.** (*Vertauschen der Inversionen*) Sei  $(K, +, \cdot)$  ein Körper. Dann ist für jedes  $x \neq 0$  auch  $-x \neq 0$  und es gilt  $(-x)^{-1} = -x^{-1}$ .

*Beweis.* Für  $x \neq 0$  gilt auch  $-x \neq 0$  (sonst  $x = x + 0 = x + (-x) = 0$  Widerspruch). Weiterhin gilt

$$(-x)(-x^{-1}) = (-x)(-1)(x^{-1}) = (-1)(-x)x^{-1} = xx^{-1} = 1.$$

Damit folgt (s.o.)  $(-x)^{-1} = -x^{-1}$ .

□

**Bemerkung.** Ist  $(K, +, \cdot)$  ein Körper und  $x \in K$  mit  $x \neq 0$ , so liefert rekursive Definition eine eindeutige Abbildung

$J : \mathbb{N} \longrightarrow K$  mit  $J(1_{\mathbb{N}}) = x$  und  $J(n + 1_{\mathbb{N}}) = J(n) + x$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Wir definieren dann:  $n \cdot x := J(n)$ . Als **Beispiel** können wir  $K = \mathbb{F}_2$  und  $x = 1$  betrachten. Dann gilt für  $J : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{F}_2$ ,  $n \mapsto n1_{\mathbb{F}_2}$

$$J(n) = 0 \text{ falls } n \text{ gerade d.h. } n = 2k \text{ für ein } k \in \mathbb{N}$$

und

$$J(n) = 1 \text{ falls } n \text{ ungerade d.h. } n = 2k + 1 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}.$$

Die folgenden beiden wichtigen Formeln gelten in jedem Körper.

**PROPOSITION.** (*Geometrische Summenformel*) Sei  $K$  ein Körper und  $x, y \in K$ . Dann gilt für jedes  $n \in \mathbb{N}$  und  $x \neq y$

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{(n-1)-k} = \sum_{k=0}^{n-1} y^k x^{n-1-k}.$$

Inbesondere gilt für  $q \neq 1$  und  $n \in \mathbb{N}_0$  die Formel

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

*Beweis.* Wir rechnen

$$\begin{aligned} (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{(n-1)-k} &= \sum_{k=0}^{n-1} x^{k+1} y^{(n-1)-k} - \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k} \\ (\text{Teleskopsumme}) &= \sum_{k=1}^n x^k y^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k} \\ &= x^n - y^n. \end{aligned}$$

Die zweite Gleichheit folgt durch Vertauschen von  $x$  und  $y$ . Das 'Inbesondere' folgt mit  $x = 1$  und  $y = q \neq 1$ .  $\square$

**Bemerkung.** Man kann die geometrische Summenformel auch durch Induktion beweisen. (Übung).

**PROPOSITION.** (*Binomischer Satz*) Sei  $K$  ein Körper,  $n \in \mathbb{N}$  und  $x, y \in K$ . Dann gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

mit

$\binom{n}{k} :=$  Anzahl der  $k$ -elementigen Teilmengen einer  $n$  elementigen Menge.

Diese Zahlen  $\binom{n}{k}$  erfüllen die Rekursionsformel

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}.$$

*Beweis.* Die Rekursionsformel folgt direkt: Sei eine  $n + 1$  elementige Menge gegeben. Sei ein Element  $p$  aus dieser Menge fixiert. Dann gibt es  $\binom{n}{k-1}$   $k$ -elementige Teilmengen die  $p$  enthalten und  $\binom{n}{k}$   $k$ -elementige Teilmengen, die  $p$  nicht enthalten. (Zeichnung:  $n$  weiße Kugeln und eine schwarze Kugel....)

Nun folgt die Aussage über  $(x + y)^n$  durch Induktion:  
 $n = 1$ : Klar.

$n \implies (n + 1)$ : Direkte Rechnung liefert

$$\begin{aligned} (x + y)^{n+1} &= (x + y)(x + y)^n \\ A(n) &= (x + y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}. \end{aligned}$$

←  
Ende der 4. Vorlesung

(Dabei folgt die letzte Gleichung aus der Induktionsannahme für  $n$ .)  
Damit können wir weiter rechnen

$$\begin{aligned} \dots &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1} \\ (k \rightarrow k-1) &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} x^k y^{n-k+1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1} \\ (\text{Rekursion}) &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} x^k y^{n-k+1} + y^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k}. \end{aligned}$$

Damit ist der Beweis abgeschlossen.  $\square$

**Bemerkung.** (a) Alternative Deutung: 'Ausmultiplizieren' von

$$(x+y)^n = (x+y)(x+y) \cdots (x+y)$$

und bestimmen, wie oft  $x^k y^{n-k}$  vorkommt.

(b) Es gilt  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ . (Bew. Induktion und Rekursionsformel. Beachte dabei, daß man zunächst dem Quotienten  $a/b$  für natürliche Zahlen einen Sinn geben muss, etwa durch  $a/b = c$  genau dann wenn  $c \in \mathbb{N}$  die Gleichung  $bc = a$  erfüllt.)

## 2. Die Ordnungsstruktur

Wir kommen nun zu einer weiteren Struktur auf  $\mathbb{R}$ , der Ordnungsstruktur.

**DEFINITION.** Ein Körper  $K$  zusammen mit einer ausgezeichneten Menge  $K^+$ , den sogenannten positiven Elementen, heißt angeordnet, wenn die folgenden Eigenschaften (Ordnungsaxiome) gelten:

- (O1)  $K = K^+ \cup \{0\} \cup \{-x : x \in K^+\}$ , wobei die Vereinigung disjunkt ist.
- (O2)  $x, y \in K^+$  impliziert  $x + y \in K^+$ .
- (O3)  $x, y \in K^+$  impliziert  $xy \in K^+$ .

Die Elemente  $x \in K$  mit  $-x \in K^+$  heißen dann negativ. Die Elemente aus  $K^+ \cup \{0\}$  heißen auch nicht negativ.

**Bemerkungen.** (a) Die Struktur einer Anordnung auf einem Körper ist 'mehr' als die Struktur einer Ordnung (s.u.).

(b) ' $\mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R}$ ' sind angeordnet.

(c)  $\mathbb{F}_2$  lässt sich nicht anordnen. (Denn  $1 = -1$ .)  $\mathbb{C}$  lässt sich nicht anordnen.

**Notation.**  $K$  angeordneter Körper. Wir schreiben

$x > y$  oder  $y < x$  falls  $x - y \in K^+$ .  
 $x \geq y$  oder  $y \leq x$  falls  $x - y \in K^+ \cup \{0\}$ .

**FOLGERUNG.** ( $\leq$  liefert eine totale Ordnung) Sei  $K$  ein angeordneter Körper.

- (a) Sind  $x, y, z \in K$  mit  $x \leq y$  und  $y \leq z$  so gilt  $x \leq z$ .  
 (b) Gilt für  $x, y \in K$  sowohl  $x \leq y$  als auch  $y \leq x$  so folgt  $x = y$ .  
 (c) Für  $x, y \in K$  gilt dann genau eine der drei folgenden Aussagen:
- $x < y$ .
  - $y < x$ .
  - $x = y$ .

*Beweis.* (a) Zu zeigen  $z - x \in K^+ \cup \{0\}$ . Das folgt aus (O2) in folgender Weise:

$$z - x = z + (-y + y) - x = (z - y) + (y - x) \in K^+ \cup \{0\}.$$

(b) Das folgt sofort aus (a), kann aber auch auf folgende Weise bewiesen werden: Für  $x, y$  mit  $x \leq y$  und  $y \leq x$  gilt  $x - y \in K^+ \cup \{0\}$  und  $y - x \in K^+ \cup \{0\}$ . Damit folgt

$$x - y \in (K^+ \cup \{0\}) \cap (\{-z : z \in K^+\}) \cup \{0\} = \{0\}.$$

Dabei folgt die letzte Gleichheit aus (O1).

(c) Das ist lediglich eine Umformulierung von (O1). □

**Bemerkung.** Eine Relation  $<$  auf einer Menge  $B$  heißt Totalordnung, wenn gilt

- Es ist  $<$  transitiv.
- Für alle  $x, y \in B$  gilt genau eine der drei folgenden Aussagen:  
 $x < y, x = y, y < x$ .

In diesem Fall ist  $x \leq y \iff x < y$  oder  $x = y$  eine Ordnung auf  $B$ .

Wir untersuchen nun wie die Anordnung mit Bilden des Inversen verträglich ist.

**PROPOSITION.** (*Inversion und Quadrate*) Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann gilt:

- (a)  $x < y \iff -x > -y$ . Insbesondere  $x < 0 \iff -x > 0$ .  
 (b)  $x \in K^+ \iff x^{-1} \in K^+$ .  
 (c)  $x^2 \in K^+$  für alle  $x \neq 0$ . Insbesondere  $1 = 1 \cdot 1 > 0$ .

*Beweis.*

(a)  $x < y$  bedeutet gerade  $y - x \in K^+$ ;  $-x > -y$  bedeutet gerade  $-x + y \in K^+$ . Das 'Insbesondere' folgt mit  $x = x$  und  $y = 0$ .

(b)  $x \in K^+$ , insbesondere  $x \neq 0$ . Angenommen  $x^{-1} \notin K^+$ . Dann  $-x^{-1} \in K^+$ . Damit  $-1 = x(-x^{-1}) \in K^+$ . Damit  $1 = (-1)(-1) \in K^+$ . Also  $1 \in K^+$  und  $(-1) \in K^+$ . Widerspruch zu (O1).

(c) folgt aus  $x^2 = xx = (-x)(-x)$ , da für  $x \neq 0$   $x \in K^+$  oder  $-x \in K^+$  gilt.

□

Wir kommen nun zu einigen nützlichen Rechenregeln.

← Ende der 5. Vorlesung

**PROPOSITION.** (*Rechenregeln*) Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann gilt:

$$(a) \ x < y, \ x' \leq y' \implies x + x' < y + y'.$$

$$(b) \ a < b \text{ und } x > 0 \implies ax < bx$$

$$(c) \ a < b \text{ und } x < 0 \implies ax > bx.$$

$$(d) \ 0 < a < b \text{ und } 0 < x < y \implies ax < by.$$

$$(e) \ 0 < x < y \iff 0 < y^{-1} < x^{-1}.$$

*Beweis.* (a) ähnlich wie (a): Es gilt nach (O2):

$$(y + y') - (x + x') = (y - x) + (y' - x') \in K^+.$$

$$(b) \ bx - ax = (b - a)x \in K^+.$$

(c)  $a < b$  bedeutet  $b - a \in K^+$ .  $x < 0$  liefert  $-x \in K^+$  nach voriger Proposition. Damit gilt also

$$ax - bx = (a - b)x = (-1)(a - b)(-1)x = (b - a)(-x) \in K^+.$$

$$(d) \ by - ax = by - bx + bx - ax = b(y - x) + x(b - a) \in K^+.$$

(e)  $\implies$ : Nach vorangegangener Proposition gilt  $x^{-1}, y^{-1} \in K^+$ . Damit können wir  $0 < x < y$  mit  $x^{-1}y^{-1}$  'Durchmultiplizieren' und erhalten die Behauptung.

Die umgekehrte Richtung folgt dann durch Ersetzen von  $x$  durch  $x^{-1}$  und  $y$  durch  $y^{-1}$ . □

**FOLGERUNG.**  $0 \leq x < y, \ k \in \mathbb{N} \implies 0 \leq x^k < y^k.$

In allen angeordneten Körper gilt die folgende Bernoulli Ungleichung. Um sie zu formulieren, brauchen wir noch eine kleine Vorbereitung: In einem Körper  $K$  können wir  $nx$  mit  $n \in \mathbb{N}$  und  $x \in K$  rekursiv definieren durch  $1_{\mathbb{N}}x = x$  und  $(n + 1)x := nx + x$ .

**PROPOSITION.** (*Bernoulli Ungleichung*) Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann gilt für  $x \geq -1$  und  $n \in \mathbb{N}$

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

*Beweis.* Induktion nach  $n$ .

$$n = 1: 1 + x = 1 + x.$$

$$n \implies n + 1:$$



$$\begin{aligned}
(1+x)^{n+1} &= (1+x)(1+x)^n \\
(A(n), 1+x \geq 0) &\geq (1+x)(1+nx) \\
&= 1+(n+1)x+nx^2
\end{aligned}$$

(Kleine Induktion zwischendurch ;- )  $\geq 1+(n+1)x$ .

□

**Bemerkungen.** (a) Für  $x \geq 0$  folgt das natürlich aus dem binomischen Satz. Denn  $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$  hat nur nichtnegative Summanden.

(b) Wie ist die Lage für  $-2 \leq x \leq -1$ ? (Übung)

In einem angeordneten Körper können wir den Betrag definieren durch

$$|\cdot| : K \longrightarrow K^+ \cup \{0\}, |x| := \begin{cases} x & : x > 0 \\ 0 & : x = 0 \\ -x & : x < 0. \end{cases}$$

Der Betrag beschreibt so etwas wie eine Länge. Das Bilden des Betrages ist in gewisser Weise mit Addition und Multiplikation verträglich:

**PROPOSITION.** (*Betrag und Multiplikation*) Ist  $K$  ein angeordneter Körper, so gilt für alle  $x, y, z \in K$

- $|z| = |-z|$
- $|1/x| = 1/|x|$  (falls  $x \neq 0$ ).
- $|xy| = |x||y|$

*Beweis.* Es gilt  $|z| = |-z|$ . Das folgt leicht durch Fallunterscheidung.

Es gilt  $|1/x| = 1/|x|$ . Das ist klar für  $x > 0$ . Für  $x < 0$  gilt  $-x > 0$  und  $x^{-1} < 0$  und damit

$$1/|x| = |x|^{-1} = |-x|^{-1} = (-x)^{-1} \stackrel{s.o.}{=} -x^{-1} = |x^{-1}| = |1/x|.$$

Es gilt  $|xy| = |x||y|$ . Gilt  $x = 0$  oder  $y = 0$ , so folgt die Aussage sofort. Die übrigen Fälle folgen einfach durch Fallunterscheidung (4 Fälle). Etwa:

$x > 0, y > 0$ : Dann gilt  $xy > 0$  und damit  $|xy| = xy = |x||y|$ .

$x < 0, y > 0$ : Dann gilt  $-y > 0$ . Damit folgt unter Anwendung des schon gezeigten:

$$|xy| = |(-1)xy| = |x(-y)| = |x||-y| = |x||y|.$$

etc.

□

**PROPOSITION.** (*Dreiecksungleichung*) Ist  $K$  ein angeordneter Körper, so gilt für alle  $x, y, z \in K$

$$|z| = |-z| \text{ und } -|z| \leq z \leq |z|$$

und

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad (\text{Dreiecksungleichung})$$

also insbesondere

$$||x| - |y|| \leq |x - y| \quad (2. \text{ Dreieckungleichung}).$$

*Beweis.*  $-|z| \leq z \leq |z|$ : Für  $z = 0$  ist die Aussage klar. Für  $z > 0$  folgt die Aussage leicht. Für  $z < 0$  können wir  $-z$  betrachten und erhalten die Aussage.

Es gilt  $|x + y| \leq |x| + |y|$ : Reicht z.z.  $x + y \leq |x| + |y|$  und  $-(x + y) \leq |x| + |y|$ .

Nun gilt aber aufgrund des schon gezeigten:  $x, -x \leq |x|$  und  $y, -y \leq |y|$ . Addieren unter Verwendung der Rechenregeln liefert die Aussage.

Zum 'Insbesondere': Aus  $|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y|$  folgt  $|x| - |y| \leq |x - y|$  ähnlich folgt auch  $|y| - |x| \leq |y - x|$ .  $\square$

In einem angeordneten Körper  $K$  können wir ebenso induktiv Minimum und Maximum von endlichen Mengen  $M$  definieren:

Ist  $M$  eine Menge in  $K$  mit einem Element  $m$  so definieren wir  $\max M = m$  und  $\min M = m$ .

Sei nun  $M$  eine Menge in  $K$  mit  $n + 1$  Elementen, also  $M = M' \cup \{m\}$  mit einer  $n$  elementigen Menge  $M'$ . Dann definieren wir  $\max M$  durch  $\max M := m$  falls  $m \geq \max M'$  und  $\max M := \max M'$  falls  $m < \max M'$  und  $\min M$  durch  $\min M = m$  falls  $m \leq \min M'$  und  $\min M = \min M'$  falls  $m > \min M'$ .

### 3. Ordnungsvollständigkeit

Wir kommen nun zur dritten Eigenschaft der reellen Zahlen, der Ordnungsvollständigkeit. Auf dieser Eigenschaft beruhen die Aussagen über Grenzwerte in der Analysis.

DEFINITION. (*Beschränkte Mengen*) Sei  $K$  ein angeordneter Körper und  $M \subset K$  nichtleer.

(a) Es heißt  $S \in K$  eine obere/untere Schranke von  $M$ , wenn  $m \leq S$  /  $m \geq S$  für alle  $m \in M$ .

(b) Hat  $M$  eine obere/untere Schranke, so heißt  $M$  nach oben / unten beschränkt. Hat  $M$  obere und untere Schranke, so heißt  $M$  beschränkt.

Wir fragen nun nach kleinsten oberen / größten unteren Schranken.

DEFINITION. Sei  $K$  ein angeordneter Körper und  $M$  eine nach oben / unten beschränkte Menge in  $K$ . Eine obere / untere Schranke  $S$  von  $M$  heißt dann Supremum / Infimum, wenn für jede weitere obere / untere Schranke  $S'$  gilt  $S \leq S'$  /  $S \geq S'$ . Ist  $S$  ein Supremum / Infimum mit  $S \in M$ , so wird es als Maximum / Minimum bezeichnet.

←  
Ende der 6. Vorlesung

**Wichtig.** (a) Das Supremum/Infimum einer beschränkten Menge muss nicht existieren (so hat zum Beispiel in  $\mathbb{Q}$  hat die Menge  $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2\}$  keine Supremum. siehe Übung.).

(b) Wenn ein Supremum / Infimum existiert, ist es eindeutig:  
(Bew.  $S, S'$  Suprema von  $M$ . Dann gilt  $S \leq S'$  und  $S' \leq S$  also  $S = S'$ .)

**Notation.** Wir schreiben  $\sup M$  bzw.  $\inf M$  für das Supremum bzw. Infimum einer Menge (falls existent).

**PROPOSITION.** (*Charakterisierung Supremum*) Sei  $K$  ein angeordneter Körper und Menge eine Menge in  $K$ . Das Supremum der Menge  $M$  ist dadurch charakterisiert, daß gilt

- $m \leq S$  für alle  $m \in M$ . ( $S$  ist obere Schranke)
- Für jedes  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $m \in M$  mit  $S - \varepsilon < m$ . (Jede kleinere Zahl ist NICHT Schranke d.h. jede Schranke ist mindestens  $S$ )

Für das Infimum gilt entsprechendes (!).

*Beweis.* Das ist eigentlich nur eine einfache Umformulierung der Definitionen: Es ist  $S$  Supremum von  $M$ , wenn es eine obere Schranke von  $M$  ist und jede weitere obere Schranke nicht kleiner als  $S$  ist. Das bedeutet, daß  $S$  Supremum ist, wenn es eine obere Schranke ist und jede kleinere Element nicht obere Schranke ist.  $\square$

Damit können wir nun die dritte Eigenschaft der reellen Zahlen definieren.

**DEFINITION.** Ein angeordneter Körper heißt *ordnungsvollständig*, wenn jede nach oben beschränkte Menge ein Supremum besitzt und jede nach unten beschränkte Menge ein Infimum besitzt.

**Bemerkung.** Besitzt in einem angeordneten Körper jede nach oben beschränkte Menge ein Supremum, so besitzt auch jede nach unten beschränkte Menge ein Infimum. (Übung. Nutzt  $\inf M = -\sup(-M)$ ).

#### 4. Die Charakterisierung

**THEOREM.** (*Charakterisierung von  $\mathbb{R}$* ). Es ist  $\mathbb{R}$  der (bis auf Umbenennung) einzige angeordnete, ordnungsvollständige Körper.

*Beweis.* Es ist Existenz und Eindeutigkeit zu zeigen. Wir geben nur eine sehr grobe Skizze:

*Existenz.* Natürliche Zahlen werden mit Addition und Multiplikation versehen; dann Grothendieck Konstruktion für  $(\mathbb{N}, +)$ . Das liefert  $(\mathbb{Z}, +)$ . Tatsächlich kann man auch die Multiplikation fortsetzen in der offensichtlichen Weise. Nun Grothendieck Konstruktion auf  $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ . Das

liefert  $(\mathbb{Q}, \cdot)$ . Tatsächlich kann man auch die Addition fortsetzen. Das liefert  $(\mathbb{Q}, \cdot, +)$ . Nun Vervollständigen.

*Eindeutigkeit.* Konstruiere Abbildung von  $\mathbb{Q}$  in die rationalen Zahlen des Vergleichkörpers. Setze diese Abbildung fort.  $\square$

**Zeichnung.** Linie, 0, positive, negative Zahlen, Spiegelung. Keine Lücken!

Wir können die natürlichen Zahlen in natürlicher Weise als eine Teilmenge von  $\mathbb{R}$  auffassen.

**PROPOSITION.** (*Natürliche Zahlen als Teilmenge von  $\mathbb{R}$* ) Sei  $J : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  die eindeutige Abbildung (s.o.) mit

$$J(1) = 1_{\mathbb{R}} \text{ und } J(n+1) = J(n) + 1_{\mathbb{R}} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Dann ist  $J$  injektiv. Weiterhin ist  $J(\mathbb{N})$  abgeschlossen unter Bildung von Summen und Produkten (d.h. mit  $a, b \in J(\mathbb{N})$  gehören auch  $a + b$  und  $ab$  wieder zu  $J(\mathbb{N})$ ).

*Beweis. Injektivität:* Sei

$$L := \{n \in \mathbb{N} : J(n) \neq J(m) \text{ für alle } m \neq n\}.$$

Wir zeigen, daß  $L$  induktiv ist:

Vorüberlegung: Es gilt  $J(n) > 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Bew. Induktion ( $J(1) = 1_{\mathbb{R}} > 0$ ,  $J(n+1) = J(n) + 1_{\mathbb{R}} > 0$ .)

**Es gilt**  $e \in L$ . Sei  $m \neq e$ . Dann gilt  $m = k + 1$  für ein  $k \in \mathbb{N}$ . Damit folgt

$$J(m) = J(k+1) = J(k) + 1_{\mathbb{R}} = J(k) + J(1) > J(1).$$

Dabei verwenden wir im letzten Schritt die Vorüberlegung. Mit  $J(m) > J(1)$  folgt  $J(m) \neq J(1)$ .

$n \in L$  **impliziert**  $n+1 \in L$ . Sei  $m \neq n+1$ .

Falls  $m = 1$  so gilt nach dem schon bewiesenen  $J(m) \neq J(n+1)$  (da  $n+1 \neq 1$ ).

Falls  $m \neq 1$ , so gilt  $m = k+1$ . Wegen  $m \neq n+1$  und der Injektivität der Nachfolgeabbildung folgt  $k \neq n$ . Damit können wir unter Nutzen von  $J(n) \neq J(k)$  rechnen:

$$J(m) = J(k+1) = J(k) + 1_{\mathbb{R}} \neq J(n) + 1_{\mathbb{R}} = J(n+1).$$

Das liefert die Behauptung.

*Abgeschlossenheit unter Addition.* Sei

$$L := \{n \in \mathbb{N} : J(n) + J(m) \in J(\mathbb{N}) \text{ für alle } m \in \mathbb{N}\}.$$

Dann gilt  $1 \in L$  da  $J(1) + J(m) = 1_{\mathbb{R}} + J(m) = J(m) + 1_{\mathbb{R}} = J(m+1) \in J(\mathbb{N})$ . Weiterhin gilt  $n \in L \implies n+1 \in L$ , denn

$$J(n+1) + J(m) = J(n) + 1_{\mathbb{R}} + J(m) = J(n) + J(m+1) \in J(\mathbb{N}),$$

wobei  $n \in L$  für die letzten Schritt genutzt wurde.

*Abgeschlossenheit unter Multiplikation.* Analog. Sei

$$L := \{n \in \mathbb{N} : J(n)J(m) \in J(\mathbb{N}) \text{ für alle } m \in \mathbb{N}\}.$$

Dann gilt  $1 \in L$  da  $J(1)J(m) = 1_{\mathbb{R}}J(m) = J(m) \in J(\mathbb{N})$ . Weiterhin gilt  $n \in L \implies n+1 \in L$ , denn

$$J(n+1)J(m) = (J(n)+1_{\mathbb{R}})J(m) = J(n)J(m)+1_{\mathbb{R}}J(m) = J(n)J(m)+J(m) \in J(\mathbb{N}),$$

wobei Abgeschlossenheit unter Addition im letzten Schritt genutzt wurde.  $\square$

Die vorangegangene Proposition bietet die Möglichkeit auf den natürlichen Zahlen eine Multiplikation und eine Addition einzuführen gemäß

$$n+m := J^{-1}(J(n)+J(m)), \quad nm := J^{-1}(J(n)J(m)).$$

Es gilt dann (Übung. Nutzt Injektivität von  $J$ ):

$$\begin{aligned} n+1 &= \nu(n) \text{ sowie } n+\nu(m) = \nu(n+m) \text{ für alle } m \in \mathbb{N}. \\ 1n &= n \text{ sowie } \nu(k)n = kn+n \text{ für alle } k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Damit handelt es sich genau um die in einer Bemerkung des letzten Kapitel schon einmal kurz angedeutete Addition und Multiplikation. Aus den entsprechenden Eigenschaften der Addition und Multiplikation auf  $\mathbb{R}$  folgen sofort Assoziativität, Kommutativität der Addition und Multiplikation auf  $\mathbb{N}$  sowie das Distributivgesetz

$$(n+m)k = nk + mk.$$

**Wichtig!** Wir werden im folgenden immer  $\mathbb{N}$  als mit dieser Multiplikation und Addition ausgestattet voraussetzen und (oft) nicht zwischen  $\mathbb{N}$  und  $J(\mathbb{N})$  unterscheiden.

Neben den natürlichen Zahlen bilden noch die ganzen Zahlen

$$\mathbb{Z} := \{n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\}$$

und die rationalen Zahlen

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0 \right\}$$

wichtige Teilmengen der reellen Zahlen.

**Gute Nachricht.** Ab jetzt 'dürfen' wir in  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R}$  rechnen, wie wir es gewohnt sind. Dann wir haben die entsprechenden Objekte und Rechenregeln eingeführt bzw. bewiesen.

**Nach Hause nehmen:**  $\mathbb{R}$  charakterisiert durch Zusammenspiel von drei Strukturen: Körper, Anordnung, Ordnunsvollständigkeit. Die natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen und die rationalen Zahlen bilden Teilmengen von  $\mathbb{R}$  (die unter gewissen Operationen abgeschlossen sind).

Wir zeigen nun die Existenz von Wurzeln nichtnegativer reeller Zahlen. Diese Existenz beruht wesentlich auf der Ordnungsvollständigkeit. Sie gilt nicht im Körper der rationalen Zahlen (s.o.).

**THEOREM.** (*Existenz  $k$ -ter Wurzeln*) Sei  $k \in \mathbb{N}$ . Dann existiert für jedes  $x \geq 0$  ein eindeutiges  $y \geq 0$  mit  $y^k = x$ . Man definiert  $\sqrt[k]{x} := y$ . Es gilt  $\sqrt[k]{x} < \sqrt[k]{y}$  falls  $x < y$ .

*Beweis.* Der Fall  $x = 0$  ist klar. Wir betrachten nur noch  $x > 0$ .

*Eindeutigkeit:* Sei  $y^k = \tilde{y}^k$ . Ist  $y \neq \tilde{y}$ , so können wir ohne Einschränkung annehmen  $y < \tilde{y}$ . Das führt auf  $y^k < \tilde{y}^k$ . Widerspruch.

*Existenz:* Sei  $M := \{z \geq 0 : z^k \leq x\}$ . Dann ist  $M$  beschränkt (Falls  $x \leq 1$  ist 1 eine Schranke. Falls  $x > 1$  ist  $x$  eine Schranke.) Außerdem ist  $M$  nichtleer ( $0 \in M$ ). Damit hat  $M$  ein Supremum  $S$ . Wir zeigen  $S^k = x$ , indem wir  $S^k < x$  und  $S^k > x$  zum Widerspruch führen.

*Angenommen  $S^k < x$ :* Wir zeigen, daß dann auch  $(S + \varepsilon)^k < x$  für genügend kleine  $\varepsilon > 0$ . Widerspruch zu  $S$  obere Schranke.

Hier sind die Details:  $D := x - S^k > 0$ . Sei nun  $\varepsilon > 0$  mit

$$0 < \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k}{l} S^l (\varepsilon)^{k-l} < x - S^k = D.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} (S + \varepsilon)^k &= \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} S^l \varepsilon^{k-l} \\ &= S^k + \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k}{l} S^l \varepsilon^{k-l} \\ &< S^k + D \\ &= x. \end{aligned}$$

*Angenommen  $S^k > x$ :* Wir zeigen ähnlich wie im ersten Fall, daß dann auch  $(S - \varepsilon)^k > x$  für alle genügend kleinen  $\varepsilon > 0$ . Dann ist also  $S - \varepsilon$  eine obere Schranke von  $M$  und, offenbar, kleiner als  $S$ . Widerspruch:  $S$  kleinste obere Schranke.

*Monotonie:* Sei  $x < y$ . Nach der gezeigten Eindeutigkeit ist  $\sqrt[k]{x} \neq \sqrt[k]{y}$ . Wäre  $\sqrt[k]{x} > \sqrt[k]{y}$ , so folgte  $x = (\sqrt[k]{x})^k > (\sqrt[k]{y})^k = y$ . Widerspruch.  $\square$

Für rationale Zahlen  $a = m/n$  mit  $m, n \in \mathbb{N}$  und  $x \geq 0$  kann man dann definieren

$$x^a := (x^m)^{\frac{1}{n}} = (x^{\frac{1}{n}})^m.$$

Das ist wohldefiniert i.e. es gilt die zweite Gleichung und es hängt nicht von der Darstellung der rationalen Zahl ab. Für reelles  $s > 0$  und  $x \geq 0$  definiert man dann

$$x^s := \sup\{x^q : q \in \mathbb{Q} : 0 < q \leq s\}.$$

Auch das ist wohldefiniert i.e. stimmt für rationale  $s$  mit der schon gegebenen Definition überein. Schliesslich definiert man für  $a > 0$  und  $x > 0$  noch

$$x^{-a} := \frac{1}{x^a}.$$

Dann kann man folgende Rechenregeln zeigen:

$$x^b x^c = x^{b+c}$$

$$(x^b)^c = x^{bc}$$

$$x^c y^c = (xy)^c.$$

für  $x, y > 0$  und  $b, c$  reell. Wir werden diese Definitionen und Rechenregeln später als Nebenprodukt erhalten. Darum geben wir hier keine weiteren Details.

**Bemerkung.** Der Ausdruck  $0^0$  stellt ein Problem dar:

$a^0 = 1$  für alle  $a > 0$ . Das suggeriert  $0^0 = 1$ .

$0^s = 0$  für alle  $s > 0$ . Das suggeriert  $0^0 = 0$ .

Daher muss man diesen Fall getrennt und kontextabhängig behandeln.

## KAPITEL 3

### Archimedisches Axiom und Intervallschachtelungsprinzip

Die Ordnungsvollständigkeit von  $\mathbb{R}$  ist von entscheidender Bedeutung für alle weiteren Untersuchungen. Sie kann in zwei Aspekte 'zerlegt' werden, nämlich Gültigkeit des Archimedischen Axiom und Konvergenz gewisser Folgen. Eine Möglichkeit, Konvergenz von Folgen zu fassen, liefert das Intervallschachtelungsprinzip. Das behandeln wir in diesem Abschnitt. Ausführliche weitere Untersuchungen zu Konvergenz von Folgen finden sich im kommenden Kapitel.

#### 1. Das Archimedische Axiom

In diesem Abschnitt lernen wir noch eine weitere Eigenschaft der reellen Zahlen kennen, die in unserem Zugang eine Folgerung ist. Das Archimedische Axiom liefert insbesondere Existenz von Nullfolgen und Dichtheit von  $\mathbb{Q}$  in  $\mathbb{R}$ .

**LEMMA.** (*Charakterisierung Archimedisches Axiom*) Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann sind äquivalent:

- (i) Für alle  $x > 0$  existiert ein  $m \in \mathbb{N}$  mit  $x < m1$ . **Zeichnung**
- (ii) Für alle  $\epsilon > 0$  existiert ein  $m \in \mathbb{N}$  mit  $\frac{1}{m1} < \epsilon$ . **Zeichnung**
- (iii) Für alle  $x, y > 0$  existiert ein  $m \in \mathbb{N}$  mit  $y < mx$  oder, äquivalent,  $y/(m1) < x$ .

*Beweis.* (iii)  $\implies$  (ii): Das folgt sofort mit  $x = \epsilon$  und  $y = 1$ .

(ii)  $\implies$  (i): (Nach (ii) angewendet auf  $\epsilon = 1/x$ ) existiert ein  $m \in \mathbb{N}$  mit  $1/m1 < 1/x$ . Damit folgt dann durch Bilden des Kehrwertes  $x < m1$ .

(i)  $\implies$  (iii): Wähle nach (i) ein  $m \in \mathbb{N}$  mit  $1/x < m1$  also  $1/(m1) < x$ . Wähle weiter nach (i) ein  $l \in \mathbb{N}$  mit  $y/(l1) < 1$ . Dann gilt für  $k = lm \in \mathbb{N}$  also

$$\frac{y}{(lm)1} = \frac{1}{m1} \frac{y}{l1} < \frac{1}{m1} 1 < x.$$

□

**DEFINITION.** (*Archimedisches Axiom*) Ein angeordneter Körper  $K$  erfüllt das Archimedische Axiom, wenn eine der äquivalenten Eigenschaften des vorigen Lemma gilt.



**FOLGERUNG.** (*Dichtheit von  $\mathbb{Q}$* ) Sei  $K$  ein angeordneter Körper, der das Archimedische Axiom erfüllt. Dann gibt es zu  $x, y \geq 0$  mit  $x < y$  Elemente  $n, m \in \mathbb{N}$  mit  $x < n/m < y$ . Insbesondere existiert zu jedem  $x \geq 0$  und  $\varepsilon > 0$  Elemente  $n, m \in \mathbb{N}$  mit  $|x - n/m| < \varepsilon$ . Für  $x \leq 0$  gilt entsprechendes, wenn man  $m/n$  durch  $-m/n$  ersetzt.

*Beweis.* Sei  $\delta := y - x > 0$ . Dann existiert nach dem Archimedischen Axiom ein  $m \in \mathbb{N}$  mit  $1 < m\delta = my - mx$ .

Beh. Es gibt ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $mx < n < my$ .

Bew. Angenommen, die Behauptung gilt nicht. Dann ist die Menge  $L := \{k \in \mathbb{N}_0 : k \leq mx\}$  induktiv. (Denn  $0 \in L$ : klar.  $k \in L \implies k+1 \in L$ : Sonst  $k \leq mx$  und  $(k+1) > mx$ , also  $k \leq mx < (k+1) < my$  Widerspruch). Daher gilt  $L = \mathbb{N}_0$ . Das ist ein Widerspruch zum Archimedischen Axiom.

Sind  $n, m$  wie in der Behauptung, so folgt nach Division durch  $m$  also  $x < n/m < y$ .  $\square$

**Bemerkung.** In einem angeordneten Körper  $K$ , der das Archimedische Axiom erfüllt gilt dann also für jedes  $s \in K$  mit  $s > 0$

$$s = \sup\left\{\frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N}, \frac{n}{m} < s\right\} = \inf\left\{\frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N}, \frac{n}{m} > s\right\}$$

und entsprechend für negative  $s$ .

**FOLGERUNG.** Sei  $K$  ein angeordneter Körper, der das Archimedische Axiom erfüllt.

(a) Sei  $a > 1$ . Dann existiert zu jedem  $C \in K$  ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $a^n > C$ .

(b) Sei  $0 < a < 1$ . Dann existiert zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $0 < a^n < \varepsilon$ .

*Beweis.* (a) Das folgt aus der Bernoulli Ungleichung:  $a = 1 + \delta$  mit  $\delta > 0$ . Also

$$a^n = (1 + \delta)^n \geq 1 + n\delta > C.$$

Hier wird im letzten Schritt das Archimedische Axiom verwendet.

(b) Das folgt aus (a) durch Bilden des Kehrwertes.  $\square$

**THEOREM.** (*Archimedisches Axiom*) In  $\mathbb{R}$  gilt das archimedische Axiom.

*Beweis.* Zu zeigen: Sind  $x, y > 0$  so existiert ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $ny > x$ . Wir nehmen an, daß die Aussage nicht gilt. Dann ist die Menge

$$M := \{ny : n \in \mathbb{N}\}$$

also nach oben beschränkt (durch  $x$ ) und besitzt aufgrund der Ordnungsvollständigkeit ein Supremum  $S$ .

$\implies (n+1)y \leq S$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ ,

$\implies ny \leq S - y$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

← Ende der 8. Vorlesung

$\implies S - x$  ist obere Schranke von  $M$ . Widerspruch. □

**Bemerkung.** Auch in  $\mathbb{Q}$  gilt das Archimedische Axiom (Warum?  $n/m \leq n$ ). Nicht in jedem angeordneten Körper gilt das Archimedische Axiom (--- > Nichtstandard Analysis).

## 2. Intervallschachtelungsprinzip

In diesem Abschnitt lernen wir eine weitere Konsequenz der Ordnungsvollständigkeit kennen.

Zunächst einige Bezeichnungen. Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann definiert man für  $a \leq b$  die Intervalle:

- $[a, b] := \{x \in K : a \leq x \leq b\}$  abgeschlossenes Intervall.
- $(a, b) := \{x \in K : a < x < b\}$  offenes Intervall (kann leer sein)
- $(a, b] := \{x \in K : a < x \leq b\}$  nach links halboffenes Intervall.
- $[a, b) := \{x \in K : a \leq x < b\}$  nach rechts halboffenes Intervall.

Es heißen dann  $a, b$  die Randpunkte des Intervalles und  $|I| := b - a$  die Länge des Intervalles.

Idee zur Intervallschachtelung: Eine geschachtelte Folge von Intervallen, die sich zusammenziehen. **Zeichnung.**

**DEFINITION.** Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Eine Familie  $I_n, n \in \mathbb{N}$ , von abgeschlossenen Intervallen in  $K$  heißt Intervallschachtelung, wenn gilt

- $I_{n+1} \subset I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  ('Geschachtelt')
- $|I_n| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$  (d.h. für alle  $\epsilon > 0$  existiert ein  $n(\epsilon) \in \mathbb{N}$  mit  $|I_n| < \epsilon$  für alle  $n \geq n_\epsilon$ ). ('Zusammenziehen')

**DEFINITION.** (Intervallschachtelungsprinzip) Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann erfüllt  $K$  das Intervallschachtelungsprinzip, wenn es zu jeder Intervallschachtelung  $I_n, n \in \mathbb{N}$ , einen Punkt  $x \in K$  gibt mit  $x \in I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

### Zeichnung.

**Bemerkung.** Ist  $I_n, n \in \mathbb{N}$ , eine Intervallschachtelung, so kann es höchstens einen Punkt geben, der zu allen  $I_n$  gehört. Ein solcher Punkt ist also eindeutig.

(Bew. Seien  $x$  und  $y$  zwei solcher Punkte, so gilt  $|x - y| \leq |I_n|$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  (da  $x, y \in I_n$ ). Wegen  $|I_n| \rightarrow 0$  gilt dann  $|x - y| \leq \epsilon$  für alle  $\epsilon > 0$ . Damit folgt  $|x - y| = 0$ .)

**THEOREM.** In  $\mathbb{R}$  gilt das Intervallschachtelungsprinzip.

*Beweis.* Es bilden die Intervalle  $I_n = [a_n, b_n]$  eine Intervallschachtelung. Zu zeigen: Es gibt ein  $x \in \mathbb{R}$  mit  $x \in I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Es gilt (Induktion)  $I_m \subset I_n$  für alle  $m \geq n$ . Damit folgt

$$a_m \leq b_n \quad (*)$$

für alle  $n, m \in \mathbb{N}$ . (Fallunterscheidung  $n \leq m : a_m \leq b_m \leq b_n$  und  $m < n : a_m \leq a_n \leq b_n$ . Zeichnung). Damit ist also die Menge

$$M := \{a_m : m \in \mathbb{N}\}$$

beschränkt (zum Beispiel durch  $b_1$ ). Aufgrund der Ordnungsvollständigkeit existiert dann also

$$x := \sup M.$$

Da  $x$  eine obere Schranke von  $M$  ist gilt

$$a_m \leq x \quad (**)$$

für alle  $m \in \mathbb{N}$ . Weiterhin ist aufgrund von  $(*)$  aber jedes  $b_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , eine obere Schranke von  $M$  und es gilt dann (aufgrund der Supremumseigenschaft) also

$$x \leq b_n \quad (***)$$

für jedes  $n \in \mathbb{N}$ . Mit  $(**)$  und  $(***)$  folgt  $x \in I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .  $\square$

**Bemerkung.** Der obige Schluss nutzt nicht, daß sich die Intervalle zusammenziehen. Er funktioniert für jede Folge von ineinander enthaltenen Intervallen. Genauer gilt (Übung): Ist  $I_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , eine Folge von abgeschlossenen Intervallen  $I_n = [a_n, b_n]$  in  $\mathbb{R}$  mit  $I_{n+1} \subset I_n$  für jedes  $n \in \mathbb{N}$ , so gilt

$$S := \cap I_n = [\sup a_n, \inf b_n].$$

Insbesondere ist  $S$  also nichtleer und ein Intervall. Wenn sich diese Intervalle zusammenziehen, so besteht  $S$  nur aus einem Punkt. Ein entsprechende Aussage gilt im Allgemeinen nicht, wenn die Intervalle nicht abgeschlossen sind.

### 3. Eine Äquivalenz

**THEOREM.** Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann sind äquivalent:

- (i) Es ist  $K$  ordnungsvollständig (d.h.  $K = \mathbb{R}$ ).
- (ii) Für  $K$  gilt das Intervallschachtelungsprinzip und das Archimedische Axiom.

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii): Die entsprechenden Aussagen wurden in den beiden vorigen Abschnitten gezeigt.

(ii)  $\implies$  (i): Sei  $M$  eine nach oben beschränkte Menge in  $K$ . Zu zeigen:  $M$  hat ein Supremum.

Sei  $C$  eine obere Schranke von  $M$ . Sei  $u \in K$  keine obere Schranke von  $M$  z.B.  $u = y - 1$  für ein  $y \in M$ . Wir konstruieren induktiv Intervalle  $I_n = [a_n, b_n]$  mit

- Alle  $b_n$  sind obere Schranken von  $M$ .
- Alle  $a_n$  sind keine oberen Schranken von  $M$ .

- $I_{n+1} \subset I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .
- $|I_{n+1}| = \frac{1}{2}|I_n|$ .

Dann bilden die  $I_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , eine Intervallschachtelung (die letzte Eigenschaft liefert nach dem Archimedischen Axiom, daß  $|I_n| = \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ ). Für den gemeinsamen Punkt  $x$  aller  $I_n$  (der nach Voraussetzung existiert) gilt dann

- $x$  ist obere Schranke (sonst  $z \in M$  mit  $x < z$  Widerspruch zu  $b_n$  beliebig nahe an  $x$  für große  $n$  und  $b_n$  obere Schranke. Zeichnung)
- Es gibt keine kleinere obere Schranke als  $x$  (sonst  $m \leq z < x$ , für alle  $m \in M$ . Widerspruch zu  $a_n$  beliebig nahe an  $x$  für große  $n$  und  $a_n$  keine obere Schranke. Zeichnung)

Nun zur Konstruktion: Wir setzen  $I_1 := [u, C]$ . Seien  $I_1, \dots, I_n$  wie oben schon konstruiert und  $I_n = [a_n, b_n]$ . Sei

$$m := (a_n + b_n)/2$$

der Mittelpunkt von  $I_n$ . Wir unterscheiden zwei Fälle (Zeichnung):

*Fall 1:*  $m$  ist obere Schranke von  $M$ . Wir setzen  $I_{n+1} := [a_n, m]$ . Zeichnung.

*Fall 2:*  $m$  ist keine obere Schranke von  $M$ . Wir setzen  $I_{n+1} := [m, b_n]$ .

Dann hat  $I_{n+1}$  die gewünschten Eigenschaften.

Zeichnung 'konvergierende Intervalle'. □

## KAPITEL 4

### Konvergenz von Folgen in $\mathbb{R}$

In diesem Kapitel lernen wir das zentrale Konzept der Analysis kennen, nämlich das Konzept des Grenzwertes. Es ist grundlegend für alle weiteren Untersuchungen und (in gewisser Weise) das schwierigste Konzept der Analysis.

#### 1. Definitionen und Rechenregeln

**DEFINITION.** (*Folge*) Sei  $X$  eine Menge. Eine Abbildung  $x : \mathbb{N} \rightarrow X$  heißt Folge (in  $X$ ).

**Notation.**  $(x_n)$  oder  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  oder  $(x_n)_n$ .

**Beispiele.**

- Sei  $c \in \mathbb{R}$  beliebig und  $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \mapsto c$ , also  $x_n = c$  für alle  $n$ . Dann heißt  $(x_n)$  die konstante Folge mit Wert  $c$ .
- $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \mapsto (-1)^n$ , also  $x_n = (-1)^n$ .
- $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \mapsto \frac{1}{n}$ , also  $x_n = \frac{1}{n}$ .

Wir kommen nun zu einem zentralen Begriff der Analysis, dem Begriff der **Konvergenz**.

**Idee.** Die Folge  $(x_n)$  konvergiert gegen den Wert  $x$ , wenn für alle genügend großen  $n$  die Zahl  $x_n$  der Zahl  $x$  beliebig nahe ist.

Es wird nun darum gehen, diese Idee präzise zu fassen. Das verlangt Arbeit, da es um das Verhalten der Folge im Unendlichen geht.

**DEFINITION.** (*Konvergenz*) Die Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{R}$  konvergiert gegen  $x$ , wenn zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  existiert, sodaß für alle  $n \geq n_\varepsilon$  gilt  $|x_n - x| < \varepsilon$ . Dann heißt  $x$  Grenzwert der Folge  $(x_n)$ . Eine Folge, die nicht gegen ein  $x$  konvergiert heißt divergent.

**Zeichnung**  $\varepsilon$ - Falle

←-----→  
Ende der 9. Vorlesung

**Zeichnung.**  $\varepsilon$ - Schlauch

**Wichtig.** Eine Folge  $(x_n)$  kann nicht gegen zwei verschiedene Grenzwerte konvergieren (d.h. der Grenzwert ist eindeutig, wenn er existiert).

Bew: Es konvergiere  $(x_n)$  gegen  $x$  und gegen  $y$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann gibt es also  $n_x$  mit  $|x - x_n| < \varepsilon$  für  $n \geq n_x$ , und es gibt  $n_y$  mit  $|y - x_n| < \varepsilon$  für  $n \geq n_y$ . Mit  $n \geq n_x, n_y$  gilt dann also

$$|x - y| = |x - x_n + x_n - y| \leq |x - x_n| + |x_n - y| < 2\varepsilon.$$

Da  $\varepsilon > 0$  beliebig war, folgt  $|x - y| = 0$ , also  $x = y$ .

Aufgrund der Eindeutigkeit kann man von **dem Grenzwert** einer Folge sprechen (falls existent). Man verwendet folgende

**Notation.** Konvergiert  $(x_n)$  gegen  $x$ , so schreibt man auch

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ oder } x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$$

und nennt  $x$  den Grenzwert der Folge  $(x_n)$ .

**DEFINITION.** Eine Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{R}$  mit  $x_n \rightarrow 0$  heisst Nullfolge.

**Bemerkung.** Diese und ähnliche Definitionen lassen sich mit sogenannten Quantoren ausdrücken. Wir werden in dieser Vorlesung kaum Quantoren benutzen (aber die zugrundeliegenden Konzepte natürlich ständig verwenden). In Quantoren lautet die Definition von Konvergenz einer Folge:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\varepsilon |x - x_n| < \varepsilon.$$

Hier: '∀◇' steht für 'Für alle ◇ gilt:'

'∃♣' steht für 'Es existiert ♣ mit der Eigenschaft, daß / sodaß...'. Damit ergibt sich auch, daß Quantoren immer an den Anfang der Aussage gestellt werden müssen.

**Bemerkung.** (Konvergenz entscheidet sich ganz weit draussen):  $x_n \rightarrow x$ . Sei  $N > 0$  und  $(y_n)$  Folge mit  $x_n = y_n$  für  $n \geq N$ . Dann gilt  $y_n \rightarrow x$ .  
Bew. Sei  $\varepsilon > 0$ . Es existiert ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit  $|x_n - x| < \varepsilon$  für  $n \geq n_\varepsilon$ . Für  $n \geq n_\varepsilon, N$  gilt also

$$|y_n - x| = |x_n - x| < \varepsilon.$$

### Drei Beispiele.

- Sei  $c \in \mathbb{R}$ . Dann ist die konstante Folge  $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, x_n = c$ , konvergent gegen  $c$ .

Bew...

- Sei  $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, x_n = \frac{1}{n}$ . Dann konvergiert  $x_n$  gegen 0.

Bew. Das folgt aus dem Archimedischen Axiom.

In gewisser Weise ist dies die einzige explizite konvergente Folge, die wir kennen.

- Sei  $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_n = (-1)^n$  d.h.  $x_n = -1$  für ungerade  $n$  und  $x_n = 1$  für gerade  $n$ . Dann ist  $(x_n)$  nicht konvergent.

Bew. Wir beweisen ein allgemeines Kriterium.

Beh. Ist  $(x_n)$  eine konvergente Folge in  $\mathbb{R}$ , so ist die Folge  $y_n := x_{n+1} - x_n$  eine Nullfolge (d.h. konvergent gegen 0).

Bew. ...

Mit diesem allgemeinen Kriterium sieht man sofort, daß  $x_n = (-1)^n$  nicht konvergiert, da  $y_n$  immer den Betrag 2 hat.

Wir geben jetzt noch eine leichte Umformulierung der Definition von Konvergenz. Zu  $x \in \mathbb{R}$  und  $\varepsilon > 0$  sei die  $\varepsilon$ -Umgebung (oder  $\varepsilon$ -Kugel um  $x$ )  $U_\varepsilon(x)$  von  $x$  definiert durch

$$U_\varepsilon(x) := \{z \in \mathbb{R} : |z - x| < \varepsilon\}.$$

Es gilt also

$$U_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon).$$

Eine solche Umgebung ist dann nichts anderes als ein offenes Intervall um  $x$ . In diesem Sinne hätten wir das Konzept der Umgebung also nicht neu einführen müssen. Für spätere Verallgemeinerungen erweist sich aber das Denken mit Umgebungen als sehr nützlich.

**Bemerkung.** Allgemein nennt man eine Menge  $U$  Umgebung von  $x \in \mathbb{R}$ , wenn es ein  $\varepsilon > 0$  gibt mit  $U_\varepsilon(x) \subset U$ .

**PROPOSITION.** (*Charakterisierung Konvergenz*) Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ . Dann sind äquivalent:

- (i)  $(x_n)$  konvergiert gegen  $x$
- (ii) Für alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  so daß für alle  $n \geq n_\varepsilon$  gilt  $x_n \in U_\varepsilon(x)$ .
- (iii) Für alle  $\varepsilon > 0$  ist die Menge  $\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U_\varepsilon(x)\}$  endlich (d.h. für jedes feste  $\varepsilon > 0$  liegen bis auf endlich viele Ausnahmen alle  $x_n$  in der  $\varepsilon$ -Umgebung von  $x$ ).

*Beweis.* Die Äquivalenz von (i) und (ii) ist klar. (Denn:  $z \in U_\varepsilon(x) \iff |z - x| < \varepsilon$ .)

(ii)  $\iff$  (iii): Eine Teilmenge von  $\mathbb{N}$  ist genau dann endlich, wenn ab einem gewissen  $n_0$  keine natürliche Zahl mehr dazu gehört.  $\square$

Bevor wir uns der Existenz konvergenter Folgen widmen, sammeln wir hier schon einmal ein paar nützliche Eigenschaften.

**FOLGERUNG.**  $(x_n)$  konvergent  $\implies (x_n)$  beschränkt (d.h. die Menge  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  ist beschränkt d.h. es existiert  $C > 0$  mit  $|x_n| \leq C$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ ).

*Beweis.* Sei  $x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . Für  $n \geq n_1$  gilt  $|x - x_n| < 1$ , also

$$|x_n| = |x_n - x + x| \leq |x_n - x| + |x| \leq 1 + |x|.$$

Damit folgt

$$|x_n| \leq \max\{|x_1|, \dots, |x_{n_1-1}|, 1 + |x|\}$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$ . □

**Bemerkung.** Beschränktheit einer Folge hängt nicht von den ersten endlich vielen Gliedern ab.

Die folgenden Eigenschaften zeigen insbesondere, daß Konvergenz mit den Operationen  $+$ ,  $\cdot$ ,  $:$  und  $|\cdot|$  verträglich ist.

**PROPOSITION.** (*Rechenregeln*) Seien  $(x_n)$  und  $(y_n)$  Folgen in  $\mathbb{R}$ . Dann gilt.

(a)  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y \implies x_n + y_n \rightarrow x + y$ .

(b)  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y \implies x_n y_n \rightarrow xy$ . Insbesondere  $\alpha x_n \rightarrow \alpha x$  für  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

(c)  $x_n \rightarrow x$ , und  $y_n \rightarrow y$  mit  $y \neq 0 \implies y_n \neq 0$  für  $n \geq n_0$  und  $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{x}{y}$ .

**Bemerkung.** Später: Die Abbildungen  $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \rightarrow x + y$ ,  $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \rightarrow xy$  und  $:: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x/y$  sind stetig.

*Beweis.* (a) Sei  $\varepsilon > 0$ . Wegen  $x_n \rightarrow x$  gibt es ein  $n_x$  mit  $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$  für  $n \geq n_x$ . Wegen  $y_n \rightarrow y$  gibt es ein  $n_y$  mit  $|y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2}$  für  $n \geq n_y$ . Für  $n \geq n_\varepsilon := \max\{n_x, n_y\}$  gilt dann also nach Dreiecksungleichung

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

←  
Ende der 10. Vorlesung

(b) Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig.

Wähle  $C > 0$  mit  $|x_n| \leq C$  für alle  $n$ . Wegen  $x_n \rightarrow x$  existiert  $n_x \in \mathbb{N}$  mit  $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2|y|+1}$ . Wegen  $y_n \rightarrow y$  existiert  $n_y \in \mathbb{N}$  mit  $|y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2C}$ . Damit gilt für  $n \geq \max\{n_x, n_y\}$  also

$$|x_n y_n - xy| = |x_n y_n - x_n y + x_n y - xy| \leq |x_n| |y_n - y| + |y| |x_n - x| \dots$$

(c) Wegen  $y_n \rightarrow y$  existiert ein  $n_0$  mit  $|y_n - y| < \frac{|y|}{2}$  für  $n \geq n_0$ . Damit gilt also für  $n \geq n_0$

$$|y_n| \geq |y| - |y_n - y| > |y|/2 > 0.$$

Sei nun  $\varepsilon > 0$  beliebig. Wegen  $x_n \rightarrow x$  existiert ein  $n_x$  mit

$$|x_n - x| < \frac{\varepsilon|y|}{4}$$

für alle  $n \geq n_1$ . Wegen  $y_n \rightarrow y$  existiert ein  $n_y$  mit

$$|y_n - y| < \frac{\varepsilon|y|^2}{2|x| + 1}.$$



Für  $n \geq \max\{n_x, n_y, n_1\}$  gilt dann

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{x}{y} \right| &= \left| \frac{yx_n - xy_n}{yy_n} \right| \\ &\leq \frac{2}{|y|^2} |yx_n - xy_n| \\ &\leq \frac{2}{|y|^2} (|y||x_n - x| + |x||y_n - y|) \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**PROPOSITION.** (*Stetigkeit des Betrages*)

Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ . Dann gilt:  $x_n \rightarrow x \implies |x_n| \rightarrow |x|$ .

*Beweis.* Das folgt sofort aus der zweiten Dreiecksungleichung

$$||x_n| - |x|| \leq |x - x_n|.$$

$\square$

**PROPOSITION.** (*Verträglichkeit von Konvergenz mit  $\leq$* ) Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$  mit  $x_n \leq c$  /  $x_n \geq c$  und  $x_n \rightarrow x$ . Dann gilt  $x \leq c$  /  $x \geq c$ .

*Beweis.* Wir betrachten  $x_n \leq c$ . Angenommen  $x > c$ . Dann ist  $\varepsilon := x - c > 0$ . Wegen  $x_n \rightarrow x$  müsste gelten  $x_n \in U_\varepsilon(x)$  für große  $n$ , also  $x_n > c$ . Widerspruch.  $\square$

**Bemerkung.**  $x_n < c$  /  $x_n \rightarrow x$  impliziert nicht  $x < c$ . Beispiel  $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ . Dann  $x_n < 1$ , aber  $x = \lim x_n = 1$

**PROPOSITION.** Seien  $(x_n)$  und  $(y_n)$  Folgen in  $\mathbb{R}$  und  $x, y \in \mathbb{R}$  mit  $x_n \rightarrow x$  und  $y_n \rightarrow y$ . Dann gilt  $\max\{x_n, y_n\} \rightarrow \max\{x, y\}$  und  $\min\{x_n, y_n\} \rightarrow \min\{x, y\}$ .

*Beweis.* Es gilt

$$\min\{a, b\} = \frac{a + b - |a - b|}{2}, \quad \max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

Nun folgt die Behauptung aus den schon gezeigten Aussagen.  $\square$

**THEOREM.** (*Sandwichtheorem*) Seien  $L \in \mathbb{R}$  und konvergente Folgen  $(x_n)$  und  $(y_n)$  in  $\mathbb{R}$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  gegeben. Ist  $(z_n)$  eine weitere Folge in  $\mathbb{R}$  mit  $x_n \leq z_n \leq y_n$  für alle  $n$  ab einem gewissen  $n_0 \in \mathbb{N}$ , so konvergiert  $(z_n)$  ebenfalls gegen  $L$ .

*Beweis.* **Zeichnung.**

Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig.

Wegen  $L = \lim x_n$  gibt es ein  $n_x \in \mathbb{N}$  mit  $x_n \geq L - \varepsilon$  für alle  $n \geq n_x$ .

Wegen  $L = \lim y_n$  gibt es ein  $n_y \in \mathbb{N}$  mit  $y_n \leq L + \varepsilon$  für alle  $n \geq n_y$ .

Für  $n \geq n_x, n_y, n_0$  gilt dann also

$$L - \varepsilon \leq x_n \leq z_n \leq y_n \leq L + \varepsilon$$

und damit

$$|z_n - L| < \varepsilon.$$

Da  $\varepsilon > 0$  beliebig war, folgt die Behauptung.  $\square$

Es ist sinnvoll in gewissen Fällen auch  $\pm\infty$  als Wert zuzulassen:

Eine Folge in  $\mathbb{R}$ , die nicht konvergiert, heißt divergent.

Unter den divergenten Folgen in  $\mathbb{R}$  gibt es zwei Klassen von Folgen mit besonders guten Eigenschaften:

- Eine Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{R}$  heißt bestimmt divergent gegen  $\infty$ ,  $x_n \rightarrow \infty$ , wenn für jedes  $C \in \mathbb{R}$  ein  $n_C \in \mathbb{N}$  existiert mit  $x_n \geq C$  für alle  $n \geq n_C$ .
- Eine Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{R}$  heißt bestimmt divergent gegen  $-\infty$ ,  $x_n \rightarrow -\infty$ , wenn für jedes  $C \in \mathbb{R}$  ein  $n_C \in \mathbb{N}$  existiert mit  $x_n \leq C$  für alle  $n \geq n_C$ .

Bei vorsichtigem Umgang mit  $\infty$  bleiben einige Rechenregeln für konvergente Folgen auch für bestimmt divergente Folgen noch gültig. Eine **wichtige Ausnahme** stellt der Umgang mit Termen der Form  $0 \cdot \infty$  dar (siehe Übung).

Ähnlich kann man für Supremum und Infimum von unbeschränkten Mengen verfahren:

- Sei  $M$  eine Teilmenge von  $\mathbb{R}$ . Ist  $M$  nicht nach oben / unten beschränkt, so setzen wir  $\sup M = \infty$  /  $\inf M = -\infty$ .

**Beachte.** (a)  $\sup M = \infty \iff$  existiert Folge  $(x_n)$  in  $M$  mit  $x_n \rightarrow \infty$ . Entsprechend für Infimum.

(b)  $x_n \rightarrow \infty \iff 1/x_n \rightarrow 0$  und  $x_n \geq 0$  für  $n$  groß

**Beispiel.**  $\sqrt[n]{n!} \rightarrow \infty$ ,  $n \rightarrow \infty$ .

Bew.  $n! = n(n-1) \cdots 1 \geq n/2 \cdots n/2 = (n/2)^{n/2}$ . ( $n/2$ -Faktoren).

Damit  $\sqrt[n]{n!} \geq \sqrt[n]{(n/2)^{n/2}} = (n/2)^{1/2} \rightarrow \infty$ .

Mit den bisherigen Betrachtungen können wir Konvergenz einiger Folgen untersuchen.

**Beispiele.** (a) Für jedes  $a \neq 0$  konvergiert  $(a/n)$  gegen 0. (Nullfolge).

Bew. Archimedes oder Rechenregeln  $a/n = a \cdot \frac{1}{n}$ .

(b) (Exponentielles Fallen) Sei  $0 < q < 1$ . Dann konvergiert  $x_n = q^n$  gegen 0.

Bew. Das ist eine Folgerung aus dem Archimedischen Axiom und wurde oben schon behandelt. ( $0 < q < 1$  impliziert  $1/q = 1 + a$  mit  $a > 0$ . Bernoulli impliziert dann  $(1/q)^n \geq 1 + na$ . und damit  $0 < q^n \leq \frac{1}{na+1} \leq \frac{1}{an} = \frac{1}{a} \frac{1}{n}$ . Nun Sandwichtheorem und Beispiel (a).)

(c) Verallgemeinerung von (b): (Exponentielles Fallen schlägt polynomielles Wachsen): Sei  $0 < q < 1$  und  $k \in \mathbb{N}$ . Sei  $x_n = q^n n^k$ . Dann gilt  $x_n \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ .

**Beachte.**  $q^n \rightarrow 0$ , aber  $n^k \rightarrow \infty$  für  $k > 1$ . Die Frage ist also, welcher Effekt sich durchsetzt.

Bew. Plan: Schreibe  $q^n$  also  $p^{2kn} = p^{kn} p^{kn}$  mit geeignetem  $p$ . Dann gilt also

$$q^n n^k = p^{kn} p^{kn} n^k = p^{kn} (p^{kn} n^k).$$

Erster Term gegen Null; zweiter Term beschränkt.

Hier sind die Details:  $p := \sqrt[2k]{q} < 1$ .

Also  $1/p = 1 + a$  mit  $a > 0$ . Bernoulli impliziert  $(1/p)^n \geq 1 + na$  und damit  $0 < p^n < \frac{1}{na}$ . Mit  $0 \leq q^n = p^{2kn}$  folgt also

$$0 \leq q^n n^k \leq p^{kn} p^{kn} n^k \leq p^{kn} \left(\frac{1}{na}\right)^k n^k = p^{kn} \left(\frac{1}{a}\right)^k.$$

Damit folgt die Aussage aus (b) und dem Sandwichtheorem.

(d) Sei  $a > 0$  und  $x_n = \sqrt[n]{a}$ . Dann gilt  $x_n \rightarrow 1$ ,  $n \rightarrow \infty$ .

Bew. Wir unterscheiden drei Fällen:

$a = 1$ . Das ist einfach.

$a > 1$ : Wegen  $a > 1$  und  $a = x_n^n$  gilt  $x_n > 1$ . Weiterhin  $a = x_n^n = (1 + (x_n - 1))^n \geq 1 + n(x_n - 1)$   
 $\implies (a - 1)/n \geq x_n - 1 \geq 0$ ,  
 $\implies (a - 1)/n + 1 \geq x_n \geq 1$ .

Damit folgt nach (a) und dem Sandwichtheorem  $x_n \rightarrow 1$ .

$0 < a < 1$ : Das folgt nach Bilden des Kehrwertes aus dem schon bewiesenen.

(e) Verallgemeinerung von (d): Sei  $x_n = \sqrt[n]{n}$ . Dann gilt  $x_n \rightarrow 1$ ,  $n \rightarrow \infty$ .

**Beachte.** Wettstreit zwischen  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$  und  $n \rightarrow \infty$  für  $n \rightarrow \infty$ . Die Frage ist also, welcher Effekt sich durchsetzt.

Bew. Es gilt  $x_n^n = n$ , also insbesondere  $x_n > 1$ . Mit binomischem Satz folgt

$$n = (1 + (x_n - 1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (x_n - 1)^k \geq \binom{n}{2} (x_n - 1)^2 = \frac{n(n-1)}{2} (x_n - 1)^2,$$

also

$$\sqrt{\frac{2}{n-1}} \geq x_n - 1 \geq 0,$$

also

$$1 \leq x_n \leq 1 + \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

Mit  $\frac{2}{n-1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ , folgt auch  $\sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$  (Denn:  $0 \leq a < \varepsilon^2 \implies 0 \leq \sqrt{a} < \varepsilon$ .) Daher folgt Behauptung aus dem Sandwichtheorem.

## 2. Aspekte der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit von  $\mathbb{R}$  liefert die Konvergenz ganzer Klassen von Folgen. Tatsächlich ist diese Konvergenz zusammen mit dem Archimedischen Axiom ein Charakteristikum der reellen Zahlen. Das wird in diesem Abschnitt studiert.

← Ende der 11. Vorlesung

**DEFINITION.** Eine Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{R}$  heißt *monoton wachsend / fallend* wenn  $x_{n+1} \geq x_n / x_{n+1} \leq x_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt.

Eine Folge  $(x_n)$  heißt *nach oben / unten beschränkt*, wenn die Menge  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  nach oben / unten beschränkt ist.

**Zeichnungen einer nach oben beschränkten monotonen Folge:** auf der Achse, oder als Graph...

**THEOREM.** (Konvergenz monotoner beschränkter Folgen) Jede monoton wachsende / fallende nach oben / unten beschränkte Folge in  $\mathbb{R}$  konvergiert.

*Beweis. Zeichnung.* Sei  $(x_n)$  eine monoton wachsende, nach oben beschränkte Folge. Dann existiert also aufgrund der Ordnungsvollständigkeit  $S := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Dann existiert nach Definition des Supremum ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit

$$S - \varepsilon \leq x_{n_\varepsilon}.$$

Damit folgt also für alle  $n \geq n_\varepsilon$  aufgrund der Monotonie

$$S - \varepsilon \leq x_{n_\varepsilon} \leq x_n \leq S$$

also  $|S - x_n| < \varepsilon$ .

Der Fall monoton fallender nach unten beschränkter Folgen kann analog behandelt werden.  $\square$

**Bemerkung.**

- Neben der Konvergenz von  $(\frac{1}{n})$  gegen 0 haben wir also in unseren Zugang zu  $\mathbb{R}$  eine Methode zur Erzeugung konvergenter Folgen eingebaut.
- Ist die Folge  $(x_n)$  wachsend / fallend so gilt  $x_n \rightarrow C$ , wobei  $C \in \mathbb{R}$  oder  $C = \infty / C = -\infty$ .

**Beispiel - die Eulersche Zahl  $e$ :**  $x_n := (1 + \frac{1}{n})^n$  konvergiert.

**Beachte.**  $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , aber  $a^n \rightarrow \infty$  für  $a > 1$ . Die Frage ist also, welcher Effekt sich durchsetzt.

Bew: Wir zeigen, daß  $(x_n)$  wachsend und beschränkt ist. Die Bernoulli Ungleichung liefert

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

also

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} = x_{n-1}$$

für alle  $n \geq 2$ . Die Folge  $(x_n)$  ist also wachsend. Die Folge  $(x_n)$  ist beschränkt durch 3:

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ (\text{Binomi}) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k} \frac{1}{n^k} \\ (\text{Umsortieren}) &= \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n \cdots n} \frac{1}{k!} \\ &\leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \\ (\text{Induktion : } k! \geq 2^{k-1}) &\leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} \\ (\text{Geom.Summe}) &\leq 1 + \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} \leq 3. \end{aligned}$$

Damit existiert nach dem vorangehenden Satz der Grenzwert der Folge  $(x_n)$ . Dieser Grenzwert wird  $e$  genannt. Später:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} =: \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

**Bemerkung.** Die Zahl  $e$  spielt bei kontinuierlichen Wachstumsvorgängen eine Rolle, z.B. stetige Verzinsung: Kapital  $A$  Zinssatz 100 Prozent. Dann hat man nach einem Jahr bei

- 0 mal (äquidistant) Abheben und Einzahlen :  $A(1 + 1)$
- 1 mal (äquidistant) Abheben und Einzahlen:  $A(1 + 1/2)(1 + 1/2)$
- 2 mal (äquidistant) Abheben und Einzahlen:  $A(1 + 1/3)(1 + 1/3)(1 + 1/3)$
- etc.

**Beispiel - die Zahl  $e(a)$ :** Sei  $a > 0$ . Sei  $x_n := (1 + a/n)^n$ . Dann konvergiert  $(x_n)$ . Wir nennen den Grenzwert  $e(a)$ . (Später:  $e(a) = e^a$ ).

Bew. Wir zeigen Monotonie und Beschränktheit.

*Monotonie:*

$$\begin{aligned}
 x_n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \\
 \text{(siehe voriges Bsp.)} &= \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n \cdot n \cdots n} \frac{a^k}{k!} \\
 (l/r \leq (l+1)/(r+1)) &\leq \sum_{k=0}^n \frac{(n+1)n\cdots(n+1-k+1)}{(n+1) \cdot (n+1) \cdots (n+1)} \frac{a^k}{k!} \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(n+1)n\cdots(n+1-k+1)}{(n+1) \cdot (n+1) \cdots (n+1)} \frac{a^k}{k!} \\
 &= x_{n+1}.
 \end{aligned}$$

(Alternativer direkter Beweis der Monotonie: Sei  $a > 0$ :

$$\begin{aligned}
 \frac{x_{n+1}}{x_n} &= \left(1 + \frac{a}{n+1}\right) \left(\frac{1 + \frac{a}{n+1}}{1 + \frac{a}{n}}\right)^n \\
 &= \left(1 + \frac{a}{n+1}\right) \left(\frac{(n+1+a)n}{(n+a)(n+1)}\right)^n \\
 &= \left(1 + \frac{a}{n+1}\right) \left(\frac{(n+1)n + na}{(n+1)(n+a)}\right)^n \\
 &\geq \left(1 + \frac{a}{n+1}\right) \left(1 - \frac{a}{(n+1)(n+a)}\right)^n \\
 \text{(Bernoulli)} &\geq \left(1 + \frac{a}{n+1}\right) \left(1 - \frac{na}{(n+1)(n+a)}\right) \\
 &= \left(\frac{n+1+a}{n+1}\right) \left(\frac{(n+1)(n+a) - an}{(n+1)(n+a)}\right) \\
 \text{(Sortieren } n \cdot \text{Potenzen)} &= \frac{n^3 + n^2(a+2) + n(1+2a) + a(1+a)}{n^3 + n^2(a+2) + n(1+2a) + a} \\
 (a > 0) &\geq 1)
 \end{aligned}$$

*Beschränktheit:*

Die Betrachtungen des vorigen Beispiels führen auf

$$x_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!}.$$

Wähle nun  $N \in \mathbb{N}$  mit  $N \geq 2a$ . Dann gilt

$$x_n = \sum_{k=0}^N \frac{a^k}{k!} + \sum_{k=N+1}^n \frac{a^k}{k!} = C + \frac{a^{N+1}}{N!} \sum_{k=N+1}^n \frac{a^{k-N-1}}{(N+1) \cdots k} \leq C + \frac{a^{N+1}}{N!} 3.$$

(Grundidee  $a^k/k!$  ist schließlich  $a/l$  mit  $l$  groß....)

**Beispiel - die Zahl  $e(-a)$ :** Für  $b = -a < 0$  gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a}{n}\right)^n = \frac{1}{e(a)}$ .

Bew. Übung. Idee  $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \left(1 - \frac{a}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{a^2}{n^2}\right)^n$  konvergiert gegen 1...

**Beispiel -  $k$ -te Wurzel.** (Übung) Sei  $a > 0$  beliebig. Definiere induktiv die Folge  $(x_n)$  durch  $p := c > 0$  beliebig und

$$x_{n+1} := \frac{1}{k} \left( (k-1)x_n + \frac{a}{x_n^{k-1}} \right) = x_n + \frac{x_n}{k} \left( \frac{a}{x_n^k} - 1 \right).$$

Dann konvergiert die Folge  $(x_n)$  gegen  $\sqrt[k]{a}$ .

Beweisskizze: Offenbar (?Induktion!) gilt  $x_n > 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Bernoulli Ungleichung liefert (Wie?):

$$x_{n+1}^k \geq a$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Außerdem gilt nach Definition

$$x_n - x_{n+1} = \frac{x_n}{k} \left( 1 - \frac{a}{x_n^k} \right).$$

Damit ist also (Warum?)  $(x_n)_{n \geq 2}$  monoton fallend und durch 0 nach unten beschränkt. Also konvergiert die Folge  $(x_n)$  nach dem Satz gegen einen Grenzwert  $b$ . Dieser Grenzwert erfüllt (Wieso?)

$$b = \frac{1}{k} \left( (k-1)b + \frac{a}{b^{k-1}} \right)$$

und damit auch  $b^k = a$ .

**Bemerkung.** Diese Betrachtungen sind ein Fall des sogenannten Newton Verfahrens. Damit kann man (oft) eine Nullstelle einer Funktion  $f$  (hier  $x^k - a$ ) auf folgende Art berechnen:

$n = 0$ : Wähle einen (geeigneten) Wert  $p$ .

$n \implies n + 1$ : Ist  $x_n$  schon bestimmt, so berechnet man  $x_{n+1}$  wie folgt: Bilde die Tangente an  $(x, f(x))$  und berechne ihren Schnitt mit der  $x$ -Achse. Dieser Schnittpunkt ist dann  $x_{n+1}$ . (Zeichnung). Rechnung liefert die Rekursion

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Der Satz zur Konvergenz monotoner Folgen mag erst einmal speziell erscheinen, da keineswegs jede Folge monoton ist. Aber er hat weitreichende Konsequenzen. Um das näher zu erläutern, brauchen wir noch einen neuen Begriff:

**DEFINITION.** Sei  $(x_n)_n$  eine Folge und  $(n_k)$  eine strikt wachsende Folge in  $\mathbb{N}$  (d.h.  $n_{k+1} > n_k$  für alle  $k \in \mathbb{N}$ ). Dann heißt  $(x_{n_k})$  eine Teilfolge von  $(x_n)$ .

**Bemerkungen.**

- Ist  $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \mapsto n_k$  und  $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ , so ist  $(x_{n_k})$  gerade die Abbildung  $x \circ n$ .
- Für den Begriff der Teilfolge ist nicht wichtig, daß die Werte der Folge in  $\mathbb{R}$  liegen.

**Zeichnung.**  $x_1, x_2 \dots$  vs  $x_{n_1}, x_{n_2} \dots$

**Beispiel.**  $x_n = (-1)^n$ . Dann ist  $(x_{2n})$  die konstante Folge 1 und  $(x_{2n+1})$  die konstante Folge  $-1$ . Diese Teilfolgen sind konvergent also 'schöner' als die Ursprungsfolge. Das ist ein allgemeines Phänomen (s.u.).

Das folgende Lemma zeigt, daß der Unterschied zwischen beliebigen Folgen und monotonen Folgen doch nicht so groß ist.

**LEMMA.** Jede Folge in  $\mathbb{R}$  enthält eine monotone Teilfolge.

*Beweis.* Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ . Ein  $N \in \mathbb{N}$  heißt Gipfelpunkt von  $(x_n)$ , wenn gilt  $x_N \geq x_n$  für alle  $n \geq N$ . Wir unterscheiden zwei Fälle.

*Fall 1: Es gibt unendlich viele Gipfelpunkte.* Sei  $n_k := k$ -ter Gipfelpunkt. Dann ist  $n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1}$  die Folge von Gipfelpunkten. Daher gilt also

$$x_{n_k} \geq x_{n_{k+1}}$$

für alle  $k \in \mathbb{N}$  und  $(x_{n_k})$  ist eine monoton fallende Teilfolge.

*Fall 2: Es gibt nur endlich viele Gipfelpunkte.* Wir konstruieren induktiv streng monoton wachsende  $(n_k)$ , so daß  $x_{n_k}$  monoton wachsend ist.  $k = 1$ : Wähle  $n_1$  größer als jeden Gipfelpunkt (möglich, da nur endlich viele Gipfelpunkte).

$k \implies k + 1$ : Seien  $n_1 < n_2 \dots < n_k$  schon konstruiert. Da  $n_k$  kein Gipfelpunkt ist ( $n_k > n_1 > \text{jeder Gipfelpunkt}$ ), gibt es ein  $n_{k+1} > n_k$  mit  $x_{n_k} < x_{n_{k+1}}$ .  $\square$

**THEOREM.** (Bolzano - Weierstraß) Jede beschränkte Folge in  $\mathbb{R}$  enthält eine konvergente Teilfolge.

*Beweis.* Nach dem vorigen Lemma enthält die Folge eine monotone Teilfolge. Diese ist beschränkt (da die Ursprungsfolge beschränkt ist). Damit konvergiert die Teilfolge nach dem Satz über Konvergenz monotoner beschränkter Folgen.  $\square$



Wir werden nun Konvergenz von Folgen in  $\mathbb{R}$  charakterisieren. Dazu benötigen wir den folgenden Begriff.

**DEFINITION.** (*Cauchy Folge*) Eine Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{R}$  heißt *Cauchy-Folge* wenn gilt: Zu jedem  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ , sodaß für alle  $n, m \geq n_\varepsilon$  gilt

$$|x_n - x_m| < \varepsilon.$$

In Quantorisch:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n, m \geq n_\varepsilon |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

**Idee.** Folgeglieder sind beliebig nahe aneinander für genügend große  $n$  und  $m$ .

**LEMMA.** *Jede konvergente Folge in  $\mathbb{R}$  ist eine Cauchy-Folge.*

*Beweis.* (Eigentlich klar: Wenn Folgeglieder nahe am Grenzwert sind, sind sie auch nahe aneinander. **Zeichnung.**)

Details: Sei  $x_n \rightarrow x$ ,  $n \rightarrow \infty$ . Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Dann existiert ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit  $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$  für  $n \geq n_\varepsilon$ . Also

$$|x_n - x_m| = |x_n - x + x - x_m| \leq |x_n - x| + |x_m - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

für  $n, m \geq n_\varepsilon$ .  $\square$

**LEMMA.** *Eine Cauchy-Folge in  $\mathbb{R}$  mit einer konvergenten Teilfolge ist konvergent (gegen den Grenzwert der Teilfolge).*

*Beweis.* Sei  $(x_n)$  eine Cauchy-Folge und sei  $(x_{n_k})$  eine gegen  $x$  konvergente Teilfolge. Wir zeigen  $\lim x_n = x$ .

Sei  $\varepsilon > 0$  gegeben.

Es existiert  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit  $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$  für alle  $m, n \geq n_\varepsilon$  (da Cauchy Folge).

Es existiert  $k_0 \in \mathbb{N}$  mit  $|x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2}$  für  $k \geq k_0$  (da Teilfolge konvergent).

Sei nun  $k \geq k_0$  mit  $n_k \geq n_\varepsilon$  gewählt.

Es gilt für alle  $n \geq n_\varepsilon$

$$|x_n - x| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - x| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

Wir kommen nun zur angekündigten Charakterisierung von Konvergenz.

**THEOREM.** (*Cauchy-Kriterium*) Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ . Dann sind äquivalent:

- (i)  $(x_n)$  ist konvergent.
- (ii)  $(x_n)$  ist eine Cauchy Folge.

*Beweis.* Die Implikation (i)  $\implies$  (ii) haben wir in einem vorausgehenden Lemma gezeigt.

(ii)  $\implies$  (i): Sei  $(x_n)$  eine Cauchy Folge. Dann ist  $(x_n)$  beschränkt (Wähle  $n_1$  mit  $|x_n - x_{n_1}| < 1$  für  $n \geq n_1$ . Dann gilt für  $n \geq n_1$  also  $|x_n| \leq |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1}| < 1 + |x_{n_1}|$ ...). Damit hat  $(x_n)$  also nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß eine konvergente Teilfolge. Damit ist  $(x_n)$  nach dem vorigen Lemma konvergent.  $\square$

**Bemerkung.** Es handelt sich um eine wesentliche Eigenschaft der reellen Zahlen (siehe folgendes Theorem). Die entscheidende Implikation ist (ii)  $\implies$  (i).

In gewisser Weise charakterisieren (fast) alle in diesem Abschnitt gegebenen Sätze die reellen Zahlen. Genauer gilt folgendes.

**THEOREM.** (*Die große Charakterisierung*) Sei  $K$  ein angeordneter Körper. Dann sind äquivalent:

- (i) *Es ist  $K$  ordnungsvollständig (d.h.  $K = \mathbb{R}$ ).*
- (ii) *Es erfüllt  $K$  das Intervallschachtelungsprinzip und das Archimedische Axiom.*
- (iii) *Jede monotone beschränkte Folge konvergiert, und es gilt das Archimedische Axiom.*
- (iv) *Jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge, und es gilt das Archimedische Axiom.*
- (v) *Jede Cauchy-Folge konvergiert, und es gilt das Archimedische Axiom.*

*Beweis.* (i)  $\iff$  (ii): Das wurde schon in Kapitel 3 durchgeführt.

(i)  $\implies$  (iii): Siehe oben. (Definiere  $S := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ ....)

(iii)  $\implies$  (iv): Jede beschränkte Folge hat eine monotone Teilfolge (nach dem oben gegebenen Beweis).

(iv)  $\implies$  (v): Jede Cauchy Folge ist beschränkt (s.o.). Jede Cauchy Folge mit konvergenter Teilfolge konvergiert (s.o.).

(v)  $\implies$  (ii): Ist  $I_n$  eine Intervallschachtelung, so bilden die Mittelpunkte (rechte Randpunkte, linke Randpunkte,...) eine Cauchy Folge. Der Grenzwert  $x$  hat die gewünschten Eigenschaften.  $\square$

**Nach Hause nehmen:** Die Ordnungsvollständigkeit von  $\mathbb{R}$  liefert konvergente Folgen:

- Die Folge  $(\frac{1}{n})$  ist eine Nullfolge.
- Monotone beschränkte Folge konvergieren.
- Jede Cauchy Folge konvergiert.

Darauf beruhen mehr oder weniger alle Betrachtungen zu Konvergenz.

### 3. Teilfolgen und Häufungspunkte

Wir kommen nun zu einem wichtigen Konzept, das das Konzept der Teilfolge komplementiert.

**Notation:** Eine Menge  $X$  heißt endlich, wenn es ein  $n \in \mathbb{N}$  gibt und eine bijektive Abbildung  $j : \{1, \dots, n\} \rightarrow X$ . Andernfalls heißt sie unendlich (siehe später).

**LEMMA.** (*Charakterisierung Häufungspunkt*) Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$  und  $x \in \mathbb{R}$  gegeben. Dann sind äquivalent:

- (i) Es gibt eine Teilfolge von  $(x_n)$ , die gegen  $x$  konvergiert.
- (ii) Für alle  $\varepsilon > 0$  ist die Menge  $\{n \in \mathbb{N} : |x_n - x| < \varepsilon\}$  unendlich.

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii): Sei  $\varepsilon > 0$ . Aufgrund von (i) gibt es eine Teilfolge  $x_{n_k}$  mit  $x_{n_k} \rightarrow x$ ,  $k \rightarrow \infty$ . Damit folgt also für  $k \geq k_\varepsilon$

$$|x_{n_k} - x| < \varepsilon.$$

Damit gilt

$$\{n \in \mathbb{N} : |x_n - x| < \varepsilon\} \supset \{n_k : k \geq k_\varepsilon\}$$

und es folgt die Behauptung.

(ii)  $\implies$  (i): Wir konstruieren induktiv eine Teilfolge mit

$$|x_{n_k} - x| < \frac{1}{k}.$$

Diese Teilfolge konvergiert dann also gegen  $x$ .

$k = 1$ : Wähle  $n_1$  mit  $|x_{n_1} - x| < 1$ .

$k \implies k + 1$ : Aufgrund von (ii) ist die Menge

$$A := \{n \in \mathbb{N} : |x_n - x| < \frac{1}{k+1}\} \cap \{n \in \mathbb{N} : n > n_k\}$$

nichtleer. Wir können also  $n_{k+1}$  aus  $A$  wählen z.B. als kleinstes Element von  $A$ . Dann gilt

$$|x_{n_k} - x| < \frac{1}{k}.$$

Damit folgt  $(x_{n_k}) \rightarrow x$  (nach Archimedisches Axiom).  $\square$

**Beachte:** Beweis nutzt:  $x_n \rightarrow x \iff$  Für alle  $k \in \mathbb{N}$  existiert ein  $n_k \in \mathbb{N}$  mit  $|x_n - x| < 1/k$  für  $n \geq n_k$ .

**DEFINITION.** (*Häufungspunkt*) Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ . Ein  $x \in \mathbb{R}$  heißt Häufungspunkt von  $(x_n)$ , wenn eine der beiden äquivalenten Bedingungen des vorigen Lemma gilt.

**Bemerkung.** Gibt es eine Teilfolge von  $(x_n)$  die gegen  $\infty / -\infty$  konvergiert, so spricht man manchmal vom uneigentlichen Häufungspunkt  $\infty$  bzw.  $-\infty$ .

**Erkläre** im Spaziergängermodell, das Häufen.

**Beispiele.** (a)  $(-1)^n$  hat die beiden Häufungspunkte  $-1$  und  $1$ .

(b) Die Folge  $x_n$  mit  $x_n = \pi$  für  $n$  hat Rest 0 bei Division durch 3,  $x_n = 7$  für  $n$  mit Rest 1 bei Division durch 3,  $x_n = 42$  für  $n$  mit Rest 2 bei Division durch 3 hat die drei Häufungspunkte  $\pi, 7$  und  $42$ .

(c)  $y_n = x_n + \frac{1}{n}$  (mit  $(x_n)$  aus (b)) hat ebenfalls die Häufungspunkte  $\pi, 7, 42$  (obwohl diese Werte nicht angenommen werden; vgl. Konvergenz!)

**Beachte.** Der Satz von Bolzano/Weierstraß lässt sich nun so formulieren: Jede beschränkte Folge in  $\mathbb{R}$  hat einen Häufungspunkt.

Für beschränkte Folgen in  $\mathbb{R}$  gibt es zwei besondere Häufungspunkte, nämlich den größten und den kleinsten Häufungspunkt. Das werden wir jetzt genauer untersuchen:

Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ .

Dann ist die Folge  $(X_N)$  mit

$$X_N := \sup\{x_n : n \geq N\}$$

fallend in  $N$ . Damit existiert

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{N \rightarrow \infty} X_N = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{x_k : k \geq n\}.$$

und wird als 'Limsup' oder 'Limes superior' von  $(x_n)$  bezeichnet. Hier ist der Wert  $+\infty$  möglich (wenn nämlich die Folge nach oben nicht beschränkt ist).

Analog sieht man, daß die Folge  $(X_M)$  mit

$$X_M := \inf\{x_n : n \geq M\}$$

wachsend in  $M$  ist. Damit existiert

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{M \rightarrow \infty} X_M = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{x_k : k \geq n\}$$

und wird als 'Liminf' oder 'Limes inferior' von  $(x_n)$  bezeichnet. Hier ist der Wert  $-\infty$  möglich (wenn nämlich die Folge nach unten nicht beschränkt ist).

←  
Ende der 14. Vorlesung

**LEMMA.** (Charakterisierung von  $\limsup/\liminf$ ) Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ . Sei  $x \in \mathbb{R}$ . Dann sind äquivalent:

- (i)  $x = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ .
- (ii) Für jedes  $\varepsilon > 0$  gilt:
  - Es gibt ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit  $x_k \leq x + \varepsilon$  für alle  $k \geq n_\varepsilon$
  - Die Menge  $\{n \in \mathbb{N} : x_n \geq x - \varepsilon\}$  ist unendlich.

- (iii) *Es ist  $(x_n)$  nach oben beschränkt und es ist  $x$  der größte Häufungspunkt von  $(x_n)$  (d.h.  $x$  ist Häufungspunkt von  $(x_n)$  und es gibt keinen größeren Häufungspunkt).*

Analoge Aussagen gelten für  $\liminf$ .

*Beweis.* (i) $\implies$ (ii): Sei  $\varepsilon > 0$ . Sei  $X_N := \sup\{x_n : n \geq N\}$ . Wegen  $X_N \rightarrow x$  fallend, existiert ein  $N_0 \in \mathbb{N}$  mit

$$x_k \leq \sup\{x_n : n \geq N_0\} < x + \varepsilon$$

für alle  $k \geq N_0$  und es ist  $\{n \in \mathbb{N} : x_n \geq x - \varepsilon\}$  unendlich.

(ii) $\implies$ (iii):  $(x_n)$  nach oben beschränkt. Das folgt aus der ersten Eigenschaft.

$x$  ist Häufungspunkt. Das folgt aus den beiden Eigenschaften und der Charakterisierung von Häufungspunkten.

*Es gibt keinen größeren Häufungspunkt.* Das ist klar nach der ersten Eigenschaft.

(iii) $\implies$ (i): Sei  $X_N := \sup\{x_n : n \geq N\}$ .

Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann gibt es ein  $n_\varepsilon$  mit  $x_n \leq x + \varepsilon$  für alle  $n \geq n_\varepsilon$  (andernfalls gäbe es nach Bolzano/Weierstrass eine Teilfolge, die gegen eine größere Zahl als  $x$  konvergiert. Widerspruch *größter HP.*). Damit folgt

$$X_N \leq x + \varepsilon$$

für alle  $N \geq n_\varepsilon$ . Damit folgt

$$\limsup x_n = \lim X_N < x + \varepsilon.$$

Umgekehrt gibt es, da  $x$  ein Häufungspunkt ist, zu jedem  $\varepsilon > 0$  beliebig große  $n$  mit  $x_n \geq x - \varepsilon$ . Damit folgt  $X_N \geq x - \varepsilon$  für alle  $N$ . Damit folgt  $X \geq x - \varepsilon$ . Da  $\varepsilon > 0$  beliebig war, folgt die Behauptung.  $\square$

**FOLGERUNG.** *Es gilt  $\limsup x_n < C$  genau dann wenn ein  $C' < C$  und  $N_0 \in \mathbb{N}$  existiert mit  $x_n \leq C'$  für alle  $n \geq N_0$ . Entsprechendes gilt für  $\liminf$ .*

*Beweis.*  $\implies$ : Das folgt leicht aus (ii).

$\impliedby$ : Das folgt sofort aus der Definition.  $\square$

**Bemerkung.** Ist  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  nicht nach oben beschränkt, so gilt  $\sup\{x_n : n \geq N\} = \infty$  für alle  $N$ . Entsprechend folgt  $\limsup x_n = \infty$ . In diesem Fall gibt es eine Teilfolge, die gegen  $\infty$  konvergiert. Man kann also in diesem Sinne  $\infty$  als den größten Häufungspunkt auffassen. Entsprechendes gilt für  $-\infty$  und  $\liminf x_n$ .

**Bemerkung.** (Zweipunkt kompaktifizierung) Wir betrachten  $\pm\infty$  nicht als Punkte einer geeigneten Fortsetzung von  $\mathbb{R}$ . Ausdrücke wie  $x_n \rightarrow \infty$  definieren wir direkt. Daß das gut möglich ist, liegt daran, daß man diese Punkte zu  $\mathbb{R}$  dazunehmen kann und damit die sogenannte Zweipunkt kompaktifizierung von  $\mathbb{R}$  erhält. Wir machen das an einer Zeichnung deutlich.

## KAPITEL 5

### Mächtigkeit

In diesem Abschnitt untersuchen wir die 'Größe' von Mengen mittels der Anzahl ihrer Elemente. Wir werden drei Abstufungen kennenlernen: endliche Mengen, abzählbar unendliche Mengen und überabzählbare Mengen.

DEFINITION. (*Mächtigkeit*)

- Eine Menge  $X$  heißt endlich, wenn sie leer ist oder ein  $n \in \mathbb{N}$  existiert und eine bijektive Abbildung  $j : \{1, \dots, n\} \rightarrow X$ . Dann heißt 0 bzw.  $n$  die Mächtigkeit oder Kardinalität von  $X$ .
- Eine Menge heißt unendlich, wenn sie nicht endlich ist.
- Eine Menge heißt abzählbar unendlich, wenn es eine bijektive Abbildung  $J : \mathbb{N} \rightarrow X$  gibt. In diesem Fall heißt  $J$  eine Abzählung und wir schreiben die Menge auch als  $X = \{J(1), J(2), \dots\}$ .
- Eine Menge, die weder endlich noch abzählbar unendlich ist, heißt überabzählbar.

**Beachte.** In dieser Vorlesung nennen wir eine Menge abzählbar, wenn sie endlich oder abzählbar unendlich ist. Diese Verwendung des Begriffes 'abzählbar' ist nicht einheitlich.

**Beispiele.**

- $\mathbb{N}$  ist abzählbar.
- $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$  abzählbar.
- $\mathbb{Z}$  ist abzählbar. (Bew.  $\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}, 2n \mapsto n, 2n + 1 \mapsto -n$ .)

Wir wiederholen das Prinzip der Wohlordnung: Jede nichtleere Teilmenge  $M$  von  $\mathbb{N}$  hat ein kleinstes Element.

Anschaulich klar: Laufe  $\mathbb{N}$  beginnend bei 1 ab, bis man auf die Menge trifft. Details hier: Sei  $M$  eine solche Teilmenge. Angenommen:  $M$  hat kein kleinstes Element. Dann ist  $B := \{n \in \mathbb{N} : \{1, \dots, n\} \in \mathbb{N} \setminus M\}$  induktiv ( $1 \in B$ : klar.  $n \in B \implies (n+1) \in B$ : klar. Damit ist  $M$  leer.)

LEMMA. Sei  $X$  eine Menge und  $H : \mathbb{N} \rightarrow X$  surjektiv. Dann ist entweder  $X$  endlich oder abzählbar unendlich.

*Beweis.* Sei  $X$  nicht endlich. Zu zeigen: Es existiert ein  $J : \mathbb{N} \rightarrow X$  bijektiv.

Wir konstruieren induktiv ein  $J : \mathbb{N} \rightarrow X$  mit

- $\{J(1), J(2), \dots\} \supset \{H(1), \dots, H(n)\}$ .
- Die Elemente  $J(1), \dots, J(n)$  sind paarweise verschieden.

Aufgrund des ersten Punktes ist  $J$  surjektiv. Aufgrund des zweiten Punktes ist  $J$  injektiv.

Zur Konstruktion:

$n = 1$ :  $J(1) = H(1)$ .

$n \implies n + 1$ : Betrachte  $M := \{k > n : H(k) \notin \{J(1), \dots, J(n)\}\}$ . Dann ist  $M$  nichtleer, da  $X$  unendlich ist. Damit hat  $M$  ein kleinstes Element  $m$ . Dann setzt man  $J(n + 1) := m$ . Dann gelten die gewünschten Eigenschaften (Check!).  $\square$

**LEMMA.** *Es sind  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  und  $\mathbb{N} \times \{1, \dots, n\}$  für beliebiges  $n \in \mathbb{N}$  abzählbar. Insbesondere ist  $X \times Y$  abzählbar für alle abzählbaren  $X$  und  $Y$ .*

*Beweis.*  $\mathbb{N} \times \{1, \dots, n\}$  abzählbar. Zeichnung.

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  abzählbar. Zeichnung.

Das 'Insbesondere' ist nun klar.  $\square$

**Bemerkung.** Das Lemma liefert leicht, daß auch  $X_1 \times \dots \times X_n$  abzählbar ist für abzählbare  $X_1, \dots, X_n$ . (Übung: Wie ist es mit abzählbaren Produkten bestellt?)

**THEOREM.** *Es ist  $\mathbb{Q}$  abzählbar.*

*Beweis.* Betrachte

$$H : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N} \times \{-1, 1\} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad H(n, m, q) = q \frac{n}{m}.$$

Dann ist  $H$  surjektiv und nach dem vorangehenden Lemma ist  $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N} \times \{-1, 1\}$  abzählbar. Damit folgt die Aussage aus dem ersten Lemma des Abschnitts.  $\square$

**THEOREM.** *Es ist  $\mathbb{R}$  überabzählbar. Tatsächlich ist jedes Intervall positiver Länge in  $\mathbb{R}$  überabzählbar.*

*Beweis.* Angenommen:  $\mathbb{R}$  ist abzählbar.

Dann gibt es eine Abbildung  $J : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$  mit  $\mathbb{R} = \{J(1), J(2), \dots\}$ . Wir konstruieren nun rekursiv eine Intervallschachtelung  $(I_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$  mit

- $J(n) \notin I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .
- $|I_{n+1}| = \frac{1}{3}|I_n|$ .

Nach dem Intervallschachtelungsprinzip gibt es einen Punkt  $x$  der zu allen  $I_n$  gehört. Damit stimmt  $x$  dann mit keinem der  $J(n)$  überein (da  $J(n) \notin I_n$ ). Das ist ein Widerspruch.

Es bleibt die  $I_n$  zu konstruieren:

$n = 1$ : Setze  $I_1 := [J(1) + 1, J(1) + 2]$ .

$n \implies (n+1)$ : Teile  $I_n$  in drei gleichlange abgeschlossene Teilintervalle. Es kann  $J(n+1)$  nicht in allen drei Teilintervallen liegen. Wähle für  $I_{n+1}$  ein Teilintervall, das  $J(n+1)$  nicht enthält.  $\square$

← Ende der 15. Vorlesung →

**FOLGERUNG.** (*Dichtheit von  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$* ) In jedem Intervall positiver Länge in  $\mathbb{R}$ , gibt es Punkte von  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

*Beweis.* Nach dem vorigen Satz ist jedes Intervall positiver Länge überabzählbar. Da  $\mathbb{Q}$  abzählbar ist, kann auch der Schnitt von  $\mathbb{Q}$  mit einem solchen Intervall nur abzählbar sein. Damit folgt die Behauptung.  $\square$

**Bemerkung.** Auch wenn ein Intervall positiver Länge 'fast nur' aus Punkten aus  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  besteht, kann es schwierig sein, einen solchen Punkt anzugeben.

Wir diskutieren nun, dass die Potenzmenge einer Menge immer 'echt größer' als die Menge ist.

**PROPOSITION.** Sei  $X$  eine beliebige Menge und  $P(X)$  die Potenzmenge von  $X$ . Dann gibt es keine surjektive Abbildung  $J$  von  $X$  nach  $P(X)$ .

*Beweis.* Übung.  $\square$



## KAPITEL 6

### Die komplexen Zahlen

**Ziel.** Finde Erweiterungskörper von  $\mathbb{R}$ , in dem  $x^2 + 1 = 0$  eine Lösung hat. Nenne diese Lösung  $i$ . Mit  $a, b \in \mathbb{R}$  ist dann auch  $a + ib$  in diesem Körper, und es gilt

$$(a + ib)(a' + ib') = aa' + iba' + iab' + iibb' = aa' - bb' + i(ba' + ab').$$

Damit ist also die Menge  $a + ib$  unter Multiplikation abgeschlossen. Das motiviert folgenden Satz.

**THEOREM.** Die Menge  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  versehen mit der Addition  $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$  und der Multiplikation  $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$  ist ein Körper mit neutralem Element  $(0, 0)$  der Addition und neutralem Element  $(1, 0)$  der Multiplikation.

Das Inverse bzgl. Addition von  $(a, b)$  ist gegeben durch  $(-a, -b)$ .

Das Inverse bzgl. der Multiplikation von  $(a, b) \neq (0, 0)$  ist gegeben durch

$$\left( \frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

*Beweis.* Direkte Rechnungen (vgl. Algebravorlesung). □

**Zeichnung.** Ebene, imaginäre Achse, reelle Achse.

**DEFINITION.** Der Körper aus dem vorangehenden Satz wird mit  $\mathbb{C}$  bezeichnet.

**Notation.** Wir schreiben  $i$  für  $(0, 1)$ . Außerdem identifizieren wir die Element der Form  $(a, 0)$  mit  $a \in \mathbb{R}$ . Damit lässt sich das Element  $(a, b) \in \mathbb{C}$  schreiben als  $(a, b) = (a, 0) + bi = a + ib$ .

**PROPOSITION.** Es gilt  $i^2 = -1$ .

*Beweis.* Nachrechnen. □

**DEFINITION.** Für  $z = a + ib \in \mathbb{C}$  definieren wir den Imaginärteil  $\Im z := b$  und den Realteil  $\Re z := a$ , sowie die zu  $z$  konjugiert komplexe Zahl  $\bar{z} := a - ib$  und  $|z| := \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

**Beachte.** (a) Komplex Konjugieren bedeutet gerade Spiegeln an der reellen Achse.

(b)  $|z|^2 = z\bar{z}$ .

Folgende Regeln sind einfach zu beweisen.

PROPOSITION. Für alle  $z, w \in \mathbb{C}$  gilt:

(a)  $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$ .

(b)  $\overline{z\bar{w}} = \bar{z} w$  und  $\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\bar{z}}$  für  $z \neq 0$ .

(c)  $\Re z = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ ,  $\Im z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ .

(d)  $z \neq 0 \implies z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ .

(e)  $|zw| = |z||w|$  und für  $z \neq 0$   $|1/z| = 1/|z|$ .

*Beweis.* Hausaufgabe. □

PROPOSITION. (Dreiecksungleichung) Für  $z, w \in \mathbb{C}$  gilt

$$|z+w| \leq |z| + |w|.$$

**Bemerkung.** In  $\mathbb{C}$  kann man Dreiecksungleichung gut deuten.)

Der Betrag erlaubt es uns ähnlich wie in  $\mathbb{R}$  das Konzept der Konvergenz und der Cauchy Folge zu definieren. Diesem Thema widmen wir uns als nächstes.

DEFINITION. Eine Folge  $(z_n)$  in  $\mathbb{C}$  heißt konvergent gegen  $z \in \mathbb{C}$ , wenn für jedes  $\varepsilon > 0$  ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  existiert, sodaß für alle  $n \geq n_\varepsilon$  gilt  $|z_n - z| < \varepsilon$ .

**Notation.** Wieder kann eine Folge höchstens gegen einen Wert konvergieren und dieser Wert heißt dann Grenzwert und wir schreiben  $z = \lim z_n$  oder  $z_n \rightarrow z$ ,  $n \rightarrow \infty$ .

Man definiert für  $\varepsilon > 0$  die  $\varepsilon$ -Umgebung von  $w$  durch

$$U_\varepsilon(w) := \{z \in \mathbb{C} : |z - w| < \varepsilon\}.$$

Es heißt dann  $U_\varepsilon(w)$  auch die offene  $\varepsilon$ -Kugel um  $w$ .

**Bemerkung.** Allgemein nennt man eine Menge  $U$  eine Umgebung von  $w$ , wenn ein  $\varepsilon > 0$  existiert mit  $U_\varepsilon(w) \subset U$ .

LEMMA. Für eine Folge  $(z_n)$  in  $\mathbb{C}$  und  $z \in \mathbb{C}$  sind äquivalent:

- (i) Es konvergiert  $(z_n)$  gegen  $z$ .
- (ii) Für alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $n_\varepsilon > 0$  mit  $z_n \in U_\varepsilon(z)$  für alle  $n \geq n_\varepsilon$ .
- (iii)  $|z - z_n| \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ .

Konvergenz in  $\mathbb{C}$  und Konvergenz in  $\mathbb{R}$  haben viel miteinander zu tun. Tatsächlich lassen sich wesentliche Betrachtungen zu Konvergenz in  $\mathbb{C}$  auf die entsprechenden Betrachtungen in  $\mathbb{R}$  zurückführen. Dazu dient folgende Proposition.

PROPOSITION. Für  $z = a + ib \in \mathbb{C}$  gilt

$$|z| \leq |a| + |b| \text{ sowie } |a|, |b| \leq |z|.$$

*Beweis.* Nach Definition gilt  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

Erste Ungleichung: Es gilt

$$a^2 + b^2 = |a|^2 + |b|^2 \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2.$$

Damit folgt also

$$|z|^2 \leq (|a| + |b|)^2.$$

Da die Wurzelfunktion monoton ist ( $x < y \implies \sqrt{x} \leq \sqrt{y}$ ) folgt damit die Behauptung durch Wurzelziehen.

Zweite Ungleichung: Mit  $a^2, b^2 \leq a^2 + b^2$  folgt also

$$|a|, |b| \leq |z|.$$

Das beendet den Beweis. □

Als erste Folgerung zeigen wir:

**PROPOSITION.** *Sei  $(z_n)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$  und  $z_n = a_n + ib_n$  mit  $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ . Dann sind äquivalent:*

- (i) *Die Folge  $(z_n)$  konvergiert in  $\mathbb{C}$ .*
- (ii) *Die Folgen  $(a_n)$  und  $(b_n)$  konvergieren in  $\mathbb{R}$ .*

*In diesem Fall gilt  $\lim z_n = \lim a_n + i(\lim b_n)$ .*

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii): Es gelte  $z_n \rightarrow z = a + ib$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann existiert also ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit  $|z_n - z| < \varepsilon$  für  $n \geq n_\varepsilon$ . Dann gilt für  $n \geq n_\varepsilon$  also nach voriger Proposition

$$|a_n - a|, |b_n - b| \leq |z_n - z| < \varepsilon.$$

(ii)  $\implies$  (i).  $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ . Sei  $z := a + ib$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann existiert also ein  $n_a \in \mathbb{N}$  mit  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$  für  $n \geq n_a$  und ein  $n_b \in \mathbb{N}$  mit  $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$  für  $n \geq n_b$ . Für  $n \geq \max\{n_a, n_b\}$  gilt also nach voriger Proposition

$$|z - z_n| = |a + ib - (a_n + ib_n)| \leq |a - a_n| + |b - b_n| < \varepsilon.$$

□

Damit kann man aus den Rechenregeln für Konvergenz in  $\mathbb{R}$  leicht die folgenden Rechenregeln für Konvergenz in  $\mathbb{C}$  ableiten.

**PROPOSITION.** *(Rechenregeln)*

- (a)  $z_n \rightarrow z, w_n \rightarrow w \implies z_n + w_n \rightarrow z + w$ .
- (b)  $z_n \rightarrow z, w_n \rightarrow w \implies z_n w_n \rightarrow zw$ .
- (c)  $z_n \rightarrow z, z \neq 0, z_n \neq 0$  alle  $n \implies 1/z_n \rightarrow 1/z$ .
- (d)  $z_n \rightarrow z \implies |z_n| \rightarrow |z|$ .

Ähnlich wie in  $\mathbb{R}$  definiert man folgende Konzepte.

**DEFINITION.** *(Cauchy Folge) Eine Folge  $(z_n)$  in  $\mathbb{C}$  heißt Cauchy Folge, wenn zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  existiert, so daß für alle  $n, m \geq n_\varepsilon$  gilt  $|z_n - z_m| < \varepsilon$ .*

**THEOREM.** Für eine Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{C}$  sind äquivalent:

- (i)  $(z_n)$  ist eine Cauchy Folge.
- (ii)  $(z_n)$  ist konvergent.

*Beweis.* Sei  $z_n = a_n + ib_n$  mit  $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ . Dann gilt:

$(z_n)$  Cauchy Folge  $\iff (a_n), (b_n)$  Cauchy Folgen in  $\mathbb{R} \iff (a_n), (b_n)$  konvergent in  $\mathbb{R} \iff z_n$  konvergent.

(Dabei haben wir obige Charakterisierung von Konvergenz verwendet.)

□

**FOLGERUNG.** Es ist  $\mathbb{C}$  vollständig d.h. jede Cauchy-Folge in  $\mathbb{C}$  konvergiert.

**Beachte.** Die Vollständigkeit ist eine fundamentale analytische Eigenschaft der komplexen Zahlen.

Da es in  $\mathbb{C}$  keine Anordnung gibt (Warum?  $x^2 + 1 = 0$  hat Lösung!), gibt es auch keine monotonen Folgen und also auch keine Konvergenz monotoner Folgen. Aber es gibt eine komplexe Version des Satzes von Bolzano-Weierstraß. Dazu führen wir noch folgenden Begriff ein: Eine Folge  $(z_n)$  heißt beschränkt, wenn ein  $C > 0$  existiert mit  $|z_n| \leq C$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

**THEOREM.** (Bolzano - Weierstraß - komplex). Sei  $(z_n)$  eine beschränkte Folge in  $\mathbb{C}$ . Dann hat  $(z_n)$  eine konvergente Teilfolge.

*Beweis.* Sei  $z_n = a_n + ib_n$  mit  $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ . Da  $(z_n)$  beschränkt ist, sind auch die Folgen  $(a_n)$  und  $(b_n)$  beschränkt. Da  $(a_n)$  beschränkt ist, gibt es nach der reellen Version des Satz von Bolzano - Weierstraß eine konvergente Teilfolge  $(a_{n_k^{(1)}})_k$ . Dann ist aber auch  $(b_{n_k^{(1)}})$  beschränkt und hat also eine konvergente Teilfolge  $b_{n_k}$ . Dann konvergiert sowohl  $(a_{n_k})$  also auch  $(b_{n_k})$ . Damit konvergiert dann auch  $(z_{n_k})$ . □

## KAPITEL 7

### Summen und Reihen

Reihen liefern (eigentlich nur) eine spezielle Art, Folgen darzustellen. Diese Art ist in vielerlei Zusammenhängen von Interesse.

**Ziel:** Gegeben eine Folge  $(a_n)$  in  $\mathbb{C}$ . Definiere

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots .$$

**Problem:** Das Problem sind wieder die '...' oder anders gesagt, die Tatsache, dass es unendlich viele Summanden gibt.

**Lösung.** Summiere über endlich viele Summanden und bilde Grenzwert.

**Zeichnung.**

$$S_1: a_1$$

$$S_2: a_1 + a_2$$

$$S_3: a_1 + a_2 + a_3$$

$$S_4: a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

....

**DEFINITION.** (*Reihe gleich Folge der Partialsummen*) Sei  $(a_n)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$ . Zu  $n \in \mathbb{N}$  ist dann die  $n$ -te Partialsumme der  $(a_n)$  definiert durch

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k.$$

Die Folge  $(S_n)$  dieser Partialsummen wird dann als Reihe mit den Gliedern  $a_n$  bezeichnet. Diese Reihe heißt konvergent (mit Grenzwert  $S$ ), wenn die Folge  $(S_n)$  konvergiert (mit Grenzwert  $S$ ).

**Notation.** Wir schreiben

$$\sum_{k \geq 1} a_k \quad \text{für die Reihe, d.h. die Folge der Partialsummen}$$

und

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad \text{für den Grenzwert der Reihe, d.h. } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

(falls dieser existiert).

**Bemerkung.**  $(x_n)$  beliebige Folge in  $\mathbb{C}$ . Dann ist  $x_n = \sum_{k=1}^n a_k$  für  $a_1 = x_1$ ,  $a_n := x_n - x_{n-1}$   $n \geq 2$ . In diesem Sinne lässt sich jede Folge (in  $\mathbb{C}$ ) als Reihe darstellen.

**Beispiel.** (Geometrische Reihe) Ist  $\alpha \in \mathbb{C}$  beliebig und  $q \in \mathbb{C}$  mit  $|q| < 1$  so ist  $\sum_{k \geq 0} \alpha q^k$  konvergent gegen  $\frac{\alpha}{1-q}$ .

Bew. Es gilt  $|q^n| = |q|^n \rightarrow 0$ . Damit folgt die Aussage aus der Formel für die geometrische Summe.

**Anwendung.**  $\sum_{k=N}^{\infty} \alpha \beta^{k+l} = \alpha \beta^{N+l} \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k = \alpha \beta^{N+l} \frac{1}{1-\beta}$  für  $|\beta| < 1$ .

**Beispiel.**  $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{k(k-1)}$  konvergiert gegen 1.

Bew.  $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$ . Die in der zweiten Gleichung genutzte Technik ist unter dem Namen Partialbruchzerlegung bekannt (s. später).

Da es sich um Folgen handelt, gelten für konvergente Reihen natürlich weiterhin die Rechenregeln für konvergente Folgen. Insbesondere

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k + \lambda \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + \lambda b_k).$$

**THEOREM.** (Charakterisierung Konvergenz) Sei  $(a_k)$  in  $\mathbb{C}$  gegeben. Dann sind äquivalent:

- (i) Die Reihe  $\sum_{k \geq 0} a_k$  konvergiert.
- (ii) Zu jedem  $\varepsilon > 0$  existiert  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit  $|\sum_{k=m+1}^n a_k| < \varepsilon$  für alle  $n_\varepsilon \leq m < n$ . (**Zeichnung.** Endstück der Reihe.)

**Bemerkung.** Es ist  $|\sum_{k=m+1}^n a_k| = |S_n - S_m|$  gerade die Summe über ein 'Endstück' der Reihe.

*Beweis.* Reihe konvergiert  $\iff$  Folge  $(S_n)$  der Partialsummen konvergiert  $\iff (S_n)$  ist Cauchy Folge  $\iff$  (i).  $\square$

Das Theorem liefert eine **notwendige** Bedingung für Konvergenz.

**FOLGERUNG.** (Erster Test auf Konvergenz) Ist  $\sum_{k \geq 0} a_k$  konvergent, so ist  $|a_k|$  eine Nullfolge (d.h.  $|a_k| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ ).

*Beweis.*  $|a_k| = |\sum_{l=k}^k a_l| = |S_k - S_{k-1}| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ .  $\square$

Diese Bedingung ist nicht hinreichend:

**Gegenbeispiel.** (Harmonische Reihe ist divergent)  $\sum_{k \geq 1} 1/k$  ist divergent (**obwohl**  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ).

Bew.  $1 + 1/2 + (1/3 + 1/4) + (1/5 + \dots + 1/8) + \dots + (\frac{1}{2^n+1} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}) \dots$

Besonders wichtig sind Reihen mit nichtnegativen Gliedern. Denn darauf lassen sich viele Konvergenzbetrachtungen zurückführen. Für diese Reihen gilt:

LEMMA. (Konvergenz von Reihen mit nichtnegativen Gliedern) Sei Folge  $(a_k)$  mit  $a_k \geq 0$  gegeben. Sei  $S_n := \sum_{k=1}^n a_k$ . Dann sind äquivalent:

- (i) Die Reihe  $\sum_{k \geq 1} a_k$  ist konvergent (d.h.  $(S_n)$  konvergent).
- (ii) Die Reihe  $\sum_{k \geq 1} a_k$  ist beschränkt (d.h.  $\sup S_n < \infty$ ).
- (iii) Für alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit

$$a_n + a_{n+1} + \dots + a_m < \varepsilon$$

für alle  $n, m \in \mathbb{N}$  mit  $n_\varepsilon \leq n < m$ .

*Beweis.* Wegen  $a_k \geq 0$  ist  $(S_n)$  monoton wachsend. Damit sind Konvergenz (i) und Beschränktheit (ii) äquivalent. Weiterhin ist Konvergenz in  $\mathbb{R}$  äquivalent dazu, daß  $(S_n)$  eine Cauchy Folge ist. Das bedeutet aber gerade (iii).  $\square$

**Notation.** Ist  $a_k \geq 0$ , so schreiben wir  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty$ , wenn eine der Bedingungen des vorigen Lemma gilt.

Für Reihen erweist sich eine Verschärfung des Begriff der Konvergenz als sinnvoll. Dies ist der Punkt, an dem sich die Theorie der Reihen von der Theorie der Folgen unterscheidet.

DEFINITION. Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$ . Dann heißt die Reihe  $\sum_{k \geq 1} a_k$  absolut konvergent, wenn  $\sum_{k \geq 1} |a_k|$  konvergiert, d.h. wenn gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty.$$

**Beispiel.** (Geometrische Reihe) Ist  $q \in \mathbb{C}$  mit  $|q| < 1$  und  $\alpha \in \mathbb{C}$ , so ist  $\sum_{k \geq 1} \alpha q^k$  absolut konvergent (gegen  $\frac{\alpha}{1-q}$ ). Ist  $|q| \geq 1$ , so ist die Reihe nicht konvergent.

Bew. Es gilt  $|\alpha q^n| = |\alpha| |q|^n$ . Damit folgt absolute Konvergenz der Reihe für  $|q| < 1$  (s.o.). Ist  $|q| \geq 1$ , so ist  $q^n$  keine Nullfolge und es folgt Divergenz.

**Beispiel** (Reihe, die konvergiert, aber nicht absolut konvergiert) Sei  $a_k := (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ . Dann gilt:

- $\sum |a_k|$  nicht konvergent (harmonische Reihe).
- Es ist aber  $\sum_{k \geq 1} a_k$  konvergent. (s.u.)

**Bemerkung.**

- Für Reihen mit nichtnegativen Gliedern ist Konvergenz gleichbedeutend mit absoluter Konvergenz.
- Absolute Konvergenz / Konvergenz ändert sich nicht, wenn man endlich viele Glieder der Reihe abändert. (Es geht immer nur um  $a_k$  mit großen  $k$ .)

THEOREM. (Absolute Konvergenz impliziert Konvergenz) Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$ . Ist  $\sum_{k \geq 0} a_k$  absolut konvergent, so ist  $\sum_{k \geq 0} a_k$  konvergent.

*Beweis.*  $S_n := \sum_{k=1}^n a_k$ . Zu zeigen:  $(S_n)$  ist Cauchy Folge. Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Aufgrund der absoluten Konvergenz, konvergiert  $\sum_{k \geq 1} |a_k|$ . Damit existiert also nach dem Lemma ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit

$$|a_n| + |a_{n+1}| + \dots + |a_m| < \varepsilon$$

für alle  $n, m \geq n_\varepsilon$ . Damit gilt also für  $n, m \geq n_\varepsilon$  und  $n < m$

$$|a_n + a_{n+1} + \dots + a_m| \leq |a_n| + |a_{n+1}| + \dots + |a_m| < \varepsilon.$$

Damit konvergiert die Reihe (nach dem Theorem zur Konvergenz von Reihen mit nichtnegativen Gliedern).  $\square$

**Bemerkung.** (Absolute Konvergenz stabil bei Umordnungen) Absolute Konvergenz ist stabil unter Umordnungen (s.u.). Konvergente aber nicht absolut konvergente Reihen sind extrem instabil unter Umordnung (s.u.). Daher ist absolute Konvergenz oft wesentlich nützlicher als Konvergenz, wenn es um Reihen geht.

**PROPOSITION.** (Dreieckungleichung für Reihen). Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$ . Existiert  $\sum a_k$ , so gilt  $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ , wobei die rechte Seite den Wert unendlich hat, wenn die Summe nicht absolut konvergiert.

*Beweis.* Es reicht den Fall zu betrachten, daß  $\sum a_k$  absolut konvergiert. Da Betrag mit Konvergenz von Folgen verträglich ist, gilt

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

$\square$

**THEOREM.** (Majorantenkriterium) Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$ . Gibt es  $k_0 \in \mathbb{N}$  und  $b_k \geq 0$  mit

- $|a_k| \leq b_k$  für  $k \geq k_0$  und
- $\sum_{k \geq k_0} b_k < \infty$ ,

so ist  $\sum a_k$  absolut konvergent.

*Beweis.* Z.z.  $\sup \sum_{k=1}^n |a_k| < \infty$  (Lemma zur Konvergenz von Reihen mit nichtnegativen Gliedern). Nach Voraussetzung gibt es  $C \geq 0$  mit  $\sum_{k=k_0}^n b_k \leq C$  für all  $n \geq k_0$ . Damit folgt

$$\sum_{k=1}^n |a_k| \leq \sum_{k=1}^{k_0-1} |a_k| + \sum_{k=k_0}^n |a_k| \leq \sum_{k=1}^{k_0-1} |a_k| + \sum_{k=k_0}^n b_k \leq \sum_{k=1}^{k_0-1} |a_k| + C$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$ .  $\square$

**Beispiel.** (Dezimalzahldarstellung) Ist  $(a_n)$  eine Folge mit Werten in  $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ , so konvergiert

$$\sum_{k \geq 1} a_k 10^{-k}$$



absolut.

Bew. Sei  $b_k := 9/10^k$ . Dann gilt  $|a_k 10^{-k}| \leq b_k$  und  $\sum b_k$  existiert (da geometrische Reihe).

### Weitere Beispiele.

- $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2}$  konvergiert absolut.  
Bew.  $0 \leq 1/k^2 \leq 1/k(k-1)$  und  $\sum 1/k(k-1)$  konvergent.  
Nun folgt Beh. aus Majorantenkriterium.
- $\sum_{k \geq 1} \frac{n!}{n^n}$  konvergiert absolut.  
Bew.  $\frac{n!}{n^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{nn \dots n} \leq 2/n^2$  und  $\sum \frac{1}{n^2}$  konvergiert. Nun folgt Beh. aus Majorantenkriterium.

Man kann das Majorantenkriterium auch umdrehen.

**FOLGERUNG. (Minorantenkriterium)** Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$  und  $b_k \geq 0$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . Gilt  $b_k \geq |a_k|$  für alle  $k \in \mathbb{N}$  ab einem  $k_0$  und ist  $\sum a_k$  divergent, so ist auch  $\sum b_k$  divergent.

*Beweis.*  $\sum b_k$  konvergent  $\implies \sum |a_k|$  absolut konvergent. Widerspruch.  $\square$

### Beispiele.

- $\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$  ist divergent.  
Bew.  $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \geq \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+1)}} = \frac{1}{n+1}$  und  $\sum \frac{1}{n+1}$  divergent (harmonische Reihe).
- Sei

$$a_k := (\text{k-te ungerade natürliche Zahl})^{-1} = \frac{1}{2k-1}$$

und

$$b_k := (\text{k-te gerade natürliche Zahl})^{-1} = \frac{1}{2k}.$$

Dann ist  $\sum a_k$  und  $\sum b_k$  divergent.

Bew. Wäre eine der beiden Summen konvergent, so müsste auch die andere konvergieren nach dem Majorantenkriterium. Dann wäre aber auch die harmonische Reihe konvergent.

**THEOREM. (Quotientenkriterium)** Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$  mit  $a_k \neq 0$  für alle  $k$  ab einem  $k_0$ . Gilt  $q := \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1$ , so konvergiert  $\sum a_k$  absolut. Gilt  $p := \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} > 1$ , so divergiert  $\sum a_k$ .

*Beweis.*  $q < 1$ : Sei  $\tilde{q}$  eine Zahl mit  $q < \tilde{q} < 1$ . (Zeichnung.) Wegen  $q = \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}$  gibt es  $N \in \mathbb{N}$  mit

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \leq \tilde{q}$$

für alle  $k \geq N$ . Das impliziert

$$|a_n| \leq \tilde{q}|a_{n-1}| \leq \cdots \leq \tilde{q}^{n-N}|a_N| \leq C\tilde{q}^n$$

für alle  $n \geq N$ . Weiterhin ist  $C \sum_{n \geq N} \tilde{q}^n$  konvergent (als geometrische Reihe). Damit folgt nach dem Majorantenkriterium die absolute Konvergenz der ursprünglichen Reihe.

$q > 1$ : Ähnlich wie im vorigen Fall schließt man, daß ein  $N \in \mathbb{N}$  existiert mit

$$|a_{k+1}|/|a_k| \geq 1$$

für alle  $k \geq N$ . Damit folgt

$$|a_k| \geq |a_{k-1}| \geq \cdots \geq |a_N|$$

für alle  $k \geq N$ . Also ist  $|a_k|$  keine Nullfolge. Damit konvergiert die Reihe nicht.  $\square$

← Ende der 17. Vorlesung

**Bemerkung.** Für  $q = 1$  bzw.  $p = 1$  ist jedes Konvergenzverhalten möglich.

-  $a_k = \frac{1}{k}$ . Dann  $q = p = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/(k+1)}{1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} = 1$  und  $\sum a_k$  divergent.

-  $a_k = \frac{1}{k^2}$ . Dann  $q = p = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/(k+1)^2}{1/k^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{(k+1)^2} = 1$  und  $\sum a_k$  konvergent.

**Beispiel - Exponentialreihe.** Sei  $z \in \mathbb{C}$  beliebig und  $a_k := z^k/k!$ . Dann ist die Exponentialreihe

$$\sum_{k \geq 0} a_k = \sum_{k \geq 0} \frac{z^k}{k!}$$

absolut konvergent und der Grenzwert wird als  $e^z$  bezeichnet.

Bew. Das folgt aus dem Quotientenkriterium wegen

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{|z^{k+1}/(k+1)!|}{|z^k/k!|} = \frac{|z|}{|k+1|} \rightarrow 0 < 1.$$

**THEOREM. (Wurzelkriterium)** Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$  und  $q := \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$ . Gilt  $q < 1$ , so ist  $\sum a_k$  absolut konvergent. Gilt  $q > 1$  so ist  $\sum a_k$  divergent.

*Beweis.*  $q < 1$ : Sei  $\tilde{q}$  mit  $q < \tilde{q} < 1$  und  $N \in \mathbb{N}$  mit

$$\sqrt[k]{|a_k|} \leq \tilde{q}$$

für alle  $k \geq N$ . Damit gilt also

$$|a_k| \leq \tilde{q}^k$$

für alle  $k \geq N$ . Die Reihe  $\sum_{k \geq N} \tilde{q}^k$  konvergiert (geometrische Reihe). Damit folgt aus dem Majorantenkriterium die absolute Konvergenz von  $\sum a_k$ .

$q > 1$ : Es gibt unendlich viele  $k$  mit  $\sqrt[k]{|a_k|} \geq 1$ , also  $|a_k| \geq 1$ . Damit ist  $|a_k|$  keine Nullfolge. □

**Bemerkung.** Für  $q = 1$  ist jedes Konvergenzverhalten möglich.

-  $a_k = 1/k$ . Dann  $q = \lim \sqrt[k]{1/k} = 1$  und  $\sum a_k$  divergent.

-  $a_k = 1/k^2$ . Dann  $q = \lim \sqrt[k]{1/k^2} = 1$  und  $\sum a_k$  konvergent.

**Beispiel.**  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^{n^2}$  keine Nullfolge,  $b_n = \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}}$ . Dann folgt aus dem Wurzelkriterium wegen  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = 1/e$  die Konvergenz.

**Bemerkung.** Das Quotientenkriterium ist (oft) leichter anzuwenden als das Wurzelkriterium. Das Wurzelkriterium ist aber stärker. Genauer gilt:

- Ist  $b_n > 0$ , so gilt  $\limsup \sqrt[n]{b_n} \leq \limsup \frac{b_{n+1}}{b_n} = q$ . (siehe Weihnachtszettel). Idee :

$$\sqrt[n]{b_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{b_1}} \sqrt[n]{b_1 \frac{b_2}{b_1} \cdots \frac{b_n}{b_{n-1}}} \approx \sqrt[n]{\frac{b_{N+1}}{b_N} \cdots \frac{b_n}{b_{n-1}}} \leq \sqrt[n]{q^{n-N}} = q.$$

- Es gibt Reihen, deren Konvergenz aus dem Wurzelkriterium folgt aber nicht aus dem Quotientenkriterium. Ein Beispiel ist folgendes:

$$a_k := \begin{cases} 2^{-k} & : \text{ k gerade} \\ 3^{-k} & : \text{ k ungerade} \end{cases}$$

Dann ist  $\sqrt[k]{a_k}$  gleich  $1/2$  oder  $1/3$ , also  $\limsup \sqrt[k]{a_k} = 1/2 < 1$  aber es gilt

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \begin{cases} \frac{2^{k-1}}{3^k} & : \text{ k gerade} \\ \frac{3^k}{2^{k+1}} & : \text{ k ungerade} \end{cases}$$

Für reelle Reihen gibt es zwei weitere Konvergenzkriterien, die von der Ordnungsstruktur von  $\mathbb{R}$  Gebrauch machen.

**THEOREM. (Leibnizkriterium)** Sei  $(a_n)$  eine monoton fallende Nullfolge in  $\mathbb{R}$  (d.h.  $a_k \geq a_{k+1} \geq \cdots \geq 0$  und  $a_k \rightarrow 0$ ). Dann ist die alternierende Reihe  $\sum (-1)^k a_k$  konvergent.

*Beweis.* Sei  $n > l$ . Dann gilt

$$\left| \sum_{k=l}^n (-1)^k a_k \right| = |a_l - a_{l+1} + a_{l+2} - \cdots - a_n| \leq |a_l| \rightarrow 0, l \rightarrow \infty.$$

Hier: Erste Gleichung: Kein Vorzeichen bei  $a_l$ , da Betrag; Zweite Gleichung: Formaler Beweis durch Induktion, Zeichnung, nutze Monotonie; Konvergenz gegen 0, da Nullfolge).

Damit ist  $\sum (-1)^k a_k$  eine Cauchy-Folge, also konvergent. □

**Bemerkung.** Die Voraussetzungen sind nötig:

Nullfolge: Immer nötig.

Monotonie:  $a_n = 2/n$ ,  $n$ -gerade;  $a_n = 0$ , sonst. Dann ist  $\sum (-1)^n a_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots$  divergent.

**THEOREM.** (*Verdichtungskriterium*) Sei  $(a_n)$  eine nichtnegative fallende Folge in  $\mathbb{R}$  (d.h.  $a_k \geq a_{k+1} \geq \dots \geq 0$ .) Dann konvergiert  $\sum_{k \geq 1} a_k$  genau dann wenn  $\sum_{p \geq 1} 2^p a_{2^p}$  konvergiert.

*Beweis.* **Zeichnung.** Einteilung von  $\mathbb{N}$  in die Abschnitte von  $[2^p, 2^{p+1})$ .

Für  $p \in \mathbb{N}$  setze  $C_p := \sum_{k=2^p}^{2^{p+1}-1} a_k$ . ( $2^p$ -Terme). Aufgrund der Monotonie gilt

$$(*) \quad 2^p a_{2^{p+1}} \leq C_p \leq 2^p a_{2^p}.$$

Aufgrund der Nichtnegativität der  $C_p$  und  $a_k$  reicht es jeweils Beschränktheit zu zeigen. Es gilt also

$$\begin{aligned} \sum_{p \geq 1} 2^p a_{2^p} \text{ konvergent} &\iff \sum_{p \geq 1} 2^p a_{2^p} \text{ beschränkt} \stackrel{(*)}{\iff} \sum C_p \text{ beschränkt} \\ &\iff \sum a_k \text{ beschränkt} \iff \sum a_k \text{ konvergent.} \end{aligned}$$

□

**Beispiel.** Sei  $\alpha > 0$ . Dann gilt  $\sum \frac{1}{n^\alpha}$  konvergent  $\iff \alpha > 1$ .

Bew. Nach dem Verdichtungskriterium ist  $\sum \frac{1}{n^\alpha}$  konvergent genau dann wenn  $\sum 2^p / (2^p)^\alpha = \sum 1 / (2^{\alpha-1})^p$  konvergiert. Letzteres ist eine geometrische Reihe mit  $q = 1/2^{\alpha-1}$ .

Ist  $\alpha > 1$ , so ist  $2^{\alpha-1} > 1$  also  $0 < q < 1$  und die geometrische Reihe konvergiert.

Ist  $\alpha \leq 1$ , so ist  $2^{\alpha-1} \leq 1$  also  $1 \leq q$  und die geometrische Reihe divergiert.

Wir betrachten jetzt noch Doppelsummen. Es geht also um

$$a : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}, (i, j) \mapsto a_{ij} = a(i, j)$$

und wir fragen,

- ob  $\sum a(n, m)$  in irgendeinem Sinne existiert
- und, wenn ja, ob es egal ist, wie man summiert d.h. ob gilt:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i,j=1}^N a(i, j) = \sum_{N=1}^{\infty} \sum_{k=1}^N a(k, N - k + 1) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}.$$

**Zeichnung** zu den verschiedenen Summationsarten!

Das ist von eigenem Interesse und nützlich zum Studium von Produkten von Reihen und Umordnungen.

**Achtung.** Es geht um das Vertauschen von Grenzwerten!

**Gegenbeispiel.** Sei  $a_{ij}$  gegeben, so daß alle Einträge Null sind ausser auf der Diagonalen und der ersten unteren Nebendiagonalen. Seien die Einträge auf der Diagonalen  $1, 2, 4, 8, \dots$  und die Einträge auf der ersten Nebendiagonalen  $-1, -2, -4, -8, \dots$ . Dann sind alle Spaltensummen absolut konvergent und haben den Wert 0. Die  $k$ -te Zeilensumme ist absolut konvergent und hat den Wert  $2^{k-1}$ .

**Idee.** Gilt eine gleichmäßige Schranke an die Doppelsummen, so sitzt die wesentliche 'Masse' in einem (großen) Quadrat.

**PROPOSITION.** Sei  $a : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ . Es gebe  $C \geq 0$  mit  $\sum_{i,j=1}^m |a_{ij}| \leq C$  für alle  $m \in \mathbb{N}$ . Dann gilt:

- (a)  $\sum a_{\tau(k)}$  für jedes injektive  $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  absolut konvergent.  
 (b) Für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $L = L(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  mit  $\sum_{k=0}^{\infty} |a_{\sigma(k)}| \leq \varepsilon$  für jedes injektive  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  mit  $\sigma(k) \notin \{1, \dots, L\}^2$  für jedes  $k \in \mathbb{N}$ .

*Beweis.* (a) Zu  $n \in \mathbb{N}$  existiert  $m \in \mathbb{N}$  mit  $\{\tau(1), \dots, \tau(n)\} \subset \{1, \dots, m\}^2$ . Damit folgt

$$\sum_{k=0}^n |a_{\tau(k)}| \leq \sum_{ij=1}^m |a_{ij}| \leq C.$$

Da  $n \in \mathbb{N}$  beliebig war, folgt (a).

(b) Sei  $\varepsilon > 0$ . Nach Voraussetzung existiert

$$S := \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k,j=1}^N |a(j, k)|.$$

(Das ist die Summe über alle  $|a_{ij}|$ .) Daher existiert also ein  $L \in \mathbb{N}$  mit

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k,l=L}^N |a_{kl}| \leq \varepsilon. \quad (*)$$

Ist nun  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  injektiv mit  $\sigma(k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \setminus \{1, \dots, L\}^2$ , so folgt aus (\*)

$$\sum_{k=0}^m |a_{\sigma(k)}| \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k,l=L}^N |a_{kl}| \leq \varepsilon.$$

□

←  
Ende der 18. Vorlesung

**THEOREM.** (Konvergenz von Doppelsummen) Sei  $a : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben. Es gebe ein  $C \geq 0$  mit  $\sum_{i,j=1}^m |a_{ij}| \leq C$  für alle  $m \in \mathbb{N}$ . Dann existiert  $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$  für jedes  $i \in \mathbb{N}$  und es existiert  $\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$  für jedes  $j \in \mathbb{N}$  und die Reihen

$$\sum_{i \geq 1} \left( \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right), \sum_{j \geq 1} \left( \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right), \sum_{k \geq 1} \left( \sum_{l=1}^k a_{k-l+1,l} \right)$$

sind absolut konvergent und haben den gleichen Grenzwert, nämlich  $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i,j=1}^N a_{i,j}$ .

**Zeichnung** der Summen.

*Beweis.* Das folgt aus (a) und (b) der vorigen Proposition:

*Existenz der 'inneren' Summen:* Das folgt aus (a) der vorigen Proposition (z.B.  $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ,  $\tau(k) = a_{i,k} \dots$ )

*Absolute Konvergenz der Doppelsummen:* Das ist klar nach Voraussetzung, etwa

$$\sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right| = \sum_{i=1}^m \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_{ij} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \right| \leq C.$$

(Grenzwert vertauscht mit Beträgen und mit endlichen Summen.)

*Gleichheit der Grenzwerte:* Das folgt aus (b) der vorigen Proposition: In allen Summen wird über beliebig große Quadrate in  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  summiert. Nach (b) der vorigen Proposition sind Summen über Terme ausserhalb solcher Quadrate beliebig klein. Damit folgt die Aussage (Check!).  $\square$

Wir ziehen nun einige Folgerungen aus dem Satz.

**FOLGERUNG.** (*Cauchy-Produkt*) Seien  $(b_j), (c_i)$  Folgen in  $\mathbb{C}$  sodaß  $\sum b_j$  und  $\sum c_i$  absolut konvergent sind. Dann gilt

$$\left( \sum_{i=1}^{\infty} c_i \right) \left( \sum_{j=1}^{\infty} b_j \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^k c_{k-l+1} b_l$$

**Beachte.**  $\sum_{l=1}^k c_{k-l+1} b_l = \sum_{l=1}^k c_l b_{k-l+1}$ .

*Beweis.*  $C := \sum_{i=1}^{\infty} |c_i| < \infty$ ,  $B := \sum_{j=1}^{\infty} |b_j| < \infty$ . Setze  $a_{ij} := c_i b_j$ . Dann gilt

$$\sum_{ij=1}^m |a_{ij}| = \sum_{ij=1}^m |c_i b_j| = \sum_{ij=1}^m |c_i| |b_j| = \sum_{i=1}^m |c_i| \sum_{j=1}^m |b_j| \leq CB < \infty$$

für alle  $m \in \mathbb{N}$ . Damit erfüllt  $a$  die Voraussetzung des vorigen Satz. Dessen Aussage liefert dann die Behauptung.  $\square$

**Anwendung** (Funktionalgleichung der Exponentialfunktion):

Für die Exponentialfunktion  $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$  gilt

- $\exp(0) = 1$  und
- $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$  für alle  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  (Funktionalgleichung)

Insbesondere verschwindet  $\exp$  nirgends und es gilt

$$\frac{1}{\exp(z)} = \exp(-z).$$

*Beweis.*  $\exp(0) = 1$ . Das ist klar.

Es gilt die Funktionalgleichung. Das folgt mittels Cauchy-Produkt:

$$\begin{aligned}
 \exp(z_1) \exp(z_2) &= \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_1^k}{k!} \right) \left( \sum_{l=0}^{\infty} \frac{z_2^l}{l!} \right) \\
 \text{(Cauchy-Produkt)} &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n \frac{z_1^m z_2^{n-m}}{m!(n-m)!} \\
 \text{(Erweitern mit } 1 = n!/n!) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{m=0}^n \frac{n!}{m!(n-m)!} z_1^m z_2^{n-m} \\
 \text{(Binomi)} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (z_1 + z_2)^n \\
 &= \exp(z_1 + z_2).
 \end{aligned}$$

Zum 'Insbesondere'. Nach dem schon Bewiesenen gilt

$$1 = \exp(0) = \exp(z - z) = \exp(z) \exp(-z).$$

Das liefert die Aussage.  $\square$

**Bemerkung.** (Übung) Eine stetige (s.u.) Funktion  $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $E(x+y) = E(x)E(y)$  ist durch ihren Wert an der Stelle  $x = 1$  eindeutig bestimmt.

Wir kommen nun zur schon angesprochenen Stabilität von absolut konvergenter Reihen unter Umordnung.

**DEFINITION.** (Umordnung) Ist  $\sum_{k \geq 1} a_k$  eine Reihe und  $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  bijektiv, so heißt  $\sum_{k \geq 1} a_{\tau(k)}$  eine Umordnung der Reihe  $\sum_{k \geq 1} a_k$ .

**Beachte.** Umordnung summiert über 'dieselben' Terme in einer anderen Reihenfolge.

**FOLGERUNG.** (Absolute Konvergenz impliziert Stabilität unter Umordnung) Sei  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$ . Ist  $\sum_{k \geq 1} a_k$  absolut konvergent, so ist jede Umordnung absolut konvergent und hat denselben Grenzwert.

*Beweis.* Setze  $c_{ij} := a_{\tau(j)} = a_i$  falls  $i = \tau(j)$  und 0 sonst. **Zeichnung**  
Dann gilt

- $j$ -te Spalte enthält  $a_{\tau(j)}$  an der  $\tau(j)$ -ten Stelle (und sonst Nullen).
- $i$ -te Zeile enthält  $a_i$  an der Stelle  $j$  mit  $\tau(j) = i$  (und sonst Nullen).

Damit gilt

$$\sum_{j=1}^{\infty} c_{ij} = a_i$$

für jedes  $i \in \mathbb{N}$  und

$$\sum_{i=1}^{\infty} c_{ij} = a_{\tau(j)}$$

für jedes  $j \in \mathbb{N}$  sowie

$$\sum_{i,j=1}^m |c_{ij}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = C < \infty.$$

Damit liefert der vorige Satz die Behauptung.  $\square$

**Nach Hause nehmen.** Wenn die Reihen absolut konvergieren, darf man summieren wie man will und erhält immer den gleichen Grenzwert!

**Gegenbeispiel.** (Voraussetzung der absoluten Konvergenz ist nötig) Betrachte die Reihe

$$1 - 1 + 1/2 - 1/2 + 1/3 - 1/3 \dots$$

Dann gilt für die Partialsummen  $S_n$  also  $S_n = 0$  falls  $n$  gerade und  $S_n = 1/k$  falls  $n = 2k - 1$ . Damit folgt  $S_n \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ . Andererseits kann man die Summe so umordnen, daß sie divergiert:

$$(1 + 1/2) - 1 + (1/3 + \dots + 1/k) - 1/2 + (1/(k+1) + \dots + \frac{1}{n}) - 1/3..$$

so daß man immer wieder Summanden  $\geq 1/2$  erhält...

Dieses Verfahren lässt sich verallgemeinern und führt auf den folgenden Satz:

**THEOREM.** (Riemannscher Umordnungssatz) Ist  $(a_k)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$  und  $\sum a_k$  konvergent aber nicht absolut konvergent, so existiert zu jedem  $s \in \mathbb{R}$  eine Umordnung  $\tau$  mit  $s = \sum_{k=1}^{\infty} a_{\tau(k)}$ . Ebenso existieren bestimmt divergente Umordnungen zu  $+\infty$  und  $-\infty$ .

*Beweis.* Wir geben eine Skizze. Die Grundidee ist, daß Konvergenz der Reihe ohne absolute Konvergenz nur auftreten kann, wenn die Reihe in zwei Teile zerlegt werden kann, die sich zu  $+\infty$  bzw  $-\infty$  addieren. Durch geeignetes 'Verschieben' der Balance zwischen diesen beiden Teilen lässt sich dann die gewünschte Konvergenz der Umordnung erzwingen.

Hier sind die Details: Teile die Folge  $(a_k)$  in positive und nichtpositive Terme wie folgt: Sei

$$a_k^+ := k\text{-tes positives Element von } (a_k)$$

und

$$a_k^- := -k\text{-tes nichtpositives Element von } (a_k).$$

Setze

$$A^+ := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k^+, \quad A^- := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k^-,$$



wobei der Wert  $\infty$  möglich ist. Dann gilt:

- $A^+ := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k^+ = \infty$  und  $A^- := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k^- = \infty$ .
- $(a_n^+)$  und  $(a_n^-)$  sind Nullfolgen.

$(A^+, A^- = \infty)$ :

Bew. Angenommen  $A^+$  und  $A^-$  endlich: Widerspruch zu  $\sum a_n$  nicht absolut konvergent. Angenommen:  $A^+$  endlich und  $A^-$  unendlich (oder umgekehrt): Widerspruch zu  $\sum a_n$  konvergent.

Nullfolge: klar (da Summe konvergiert). )

Nun gehe so vor: Summiere  $a_k^+$  bis gerade  $s$  überschritten wird; summiere nun  $a_k^-$  bis  $s$  gerade unterschritten wird etc. Wegen  $A^+, A^- = \infty$  kann dieses Verfahren beliebig fortgesetzt werden. Da  $(a_k^+)$  und  $(a_k^-)$  Nullfolgen sind, folgt die Behauptung.  $\square$

**FOLGERUNG.** (Absolute Konvergenz äquivalent zu unbedingter Konvergenz) Sei  $(a_n)$  eine Folge in  $\mathbb{C}$ . Dann sind äquivalent:

- (i) Es ist  $\sum a_n$  absolut konvergent.
- (ii) Es konvergiert jede Umordnung von  $\sum a_n$  (gegen denselben Grenzwert).

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii): s.o.

(ii)  $\implies$  (i): Anwenden des Riemanschen Umordnungssatzes auf Realteil und Imaginärteil der Summe liefert absolute Konvergenz von  $\sum \Re a_n$  und  $\sum \Im a_n$ . Damit folgt die Aussage.  $\square$

## Stetigkeit und Grenzwerte von Funktionen

Stetigkeit von Funktionen ist ein fundamentales Konzept der Analysis, das man als Anwendung des Grenzwertkonzeptes sehen kann. Die Grundidee ist folgende: Eine Funktion  $f$  heißt stetig im Punkt  $p$ , wenn sie Punkte  $q$ , die nahe an  $p$  liegen, auf Werte abbildet, die nahe an  $f(p)$  liegen:

- 'q nahe p impliziert  $f(q)$  nahe  $f(p)$ '.

**Zeichnung** 'typischer' stetiger und unstetiger Funktionen.

DEFINITION. (*Stetigkeit*) Sei  $D \subset \mathbb{C}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ . Dann heißt  $f$  stetig in  $p \in D$ , wenn für jedes  $\varepsilon > 0$  ein  $\delta > 0$  existiert mit

$$|f(q) - f(p)| < \varepsilon$$

für alle  $q \in D$  mit  $|q - p| < \delta$ . Ist  $f$  in jedem  $p \in D$  stetig, so heißt  $f$  stetig auf  $D$ .

Unter Nutzen des Konzeptes der Kugel / r-Umgebung  $U_r(z)$  mit Radius  $r > 0$  um  $z \in \mathbb{C}$  lässt sich obige Definition der Stetigkeit offenbar auch so ausdrücken: Es heißt  $f$  stetig in  $p$ , wenn zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $\delta > 0$  existiert mit

$$f(U_\delta(p) \cap D) \subset U_\varepsilon(f(p)).$$

Kurz: 'Zu jeder offenen Kugel um  $f(p)$  existiert eine Kugel um  $p$ , die in die Kugel um  $f(p)$  abgebildet wird.' **Zeichnung.**

**Bemerkung.** Eine Teilmenge von  $\mathbb{C}$  heißt Umgebung von  $z \in \mathbb{C}$  wenn ein  $r > 0$  existiert mit  $z \in U_r(z) \subset U$ . Ist  $D$  eine Teilmenge von  $\mathbb{C}$  und  $z \in D$ , so heißt eine Teilmenge  $U$  von  $D$  eine Umgebung von  $z$  in  $D$ , wenn ein  $r > 0$  existiert mit  $z \in U_r(z) \cap D \subset U$ . Damit ist dann eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  stetig in  $z$  genau dann, wenn das Urbild jeder Umgebung von  $f(z)$  eine Umgebung von  $z$  in  $D$  ist (Übung).

### Bemerkung

- Offenbar schließt diese Definition die Fälle ein, daß  $D \subset \mathbb{R}$  gilt und/oder  $f$  nur reelle Werte annimmt. Diesen Fällen werden wir uns später noch einmal besonders widmen.

- Ist  $p \in D$  ein isolierter Punkt von  $D$  (d.h. es existiert ein  $r > 0$  mit  $\{p\} = D \cap U_r(p)$  Zeichnung), so ist jedes  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  in  $p$  stetig. (Bew. Wähle  $\delta < r$ .)

### Beispiele.

- Die konstante Funktion  $D \rightarrow \mathbb{C} \ x \mapsto c$ , ist stetig.  
Bew. Es kann  $\delta > 0$  beliebig gewählt werden.
- $id : D \subset \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{C}, \ x \mapsto x$ , ist stetig.  
Bew. Es kann  $\delta = \varepsilon$  gewählt werden.
- Der Betrag  $|\cdot| : D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \ x \mapsto |x|$ , ist stetig.  
Bew. Dreiecksungleichung  $||x| - |y|| \leq |x - y|$  zeigt, daß  $\delta = \varepsilon$  gewählt werden kann.
- Für jedes  $k \in \mathbb{N}$  ist  $\sqrt[k]{\cdot} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  stetig  
Bew. Wir zeigen zunächst eine Zwischenbehauptung:

$$|\sqrt[k]{y} - \sqrt[k]{x}| \leq \sqrt[k]{|y - x|}$$

für alle  $x, y \geq 0$ .

Beweis der ZB: Ohne Einschränkung sei  $x < y$ . Dann gilt  $\sqrt[k]{y} > \sqrt[k]{x}$ . Es ist also

$$\sqrt[k]{y} \leq \sqrt[k]{y - x} + \sqrt[k]{x}$$

zu zeigen. Es reicht also zu zeigen, daß

$$(\sqrt[k]{y})^k \leq (\sqrt[k]{y - x} + \sqrt[k]{x})^k.$$

Das ist wahr nach dem binomischen Satz.

Nach der ZB kann  $\delta = \varepsilon^k$  gewählt werden.

**Beachte:** In bisherigen Beispielen konnte  $\delta$  unabhängig von  $x$  gewählt werden konnte. Das wird sich im nächsten Beispiel ändern:

- Die Exponentialfunktion  $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \ z \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$  ist stetig.  
Bew. Es gilt:

$$\exp(z) - \exp(z_0) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} (z^k - z_0^k) = (z - z_0) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^{k-1} z^{k-1-l} z_0^l.$$

Für  $z$  mit  $|z| \leq |z_0| + 1$  können wir dann abschätzen:

$$\begin{aligned} |\exp(z) - \exp(z_0)| &\leq |z - z_0| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^{k-1} (|z_0| + 1)^{k-1} \\ &= |z - z_0| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} k (|z_0| + 1)^{k-1} \\ (c := |z_0| + 1) &= |z - z_0| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} c^{k-1} \\ &= |z - z_0| \exp(c) \end{aligned}$$

Damit folgt

$$|\exp(z) - \exp(z_0)| \leq C|z - z_0|$$

mit  $C := \exp(c)$ . Für  $z$  mit  $|z| \leq |z_0| + 1$  und  $|z - z_0| < \varepsilon/C$  gilt dann also  $|\exp(z) - \exp(z_0)| < \varepsilon$ . Damit folgt Stetigkeit (mit  $\delta = \min\{1, \varepsilon/C\}$ ).

Wir diskutieren nun noch kurz eine Verschärfung des Konzeptes der Stetigkeit, die durch die Beispiele nahegelegt wird:

**DEFINITION.** Eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  heißt *gleichmäßig stetig*, wenn zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $\delta > 0$  existiert mit

$$|f(p) - f(q)| < \varepsilon$$

für alle  $p, q \in D$  mit  $|p - q| < \delta$ .

**Kurzfassung:** Stetigkeit:  $\delta = \delta(\varepsilon, x)$ . Gleichmäßige Stetigkeit  $\delta = \delta(\varepsilon)$ .

Nach diesen einzelnen Beispielen kommen wir noch zu zwei Klassen von stetigen Funktionen.

**Potenzreihen.** Sei  $(a_n)$  in  $\mathbb{C}$  mit  $\limsup \sqrt[k]{|a_k|} =: \rho < \infty$  und  $R := 1/\rho$  (mit  $R = \infty$  falls  $\rho = 0$ ). Dann ist

$$f : U_R \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$$

durch eine absolut konvergente Reihe definiert und stetig.

Bew. Wir betrachten nur den Fall  $R < \infty$ . (Der andere Fall ist leichter.)

*Reihe ist absolut konvergent:* Das folgt aus dem Wurzelkriterium mit

$$\limsup \sqrt[k]{|a_k z^k|} = \limsup |z| \sqrt[k]{|a_k|} = |z| \rho < R \rho = 1.$$

*Stetigkeit:* Wie im Beispiel der Exponentialfunktion ergibt sich

$$|f(z) - f(z_0)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k (z - z_0) \sum_{l=0}^{k-1} z^{k-1-l} z_0^l.$$

Für  $z$  mit  $|z| < \frac{|z_0|+R}{2} =: c < R$  (Zeichnung) ergibt sich dann

$$|f(z) - f(z_0)| \leq |z - z_0| \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| k c^{k-1} = C|z - z_0|$$

mit  $C := \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| k c^{k-1} < \infty$ . (Hier folgt Endlichkeit von  $C$  nach dem Wurzelkriterium, Check!) Damit folgt Stetigkeit (mit  $\delta = \min\{\varepsilon/C, c - |z_0|\}$ ).

Es heißt  $R$  der *Konvergenzradius* der Potenzreihe  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ . Es ist  $R$  charakterisiert durch folgende Eigenschaft:

- Für  $|z| < R$  ist  $\sum a_k z^k$  absolut konvergent. (Bew. s.o.)
- Für  $|z| > R$  ist  $\sum a_k z^k$  divergent. (Klar, da dann  $|a_k z^k|$  keine Nullfolge ist.)

Ist insbesondere  $\sum a_k z^k$  konvergent für ein  $z$ , so folgt  $|z| \leq R$ . Damit gilt also

$$R = \sup\{r : \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \text{ konvergent für ein } z \text{ mit } |z| = r\}.$$

**Lipschitzstetige Funktionen.** Eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  heißt lipschitzstetig, wenn ein  $C \geq 0$  existiert mit

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$$

für alle  $x, y \in D$ . Offenbar ist jede lipschitzstetige Funktion (gleichmäßig) stetig (mit  $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$ ). Typische Beispiele von Lipschitzstetigen Funktionen sind folgende:

- Lineare Funktionen  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(x) = ax + b$ .
- $|\cdot|$ ,  $\Re$ ,  $\Im$ ,  $id$  auf  $\mathbb{C}$ .
- (Übung) Ist  $A \subset \mathbb{C}$ , so ist die zugehörige Distanzfunktion

$$d = d_A : \mathbb{C} \rightarrow [0, \infty), \quad d(z) := \inf\{|z - w| : w \in A\}$$

Lipschitzstetig mit  $C = 1$ .

Die Wurzel  $\sqrt[k]{\cdot} : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ist nicht lipschitzstetig. (Übung)

**Bemerkung.** Eine noch allgemeinere Klasse stetiger Funktionen bilden die *hölderstetigen Funktionen*. Eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  heißt hölderstetig mit Exponent  $\alpha > 0$ , wenn ein  $C > 0$  existiert mit  $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$  für alle  $x, y \in D$  mit  $|x - y| < 1$ . Jede Hölderstetige Funktion ist stetig.

(Bew. Ist  $\alpha = 1/k$  so folgt dies aus der Stetigkeit der  $k$ -ten Wurzel. Zur Behandlung eines beliebigen  $\alpha > 0$  wählt man ein  $k \in \mathbb{N}$  mit  $\frac{1}{k} < \alpha$  und nutzt  $|x - y|^\alpha < |x - y|^{1/k}$  für  $|x - y| < 1$ .)

Übung: Ist  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  Hölderstetig mit Exponent  $\alpha > 1$ , so ist  $f$  konstant.

(**Bemerkung.** Manchmal wird auch in der Definition der Hölderstetigkeit die Einschränkung  $|x - y| < 1$  weggelassen. Dann würde man

die oben definierte Klasse als lokal hölderstetige Funktionen bezeichnen. Auf beschränkten Mengen  $D$  stimmen die beiden Definitionen überein. Für unbeschränkte Mengen ist das im allgemeinen nicht der Fall (so sind etwa lineare nichtkonstante Funktionen  $g$  auf  $\mathbb{R}$  hölderstetig im obigen Sinne, erfüllen aber nicht  $|g(x) - g(y)| \leq C|x - y|^\alpha$  für  $0 \leq \alpha < 1$  für alle  $x, y \in \mathbb{R}$ ). Dann hat obige Definition den Vorteil, daß jede Lipschitzstetige Funktion automatisch hölderstetig zu jedem Exponente  $0 \leq \alpha \leq 1$  ist.)

Zur Abgrenzung geben wir noch einige Beispiele von unstetigen Funktionen:

**Beispiel** (Heaviside Funktion) Die Funktion  $H : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$  mit  $H(x) = 0$  für  $x \leq 0$  und  $H(x) = 1$  für  $x > 0$  ist unstetig in  $x = 0$  und stetig in allen anderen Punkten.

**Beispiel.** Eine Funktion, die in keinem Punkt stetig ist, wird gegeben durch

$$1_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}, 1_{\mathbb{Q}}(x) := \begin{cases} 1 & : x \in \mathbb{Q} \\ 0 & : x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Bew. Das folgt, da  $\mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  dicht in  $\mathbb{R}$  sind, also jede  $\varepsilon$ -Kugel um ein  $p \in \mathbb{R}$  sowohl Punkte von  $\mathbb{Q}$  als auch von  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  enthält.

**Beispiel.** (Übung) Die Funktion

$$N : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad N(x) := \begin{cases} 0 & : x \text{ irrational} \\ \frac{1}{p} & : x = q/p \text{ mit } p \in \mathbb{N} \text{ und } q \in \mathbb{Z} \text{ teilerfremd} \end{cases}$$

ist stetig in allen irrationalen Punkten und unstetig in den rationalen Punkten.

Es lässt sich Stetigkeit einer Funktion mit Konvergenz von Folgen charakterisieren und das ist sehr nützlich (da wir gut mit konvergenten Folgen umgehen können).

**LEMMA.** (Folgencharakterisierung der Stetigkeit) Sei  $D \subset \mathbb{C}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben. Dann sind für  $p \in D$  äquivalent:

- (i) Es ist  $f$  stetig in  $p$ .
- (ii) Für jede Folge  $(p_n)$  in  $D$  mit  $p_n \rightarrow p$  gilt  $f(p_n) \rightarrow f(p)$ .

*Beweis.* Sei  $c = f(p)$ .

(i)  $\implies$  (ii):  $p_n \rightarrow p$  (z.z.  $f(p_n) \rightarrow c$ .) Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann existiert nach (i) ein  $\delta > 0$  mit  $|f(q) - c| < \varepsilon$  für alle  $q \in D$  mit  $|q - p| < \delta$ . Wegen  $p_n \rightarrow p$  existiert ein  $N = N_\delta \in \mathbb{N}$  mit  $|p_n - p| < \delta$  für  $n \geq N_\delta$ . Damit gilt für  $n \geq N$  also  $|f(p_n) - c| \leq \varepsilon$ .

(ii)  $\implies$  (i): Angenommen nein: Dann existiert ein  $\varepsilon > 0$  'ohne  $\delta$ ', d.h. mit der Eigenschaft, daß für jedes  $n \in \mathbb{N}$  ein  $p_n \in D$  existiert mit

$|p_n - p| < \frac{1}{n}$  aber  $|f(p_n) - c| \geq \varepsilon$ . Dann gilt  $p_n \rightarrow p$  aber nicht  $f(p_n) \rightarrow c$ .  
Widerspruch. □

Aus dieser Charakterisierung von Stetigkeit erhalten wir sofort einige Rechenregeln für stetige Funktionen (die wir natürlich auch direkt zeigen könnten).

**PROPOSITION.** (Rechenregeln)  $D \subset \mathbb{C}$  und  $f, g : D \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben. Seien  $f, g$  stetig in  $p$ . Dann gilt:

(a) Es ist  $f + \alpha g : D \rightarrow \mathbb{C}$  stetig in  $p$ .

(b) Es ist  $fg : D \rightarrow \mathbb{C}$  stetig in  $p$ .

(c) Gilt  $g(p) \neq 0$ , so existiert ein  $r > 0$  mit  $g(q) \neq 0$  für alle  $q \in U_r(p)$  und es ist  $f/g : U_r(p) \cap D \rightarrow \mathbb{C}$  stetig in  $p$ .

(d) Seien  $u : D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  und  $v : E \rightarrow \mathbb{C}$  und  $p \in D$  gegeben mit  $u(D) \subset E$ . Ist  $u$  stetig in  $p$  und  $v$  stetig in  $u(p)$ , so ist  $v \circ u : D \rightarrow \mathbb{C}$  stetig in  $p$ .

*Beweis.* (a) und (b) folgen direkt aus den Rechenregeln für konvergente Folgen.

(c) folgt direkt aus den Rechenregeln für konvergente Folgen, wenn man noch nutzt, daß  $g$  aufgrund der Stetigkeit in einer Kugel um  $p$  nicht verschwindet.

(d)  $p_n \rightarrow p \implies u(p_n) \rightarrow u(p) \implies v(u(p_n)) \rightarrow v(u(p))$ . □

**Beispiel.** Ist  $P$  ein Polynom d.h.  $P(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j$ , so ist  $f(z) = P/\exp$  stetig.

Wir systematisieren jetzt die obigen Betrachtungen durch das Konzept des **Grenzwertes einer Funktion in einem Punkt**. Dabei werden wir auch Punkte zulassen, in denen die Funktionen nicht definiert ist (in deren Nähe sie aber definiert ist). Für solche Punkte ist die Frage nach Existenz von Grenzwerten gerade die Frage nach stetiger Fortsetzbarkeit der Funktion. Für Punkte, in denen die Funktion definiert ist, ist Frage nach der Existenz von Grenzwerten gerade die Frage nach Stetigkeit der Funktion.

Wir führen zunächst die Punkte ein, um die es uns geht.

**DEFINITION.** Sei  $D \subset \mathbb{C}$ . Ein  $x \in \mathbb{C}$  heißt *Berührungspunkt* von  $D$ , wenn es eine Folge in  $D$  gibt die gegen  $x$  konvergiert.

**Bemerkung.**

- Es ist  $x$  Berührungspunkt von  $D$  genau dann, wenn  $D \cap U_r(x) \neq \emptyset$  für alle  $r > 0$ . (Einfach)
- Es gibt zwei Typen von Berührungspunkten von  $D$ : (Zeichnung)
  - Punkte aus  $D$  (Wähle  $x_n \equiv x$ .)

- Punkte aus  $\mathbb{C} \setminus D$ , die von  $D$  den 'Abstand 0 haben' d.h. für die in jeder Umgebung ein Punkt von  $D$  liegt. Beispiel:  $D = (a, b)$  hat die  $a, b$ .

← Ende der 20. Vorlesung.

LEMMA. (*Grenzwert einer Funktion an Berührungspunkt*) Sei  $D \subset \mathbb{C}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben. Sei  $p$  ein Berührungspunkt von  $D$ . Für  $c \in \mathbb{C}$  sind äquivalent:

- (i) Für jede Folge  $(p_n)$  in  $D$  mit  $p_n \rightarrow p$  gilt  $f(p_n) \rightarrow c$ .
- (ii) Für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$  mit  $|f(q) - c| \leq \varepsilon$  für alle  $q \in D$  mit  $|q - p| < \delta$ .

*Beweis.* Die Aussage verallgemeinert die Folgencharakterisierung der Stetigkeit. Der Beweis kann wortwörtlich von dort übernommen werden.  $\square$

Wieder lässt sich (ii) mittels offener Kugeln ausdrücken: Zu jedem  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$  mit

$$f(U_\delta(p) \cap D) \subset U_\varepsilon(c).$$

**Kurzfassung:** 'Zu jeder offenen Kugel um  $c$  existiert eine offene Kugel um  $p$ , die durch  $f$  in die Kugel um  $c$  abgebildet wird.' **Zeichnung.**

DEFINITION. (*Grenzwert einer Funktion*) In der Situation des Lemma, heißt  $c$  der Grenzwert von  $f$  bei  $p$ . Man schreibt  $c = \lim_{x \rightarrow p} f(x)$  oder  $f(x) \rightarrow c, x \rightarrow p$ .

**Beachte.** Ist  $p \in D$ , so muss gelten  $c = f(p)$ . (Wähle  $x_n = p$ ).

Existenz des Grenzwertes in einem Punkt ist äquivalent zu Stetigkeit (falls der Punkt zum Definitionsbereich gehört) und zu Fortsetzbarkeit zu einer im Punkt stetigen Funktion (falls der Punkt nicht zum Definitionsbereich gehört):

FOLGERUNG. (*Existenz des Grenzwertes und Stetigkeit*) Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben. Sei  $p$  ein Berührungspunkt von  $D$ . Dann gilt:

(a) Gehört  $p$  zu  $D$ , so sind äquivalent:

- (i) Es existiert  $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ .
- (ii)  $f$  ist stetig in  $p \in D$ .

(b) Gehört  $p$  zu  $\mathbb{C} \setminus D$ , so sind äquivalent:

- (i) Es existiert  $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ .
- (ii)  $f$  besitzt eine stetige Fortsetzung  $\tilde{f}$  auf  $D \cup \{p\}$ .

In diesem Fall ist diese Fortsetzung eindeutig bestimmt und gegeben durch

$$\tilde{f}(x) = f(x) \text{ für } x \in D \text{ und } \tilde{f}(p) = c.$$



*Beweis.* Das folgt sofort aus den Definitionen und dem vorangegangenen Lemma.  $\square$

Wir betrachten nun noch zwei besondere Situationen, nämlich einerseits den Fall, daß  $D \subset \mathbb{R}$  ist, und andererseits den Fall, daß  $f$  nur reelle Werte annimmt.

DEFINITION. Sei  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  und  $p \in D$  gegeben.

(a) Ist  $p$  ein Berührungspunkt von  $D \cap (p, \infty)$ , so nennt man, falls existent,  $\lim_{q \rightarrow p} f|_{D \cap (p, \infty)}$  den rechtsseitigen Grenzwert von  $f$  in  $p$  und bezeichnet ihn auch als

$$\lim_{q \rightarrow p^+} f(x).$$

(Bsp:  $D = (p, \infty)$ ).

(b) Ist  $p$  ein Berührungspunkt von  $D \cap (-\infty, p)$ , so nennt man, falls existent,  $\lim_{q \rightarrow p} f|_{D \cap (-\infty, p)}$  den linksseitigen Grenzwert von  $f$  in  $p$  und bezeichnet ihn auch als

$$\lim_{q \rightarrow p^-} f(x).$$

(Bsp.  $D = (-\infty, p)$ ).

Nach dem vorangehenden Lemma lautet das ausgeschrieben so:  $\lim_{q \rightarrow p^+} f(q) = c$ :

$$\iff$$

Für alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$  mit  $|f(q) - c| < \varepsilon$  für alle  $q \in D$  mit  $|q - p| < \delta$  **und**  $q > p$

$$\iff$$

Es gilt  $f(p_n) \rightarrow f(p)$  für jede Folge  $(p_n)$  in  $D$  mit  $p_n \rightarrow p$  **und**  $p_n > p$ .  
 $\lim_{q \rightarrow p^-} f(q) = c$ : Analog (zur Übung überlassen).

**Beispiele.** (Existenz links- und rechtsseitiger Grenzwerte ohne Stetigkeit)

- $f = 1_{(-\infty, 0]} : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ . Links- und rechtsseitige Grenzwerte existieren in 0; es ist  $f$  aber nicht stetig in 0. **Zeichnung.**
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 0$  für  $x < 0$ ,  $f(x) = 1/2$  für  $x = 0$  und  $f(x) = 1$  für  $x > 0$ . Links und rechtsseitige Grenzwerte existieren in 1; es ist  $f$  aber nicht stetig in 0. **Zeichnung.**
- $f : (0, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x$  für  $x \neq 1$ ,  $f(1) = 2$ . Links und rechtsseitige Grenzwerte existieren in 1; es ist  $f$  aber nicht stetig in 1.

THEOREM. (Charakterisierung Stetigkeit mit links- und rechtsseitigen Grenzwerten) Sei  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  und  $p \in D$  gegeben. Dann sind äquivalent:

- (i) Es ist  $f$  stetig in  $p$ .
- (ii) Es existieren  $\lim_{q \rightarrow p^+} f(q)$  und  $\lim_{q \rightarrow p^-} f(q)$  und stimmen mit  $f(p)$  überein.

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii):  $f$  stetig  $\implies \lim f(p_n) = f(p)$  für JEDE Folge  $(p_n) \rightarrow p$ . Damit folgt (i).

(ii)  $\implies$  (i): Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Dann gilt:

- $\lim_{q \rightarrow p^+} f(q) = f(p) \implies$  es existiert ein  $\delta_+$  mit  $|f(q) - f(p)| < \varepsilon$  für alle  $q > p$  mit  $|q - p| < \delta_+$ .
- $\lim_{q \rightarrow p^-} f(q) = f(p) \implies$  es existiert ein  $\delta_-$  mit  $|f(q) - f(p)| < \varepsilon$  für alle  $q < p$  mit  $|q - p| < \delta_-$ .

Mit  $\delta := \min\{\delta_+, \delta_-\}$  gilt dann

$$|f(p) - f(q)| < \varepsilon$$

für alle  $q$  mit  $|q - p| < \delta$ . □

**Bemerkung.** (Übung) Analog lässt sich für  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  zeigen:  $\lim f(p) = c \iff$  Es existieren links- und rechtsseitiger Grenzwert  $\lim_{q \rightarrow p^+} f(q)$  und  $\lim_{q \rightarrow p^-} f(q)$  und sind gerade  $c$ .

In der betrachteten Situation gibt es noch Grenzwerte bei  $\pm\infty$ : Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $p$  Berührungspunkt von  $D$ . Ist  $D \subset \mathbb{R}$  nach oben / unten unbeschränkt, und  $c \in \mathbb{R}$ , so definiert man

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = c \iff$  Für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert  $C \in \mathbb{R}$  mit  $|f(x) - c| < \varepsilon$  für alle  $x \in D$  mit  $x \geq C$  /  $x \leq C \iff$  Für jede Folge  $(x_n)$  in  $D$  mit  $x_n \rightarrow \pm\infty$  gilt  $f(x_n) \rightarrow c$ .

**Beispiel.** Betrachte  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann gilt  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$ .

Wir kommen nun zu der Situation, daß  $f$  nur reelle Werte annimmt.

**THEOREM.** Sei  $D \subset \mathbb{C}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $p \in D$  gegeben. Dann sind äquivalent:

- (i) Es ist  $f$  stetig in  $p$ .
- (ii) Es gilt:
  - Für jedes  $b > f(p)$  existiert ein  $\delta > 0$  mit  $f(q) < b$  für alle  $q \in D$  mit  $|q - p| < \delta$ . (' $f$  ist oberhalbstetig')
  - Für jedes  $a < f(p)$  existiert ein  $\delta > 0$  mit  $f(q) > a$  für alle  $q \in D$  mit  $|q - p| < \delta$ . (' $f$  ist unterhalbstetig')

*Beweis.* Das ist einfach und wird zur Übung überlassen. □

In dieser Situation gibt es noch den Fall, daß der Grenzwert  $\pm\infty$  ist: Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $p$  Berührungspunkt von  $D$ . Dann definiert man:  $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \pm\infty \iff$  Für jedes  $C \in \mathbb{R}$  existiert  $\delta > 0$  mit  $f(x) > C$  bzw.  $f(x) < C$  für alle  $x \in D$  mit  $|x - p| \leq \delta \iff$  Für jede Folge  $(x_n)$  in  $D$  mit  $x_n \rightarrow p$  gilt  $f(x_n) \rightarrow \pm\infty$ .

**Beispiel.** Betrachte  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x) = 1/x$ . **Zeichnung.** Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty.$$

Für  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $D \subset \mathbb{R}$  gibt es noch einen weiteren Grenzwert:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm\infty \iff$  Für alle  $C \in \mathbb{R}$  existiert ein  $S \in \mathbb{R}$  mit  $f(x) \geq C$  bzw.  $f(x) \leq C$  für alle  $x \geq S \iff$  Für jede Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{R}$  mit  $x_n \rightarrow \infty$  gilt  $f(x_n) \rightarrow \pm\infty$ .

Entsprechend definiert man  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty$ .

Wir kommen nun noch zu einer Stabilitätseigenschaft der Menge aller stetigen Funktionen auf einer Menge.

**DEFINITION.** Seien  $D \subset \mathbb{C}$  und  $f_n : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben. Dann heißt  $(f_n)$  gleichmäßig gegen  $f$  konvergent, wenn zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$  existiert mit

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

für alle  $x \in D$  und  $n \geq N_\varepsilon$ .

**Beispiele.**

- Sei  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$  und  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x|$ . Dann konvergiert  $f_n$  gleichmäßig gegen  $f$ .

Bew.  $|f_n(x) - f(x)| \leq \sqrt{\frac{1}{n}} \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$  (unabhängig von  $x$ !).

- Sei  $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $x \mapsto x^n$  und  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 0$ ,  $x < 1$  und  $f(1) = 1$ . Dann gilt  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  für jedes  $x \in [0, 1]$ ,  $f_n$  stetig für jedes  $n$ , aber  $f_n$  konvergiert nicht gleichmäßig.

Bew. Das kann man direkt sehen durch Untersuchen von  $x$ , die nahe an 1 liegen (**Zeichnung.**), oder aus dem folgenden Satz folgern, da  $f$  nicht stetig ist.

**THEOREM.** Seien  $D \subset \mathbb{C}$  und  $f_n : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , und  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben. Sind alle  $f_n$  stetig und konvergiert  $(f_n)$  gleichmäßig gegen  $f$ , so ist auch  $f$  stetig.

*Beweis.* Der Beweis wird mit einem sogenannten  $\frac{\varepsilon}{3}$ -Argument geführt. Sei  $p \in D$  gegeben. Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig.

- Aufgrund der gleichmäßigen Konvergenz existiert ein  $N \in \mathbb{N}$  mit  $|f(q) - f_N(q)| < \varepsilon/3$  für alle  $q \in D$ .
- Da  $f_N$  stetig ist, existiert ein  $\delta > 0$  mit  $|f_N(q) - f_N(p)| < \varepsilon/3$  für alle  $q \in D$  mit  $|q - p| < \delta$ .

Damit gilt für  $q$  mit  $|q - p| < \delta$  also

$$\begin{aligned} |f(q) - f(p)| &= |f(q) - f_N(q) + f_N(q) - f_N(p) + f_N(p) - f(p)| \\ &\leq |f(q) - f_N(q)| + |f_N(q) - f_N(p)| + |f_N(p) - f(p)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Das beendet den Beweis. □

**Bemerkung.** Der Beweis zeigt eigentlich noch mehr, nämlich eine punktweise Aussage: Konvergiert  $(f_n)$  gleichmäßig gegen  $f$  und sind alle  $f_n$  in  $p$  stetig, so ist auch  $f$  in  $p$  stetig.

## KAPITEL 9

### Funktionen auf Intervallen

In diesem Kapitel geht es um Funktionen

$$f : I \longrightarrow \mathbb{R},$$

wobei  $I \subset \mathbb{R}$  ein Intervall ist.

Dabei untersuchen wir zunächst stetige Funktionen. Für diese Funktionen gibt es (eigentlich nur) zwei Sätze und noch einen weiteren ;-)  
Diese Sätze lernen wir in diesem Abschnitt kennen.

Anschließend diskutieren wir noch eine weitere Klasse von Funktionen, nämlich die monotonen Funktionen. Für diese lässt sich Stetigkeit der Funktion und der Umkehrfunktion leicht charakterisieren.

**Zeichnung.** Stetigkeit mittels Intervallen.

**THEOREM.** (*Zwischenwertsatz*) Sei  $-\infty < a < b < \infty$  und  $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann nimmt  $f$  jeden Wert zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$  an. **Zeichnung**

*Beweis.* Ohne Einschränkung  $f(a) < f(b)$ . Sei  $f(a) < \gamma < f(b)$  beliebig. Zu zeigen: Es gibt ein  $c \in [a, b]$  mit  $f(c) = \gamma$ . Beginnend mit  $[a_1, b_1] = [a, b]$  konstruieren wir induktiv durch Halbierung der Intervalle eine Intervallschachtelung  $[a_n, b_n]$  mit

- $f(a_n) \leq \gamma \leq f(b_n)$
- $|b_n - a_n| = \frac{1}{2^{n-1}}|b - a|$ .

Die Folgen  $(a_n)$  und  $(b_n)$  konvergieren dann gegen den (eindeutigen) Punkt

$$c \in \bigcap [a_n, b_n].$$

Aufgrund der (Folgen) Stetigkeit gilt:

$$f(c) = \lim f(a_n) \leq \gamma \leq f(c) = \lim f(b_n) \geq \gamma.$$

Das beendet den Beweis. □

Wir geben jetzt noch eine Umformulierung des Satzes.

**THEOREM.** (*Zwischenwertsatz - Variante*) Sei  $I$  ein Intervall in  $\mathbb{R}$  und  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist  $J := f(I)$  ebenfalls ein Intervall. Genauer gilt

$$(\inf f(I), \sup f(I)) \subset J \subset [\inf f(I), \sup f(I)]$$

falls  $\inf f(I)$  und  $\sup f(I)$  endlich sind.

←  
Ende der 21. Vorlesung.

*Beweis.* Ohne Einschränkung seien  $\inf f(I)$  und  $\sup f(I)$  endlich.

Zweite Inklusion: klar.

Erste Inklusion: Reicht für jedes  $\varepsilon > 0$  zu zeigen, daß gilt

$$(\inf f(I) + \varepsilon, \sup f(I) - \varepsilon) \subset f(I).$$

Wähle dazu  $a \in I$  mit  $f(a) < \inf f(I) + \varepsilon$  und  $b \in I$  mit  $f(b) > \sup f(I) - \varepsilon$ . Nach dem Zwischenwertsatz gilt dann  $[f(a), f(b)] \subset f(I)$ .  
□

### Bemerkung.

- Aus der Variante folgt der Zwischenwertsatz (und umgekehrt).
- Ist  $I$  ein offenes Intervall, so kann man über Offenheit / Abgeschlossenheit von  $f(I)$  im allgemeinen keine Aussage treffen: (Identität auf  $(0, 1)$ ; Hut auf  $(0, 1)$ ). Im Falle von abgeschlossenen Intervallen ist die Lage anders. Das werden wir gleich untersuchen.

Offenbar impliziert der Zwischenwertsatz die folgende Aussage.

**FOLGERUNG.** Sei  $-\infty < a < b < \infty$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Gilt  $f(a) \leq 0 \leq f(b)$ , so hat  $f$  in  $[a, b]$  eine Nullstelle. **Zeichnung**

**Anwendung - Existenz der Wurzel.** Ist  $\alpha > 0$  so hat  $P : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $P(x) = x^n - \alpha$  ein Nullstelle.

Bew.  $P(0) = -\alpha < 0$  und  $P(1 + \alpha) > \alpha$  (nach Bernoulli-Ungleichung). Anwendung des Zwischenwertsatzes auf die Einschränkung von  $P$  auf  $[0, 1 + \alpha]$  liefert dann die Behauptung.

**Anwendung- Fixpunkt von Selbstabbildungen** Jede stetige Funktion  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  hat einen Fixpunkt (d.h. es gibt ein  $c \in [a, b]$  mit  $f(c) = c$ ). **Zeichnung**

Bew. Betrachte

$$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = f(x) - x.$$

Dann gilt (wegen  $f([a, b]) \subset [a, b]$ ) aber

$$g(a) = f(a) - a \geq 0, \quad g(b) = f(b) - b \leq 0.$$

Aus dem Zwischenwertsatz folgt Existenz eines  $c$  mit  $g(c) = 0$  d.h.  $f(c) = c$ .

Wir kommen nun zum anderen Satz über stetige Funktionen auf Intervallen.

**THEOREM.** (Existenz Minimum und Maximum stetiger Funktionen auf abg. beschränkten Intervall) Sei  $-\infty < a < b < \infty$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann nimmt  $f$  auf  $[a, b]$  Minimum und Maximum an, d.h. es gibt  $p_m$  und  $p_M$  in  $[a, b]$  mit

$$f(p_m) \leq f(p) \leq f(p_M)$$

für alle  $p \in [a, b]$ .

**Bemerkung.** Es ist nötig, daß  $I$  ein abgeschlossenes und beschränktes Intervall ist (vgl. id auf  $(0, 1)$  oder exp auf  $\mathbb{R}$ ).

*Beweis.* Wir zeigen nur die Aussage zum Maximum. Die Aussage zum Minimum kann ähnlich bewiesen werden.

Sei  $M := \sup f(I)$ . Sei  $(p_n)$  eine Folge in  $[a, b]$  mit  $f(p_n) \rightarrow M$ .

- Da  $[a, b]$  beschränkt ist, existiert nach dem Satz von Bolzano/Weierstraß eine konvergente Teilfolge  $(p_{n_k})$  von  $(p_n)$ .
- Da  $[a, b]$  abgeschlossen ist, gehört der Grenzwert  $p$  der konvergenten Teilfolge  $(p_{n_k})$  wieder zu  $[a, b]$ .

Es gilt also

$$p_{n_k} \rightarrow p \in [a, b].$$

Da  $f$  in  $p$  stetig ist, folgt dann

$$f(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) = M.$$

Das beendet den Beweis. □

Nach diesen beiden Sätzen kommen wir nun zum dritten Satz über stetige Funktionen auf Intervallen.

**THEOREM.** (*Gleichmässige Stetigkeit von stetigen Funktionen auf abgeschlossenen beschränkten Intervall*) Sei  $-\infty < a < b < \infty$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist  $f$  gleichmäßig stetig.

*Beweis.* Angenommen Nein! Dann existiert ein  $\varepsilon > 0$  'ohne  $\delta$ ' d.h. mit der Eigenschaft, daß für jedes  $n \in \mathbb{N}$  Punkte  $x_n, y_n \in [a, b]$  existieren mit

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \text{ aber } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon.$$

Durch Übergang zu einer Teilfolge können wir ohne Einschränkung annehmen, daß

$$x_n \rightarrow x \in [a, b].$$

Wegen  $|y_n - x_n| \leq \frac{1}{n}$  gilt dann auch  $y_n \rightarrow x \in [a, b]$ . Damit folgt

$$\begin{aligned} \varepsilon &\leq |f(x_n) - f(y_n)| \\ &= |f(x_n) - f(x) + f(x) - f(y_n)| \\ &\leq |f(x_n) - f(x)| + |f(x) - f(y_n)| \\ &\rightarrow 0, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Widerspruch. □

**Bemerkung.** Für die beiden vorangegangenen Schlüsse ist die entscheidende Eigenschaft der abgeschlossenen beschränkten Intervalle  $I$  die folgende:

- (K) Jede Folge mit Werten in  $I$  hat eine konvergente Teilfolge, deren Grenzwert wieder in  $I$  liegt.

Die Schlüsse gelten für jede andere Menge  $I$  mit dieser Eigenschaft ebenfalls (Check!). Solche Mengen heißen kompakt (s.u.).

Wir kommen nun zu monotonen Funktionen auf Intervallen.

DEFINITION. Sei  $D \subset \mathbb{R}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann heißt  $f$  monoton wachsend/fallend, wenn für alle  $x, y \in D$  mit  $x < y$  gilt

$$f(x) \leq f(y) \quad / \quad f(x) \geq f(y).$$

Gilt eine strikte Ungleichung, so heißt  $f$  streng oder strikt monoton wachsend/fallend.

### Beispiele.

- Die  $k$ -te Potenz auf  $[0, \infty)$  d.h. die Funktion  $(\cdot)^k : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^k$  ist streng monoton.

Bew.  $y > x$  impliziert  $y = x + h$  mit  $h > 0$ . Damit folgt Aussage aus binomischem Satz:

- Die  $k$ -te Wurzel  $\sqrt[k]{\cdot} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  ist streng monoton wachsend.

Bew. Das wissen wir schon.

- Auf  $\mathbb{R}$  ist die Exponentialfunktion  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), x \mapsto \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} x^n$  streng monoton wachsend.

Bew. Das folgt mit der Funktionalgleichung:  $y > x$  impliziert  $y = x + h$  mit  $h > 0$ . Damit folgt

$$\exp(y) = \exp(x + h) = \exp(x) \exp(h) > \exp(x)$$

da für  $h > 0$  gilt  $\exp(h) = 1 + \dots > 1$ .

LEMMA. (Hauptlemma monotone Funktionen) Sei  $-\infty < a \leq b < \infty$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  monoton. Dann existieren in jedem Punkt  $c \in [a, b]$  die halbseitigen Grenzwerte  $f(c_+) := \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$  und  $f(c_-) := \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$  und es gilt  $f(c_-) \leq f(c) \leq f(c_+)$ .

Beweis. Ohne Einschränkung sei  $f$  monoton wachsend. Wir zeigen nur die Aussage zum Grenzwert von links. Die andere Aussage folgt analog. Es ist  $\{f(x) : x < c\}$  durch  $f(c)$  nach oben beschränkt und besitzt daher ein Supremum  $M$ . Wir zeigen  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = M$ .

Ist nun  $\varepsilon > 0$  beliebig, so existiert ein  $x_\varepsilon < c$  mit  $M - \varepsilon \leq f(x_\varepsilon) \leq M$ . Setzt man  $\delta := c - x_\varepsilon$ , so gilt dann also für alle  $x < c$  mit  $|x - c| < \delta$  auch  $x_\varepsilon < x < c$ . **Zeichnung.** Damit gilt für solche  $x$  dann aufgrund der Monotonie

$$M - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq f(x) \leq M$$

also  $|f(x) - M| < \varepsilon$ . □

THEOREM. (Stetigkeitseigenschaft monotoner Funktionen) Sei  $-\infty < a \leq b < \infty$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  monoton. Dann ist  $f$  in einem Punkt  $c \in [a, b]$  entweder stetig, oder hat dort eine Sprungstelle (d.h. es existiert  $s > 0$  mit  $f(y) - f(x) \geq s$  für alle  $x, y \in [a, b]$  mit  $x < c < y$ ). Genauer gibt es vier Typen von Verhalten: **Zeichnung.**



- Es gilt  $f(c_-) = f(c_+)$ . Dann ist  $f$  stetig.
- Es gilt  $f(c_-) = f(c)$  und  $f(c) < f(c_+)$  und  $f$  ist unstetig.
- Es gilt  $f(c_-) < f(c) = f(c_+)$  und  $f$  ist unstetig.
- Es gilt  $f(c_-) < f(c) < f(c_+)$  und  $f$  ist unstetig.

---

 Ende 22. Vorlesung

**FOLGERUNG.** Sei  $I$  ein Intervall in  $\mathbb{R}$  und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  monoton. Dann ist  $f$  genau dann stetig, wenn  $f(I)$  ein Intervall ist.

*Beweis.*  $\implies$ : Das folgt aus dem Zwischenwertsatz (und hat nichts mit Monotonie zu tun).

$\impliedby$ : Wenn  $f(I)$  ein Intervall ist, kann  $f$  keine Sprungstelle haben. Damit folgt aus dem vorigen Korollar die Stetigkeit von  $f$ .  $\square$

Wir untersuchen nun Stetigkeit von Umkehrfunktionen monotoner Funktionen: Ist  $D \subset \mathbb{R}$  und

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

streng monoton, so ist  $f$  injektiv (klar...). Also existiert die Umkehrfunktion

$$g = f^{-1} : f(D) \rightarrow \mathbb{R}, \text{ mit } g(y) = x$$

für  $x \in D$  mit  $f(x) = y$ . Geometrisch entsteht die Umkehrfunktion durch Spiegeln an der Winkelhalbierenden. **Zeichnung** Ist  $f$  streng monoton wachsend/fallend, so ist auch  $g$  streng monoton wachsend/fallend. (Bew. Ohne Einschränkung  $f$  streng monoton wachsend. Sei  $y < y'$  und  $x, x'$  mit  $f(x) = y, f(x') = y'$ . Dann gilt also  $x \neq x'$ . Wäre  $x > x'$ , so folgte  $y = f(x) > f(x') = y'$ . Widerspruch.)

**Beispiel.**  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^k$ . Dann ist  $f$  streng monoton wachsend mit  $f([0, \infty) = [0, \infty)$  und die Umkehrfunktion  $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ist gegeben durch  $g(y) = \sqrt[k]{y}$ .

**THEOREM.** (Umkehrfunktion stetiger streng monotoner Funktionen ist stetig) Sei  $I$  ein Intervall in  $\mathbb{R}$  und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und streng monoton. Dann ist  $f(I)$  ein Intervall und die Umkehrfunktion  $g = f^{-1} : f(I) \rightarrow I \subset \mathbb{R}$  stetig.

*Beweis.* Es ist  $g$  streng monoton. Wegen  $g(f(I)) = I$  hat  $g$  keine Sprungstellen. Also ist  $g$  stetig.  $\square$

**Bemerkung.**

- Aussage und Beweis bleiben auch ohne die Voraussetzung der Stetigkeit an  $f$  gültig. (Check!). Allerdings ist  $f(I)$  kein Intervall, wenn  $f$  nicht stetig ist.
- (Übung) Ist  $I \subset \mathbb{R}$  ein Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, so gilt:

$$f \text{ invertierbar} \iff f \text{ streng monoton.}$$

(Ist  $I$  kein Intervall, so gilt diese Äquivalenz nicht.)

**Beispiel.** Sei  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ,  $\exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ . Dann ist  $\exp$  streng monoton wachsend mit  $\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$  und die Umkehrfunktion  $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ist stetig. **Zeichnung.**

Bew. Es reicht zu zeigen, daß  $\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$  gilt: Wir wissen schon

$$\exp(x)^{-1} = \exp(-x) \quad \text{und} \quad \exp(x) > 0$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ . Weiterhin gilt offenbar für alle  $k \in \mathbb{N}$

$$\exp(k) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k^n}{n!} \geq k$$

und damit also auch

$$\exp(-k) < \frac{1}{k}.$$

Also enthält (nach Zwischenwertsatz)  $\exp(\mathbb{R})$  das Intervall  $[1/k, k]$  für jedes  $k \in \mathbb{N}$ . Da  $k \in \mathbb{N}$  beliebig ist, folgt die gewünschte Behauptung.

Der Logarithmus wird uns immer wieder begegnen (wie auch die Exponentialfunktion). Die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion führt zur Gültigkeit der folgenden Gleichung

$$\ln x + \ln y = \ln(xy) \quad \text{und} \quad \ln x = -\ln \frac{1}{x}$$

für  $x, y > 0$ .

Bew.  $x = e^a$ ,  $y = e^b$ . Dann gilt

$$\ln x + \ln y = \ln e^a + \ln e^b = a + b = \ln(e^{a+b}) = \ln(xy).$$

Auch Monotonie ist stabil unter Konvergenz von Funktionen und zwar sogar unter punktweiser Konvergenz.

**PROPOSITION.** Sei  $I$  ein Intervall und  $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , seien monotone wachsende Funktionen. Gibt es ein  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  für alle  $x \in I$ , so ist  $f$  ebenfalls monoton wachsend. Entsprechendes gilt für monoton fallende Funktionen.

*Beweis.* Sei  $x < y$ . Dann gilt

$$f(x) = \lim f_n(x) \leq \lim f_n(y) = f(y).$$

□

Man könnte denken, daß Funktionen auf einem Intervall, die stetig und monoton sind, besonders einfach sind. Das ist nicht der Fall, wie man an folgendem Beispiel sieht.

**Beispiel - Teufelstreppe.** Sei  $I = [0, 1]$ .

Setze  $C_0 := I$  und konstruiere rekursiv durch Herausnehmen der offenen mittleren Drittelintervalle abgeschlossene Mengen  $C_n \subset I$  mit

$C_n \subset C_{n-1}$ . **Zeichnung.** Damit besteht also  $C_n$  aus  $2^n$  Intervallen der Länge  $1/3^n$ . Die 'Gesamtlänge' von  $C_n$  ist damit

$$L_n = \frac{1}{3^n} 2^n$$

und die 'Gesamtlänge' des Komplementes  $I \setminus C_n$  ist gegeben durch

$$L_n = 1 - \frac{1}{3^n} 2^n.$$

Sei

$$C := \bigcap_{n=1} C_n.$$

Dann ist die 'Gesamtlänge' des Komplementes  $I \setminus C$  also gerade 1 und  $C$  hat die 'Länge' 0. Nun definieren wir für  $n \in \mathbb{N}$  die Funktion

$$f_n : I \longrightarrow [0, 1]$$

auf folgende Weise: **Zeichnung**

- $f_n(0) = 0, f_n(1) = 1$ .
- Auf den herausgenommenen  $2^n - 1$  ( $= 1 + 2 + \dots + 2^{n-1}$ ) Intervallen ist die Funktion konstant mit den Werten  $1/2^n, 2/2^n, \dots, (2^n - 1)/2^n$ .
- Auf den noch verbliebenen Intervallen wird die Funktion linear interpoliert.

Dann gilt offenbar  $|f_n(x) - f_m(x)| \leq 1/2^n$  für  $m \geq n$ . Damit ist für jedes  $x \in I$  also  $(f_n(x))$  eine Cauchy-Folge und damit konvergent und für die Grenzwert  $f(x)$  gilt

$$|f(x) - f_n(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n}.$$

Damit konvergiert  $(f_n)$  also gleichmäßig gegen  $f$  und  $f$  ist stetig und monoton mit  $f(0) = 0$  und  $f(1) = 1$  und  $f$  konstant auf den einzelnen Stücken von  $I \setminus C$ . Diese Funktion kann also nicht gezeichnet werden.

**Bemerkung.**

- In gewisser Weise sind Funktionen wie obige die typischen stetigen monotonen Funktionen.
- Unsere Anschauung vom Zeichnen von Funktionen ist insofern irreführend, als wir (eigentlich) nur Funktionen zeichnen können, die - von wenigen Ausnahmepunkten abgesehen - lokal lipschitzstetig sind.
- Im nächsten Abschnitt werden wir differenzierbare Funktionen kennenlernen. Für diese Klasse 'gelten' unsere Zeichnungen.

## Differenzierbare Funktionen

Eine Funktion ist in einem Punkt differenzierbar, wenn sie in der Nähe des Punktes gut durch eine linear affine Funktion, ihre Tangente, approximiert wird. Die zugehörige lineare Funktion (gegeben durch eine  $1 \times 1$  Matrix d.h. eine Zahl) heißt die Ableitung.

Um über 'Nähe' eines Punktes sprechen zu können, brauchen wir Platz. Daher wird es sich meist um Funktionen auf offenen Intervalle handeln. 'Gute Approximation' wird bedeuten, daß der 'Fehler' klein ist. Differenzierbare Funktionen haben viele gute Eigenschaften. Im wesentlichen lieferten unsere Zeichnungen meist differenzierbare Funktionen.

### 1. Definition und grundlegende Eigenschaften von Differenzierbarkeit in einem Punkt.

**Idee.** Gegeben  $f : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $p \in (a, b)$ :

- $f$  stetig in  $p$ :  $f(q) = f(p) + \psi(q)$ , wobei der Fehler  $\psi(q)$  klein wird für  $q \rightarrow p$ , d.h.  $f$  ist gut durch eine konstante Funktion approximierbar in  $p$ .
- $f$  differenzierbar in  $p$ :  $f(q) = f(p) + b(q - p) + \varphi(q)$ , wobei der Fehler  $\varphi(q)$  sehr klein wird für  $q \rightarrow p$ , nämlich  $\varphi(q) = \psi(q)(q - p)$  mit  $\psi(q) \rightarrow 0$ ,  $q \rightarrow p$ . Damit ist  $f$  in  $p$  gut durch eine lineare Funktion - die Tangente  $T(x) = b + c(x - p)$  approximierbar.

**LEMMA.** (*Charakterisierung der Differenzierbarkeit in einer Dimension*) Sei  $I \subset \mathbb{R}$  offenes Intervall und  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Sei  $p \in I$ . Dann sind äquivalent:

- (i) Es existiert ein  $b \in \mathbb{R}$  mit

$$f(x) = f(p) + b(x - p) + \varphi(x),$$

wobei für  $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}$  gilt

$$\lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{\varphi(x)}{|x - p|} = 0.$$

- (ii) Der Grenzwert  $\lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$  existiert.

In diesem Fall gilt  $b = \lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ .

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii): Es gilt

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} = b + \frac{\varphi(x)}{x - p} \rightarrow b, \quad x \rightarrow p.$$

(ii)  $\implies$  (i): Setze  $b := \lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ . Dann erfüllt  $\varphi$  mit

$$f(x) = f(p) + b(x - p) + \varphi(x)$$

also

$$\frac{\varphi(x)}{x - p} = \frac{f(x) - f(p)}{x - p} - b \rightarrow 0, \quad x \rightarrow p.$$

Weitere Aussage: Schon gezeigt in (ii)  $\implies$  (i).  $\square$

**DEFINITION.** Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Falls die Bedingungen des Lemma in  $p \in (a, b)$  erfüllt sind, so heißt  $f$  in  $p$  differenzierbar und man nennt den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

die Ableitung von  $f$  an der Stelle  $p$  und bezeichnet ihn mit  $Df(p)$  oder  $f'(p)$ . Ist  $f$  in allen Punkten von  $(a, b)$  differenzierbar, so heißt  $f$  differenzierbar.

**Bemerkung.** Betrachtet man den Quotienten

$$\frac{f(q) - f(p)}{q - p}$$

für  $q \rightarrow p$ , so fällt auf, daß der Nenner gegen Null konvergiert. Damit der Quotient endlich bleibt und gegen einen Grenzwert strebt, muss also der Zähler auch gegen Null streben und zwar im wesentlichen im 'gleichen Masse'. Damit folgt aus Differenzierbarkeit also Stetigkeit.

**PROPOSITION.** Sei  $I \subset \mathbb{R}$  offenes Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $p \in I$ . Dann ist  $f$  stetig in  $p$ .

*Beweis.* Es gilt

$$f(q) = f(p) + b(q - p) + \varphi(q)$$

mit  $\varphi(q) = 0$  für  $q = p$  und  $\varphi(q) = \frac{\varphi(q)}{q - p}(q - p)$  für  $q \neq p$ . Damit gilt also  $\varphi(q) \rightarrow 0$  für  $q \rightarrow p$  und es folgt (durch Betrachten der drei Terme in der Gleichung)  $f(q) \rightarrow f(p)$  für  $q \rightarrow p$  d.h. Stetigkeit von  $f$  in  $p$ .  $\square$

Wir kommentieren diese Definition mit einer Reihe von wichtigen Bemerkungen:

← Ende der 23. Vorlesung

**Geometrische Deutung.**

- Der Differenzenquotient  $\frac{f(x) - f(p)}{x - p}$  ist gerade die Steigung der Sekanten durch  $(x, f(x))$  und  $(p, f(p))$ . **Zeichnung.**

- Der Differentialquotient  $f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$  ist die Steigung der Tangenten an den Graphen von  $f$  im Punkt  $(p, f(p))$ .

**Zeichnung.**

- Die Tangente durch  $(p, f(p))$  ist gegeben durch die Gerade

$$T(x) = f(p) + f'(p)(x - p)$$

Das ist gerade die lineare Approximation.

- Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{\varphi(x)}{|x - p|} = 0$$

genau dann, wenn gilt

$$\varphi(x) = \psi(x)(x - p)$$

mit  $\psi(x) \rightarrow 0$  für  $x \rightarrow p$ , nämlich

$$\psi(x) := \begin{cases} \frac{\varphi(x)}{x - p} & : x \neq p \\ 0 & : x = p. \end{cases}$$

- Es ist

$$\lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{\varphi(x)}{|x - p|} = 0$$

eine präzise Fassung, der Aussage, daß der Fehler bei der Approximation durch die Tangente sehr klein ist.

**Hinweis: Ausrechnen des Grenzwertes.** Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}.$$

Wir kommen nun zu einigen Rechenregeln im Umgang mit Ableitungen.

**PROPOSITION.** (Rechenregeln) Sei  $-\infty < a < b < \infty$ ,  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $p \in (a, b)$ . Dann gilt:

- $f + \alpha g$  ist differenzierbar in  $p$  mit  $(f + \alpha g)'(p) = f'(p) + \alpha g'(p)$ .
- (Produktregel) Das Produkt  $fg$  ist differenzierbar in  $p$  mit  $(fg)'(p) = f'(p)g(p) + f(p)g'(p)$ .
- (Quotientenregel)  $g(p) \neq 0$ , so ist auch  $f/g$  differenzierbar in  $p$  mit  $\left(\frac{f}{g}\right)'(p) = \frac{f'(p)g(p) - f(p)g'(p)}{g^2(p)}$ . Insbesondere gilt  $(1/g)'(p) = -g'(p)/g^2(p)$ .

*Beweis.* (a) Einfach.

$$(b) \frac{f(x)g(x) - f(p)g(p)}{x - p} = \frac{f(x) - f(p)}{x - p}g(x) + f(p)\frac{g(x) - g(p)}{x - p}. \text{ Nun } x \rightarrow p \dots$$

(c) Es reicht das 'Insbesondere' zu zeigen. (Dann folgt erste Aussage durch Anwenden der Produktregel.) Es gilt

$$\frac{1/g(x) - 1/g(p)}{x - p} = -\frac{g(p) - g(x)}{x - p} \frac{1}{g(x)g(p)}.$$

Nun  $x \rightarrow p \dots$  □

**PROPOSITION.** (*Kettenregel*) Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  und  $g : (c, d) \rightarrow (a, b)$  gegeben. Ist  $g$  differenzierbar in  $p$  und  $f$  differenzierbar in  $g(p)$ , so ist  $f \circ g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $p$ , und es gilt  $(f \circ g)'(p) = f'(g(p))g'(p)$ .

*Beweis.* Die Idee ist klar:

$$\frac{f \circ g(x) - f \circ g(p)}{x - p} = \frac{f \circ g(x) - f \circ g(p)}{g(x) - g(p)} \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \rightarrow f'(g(p))g'(p).$$

Da  $g(x) - g(p) = 0$  möglich ist, muss man etwas genauer sein. Man ersetzt dazu für  $g(x) = g(p)$  den Quotienten  $(f(g(x)) - f(g(p)))/(g(x) - g(p))$  durch  $f'(g(p))$ . Genauer:

Setze  $q := g(p)$  und definiere (wobei  $\eta = g(x)$  sein wird)

$$f^*(\eta) = \begin{cases} \frac{f(\eta) - f(q)}{\eta - q}, & : \eta \neq q \\ f'(q) & : \eta = q \end{cases}$$

Dann gilt

- $\lim_{\eta \rightarrow q} f^*(\eta) = f'(q) = f^*(q)$ .
- $f(\eta) - f(q) = f^*(\eta)(\eta - q)$  für **alle**  $\eta$ .

Damit können wir nun mit  $\eta = g(x)$  schließen

$$\frac{f \circ g(x) - f \circ g(p)}{x - p} = \frac{f(\eta) - f(q)}{x - p} = f^*(\eta) \frac{g(x) - g(p)}{x - p}.$$

Nun folgt die Behauptung leicht. □

### Beispiele.

- Die konstante Funktion hat Ableitung 0.  
Bew. klar.
- (Potenz) Die Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^k$  hat die Ableitung  $f'(x) = kx^{k-1}$ .  
Bew.  $\frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \frac{x^k - p^k}{x - p} = \sum_{j=0}^{k-1} x^j p^{k-1-j} \rightarrow kp^{k-1}$ .
- (Polynom)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$  hat Ableitung  $\sum_{j=1}^n a_j j x^{j-1}$ .  
Bew. Linearkombination von Potenzen.
- (Inverse Potenz)  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 1/x^k$  hat Ableitung  $f'(x) = -k \frac{1}{x^{k+1}}$ .  
Bew. Quotientenregel liefert  $f'(x) = -\frac{kx^{k-1}}{x^{2k}}$ .
- (Exponentialfunktion): Es gilt für jedes  $z_0 \in \mathbb{C}$

$$\lim_{z \rightarrow z_0, z \neq z_0} \frac{\exp(z) - \exp(z_0)}{z - z_0} = \exp(z_0).$$

Insbesondere hat die Funktion  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto \exp x$  die Ableitung  $\exp(x)$ .

Bew. Aufgrund der Funktionalgleichung gilt

$$\frac{\exp(z) - \exp(z_0)}{z - z_0} = \exp(z_0) \frac{\exp(z - z_0) - 1}{z - z_0}.$$

Daher reicht es  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(h) - 1}{h} = 1$  zu zeigen. Dazu:

$$\begin{aligned} \frac{\exp(h) - 1}{h} &= \frac{1}{h} \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{k!} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^k}{k!} \\ &= 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^{k-1}}{k!} \\ &= 1 + h \sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^{k-2}}{k!}. \end{aligned}$$

Für  $|h| < 1$  gilt  $|\sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^{k-2}}{k!}| \leq \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} \leq \exp(1)$ . Damit folgt

$$\frac{\exp(h) - 1}{h} \rightarrow 1, \quad h \rightarrow 0.$$

- Für die Funktionen  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\sin(x) = \Im \exp(ix)$  und  $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\cos(x) = \Re(\exp(ix))$  sind differenzierbar mit  $\sin' = \cos$  und  $\cos' = -\sin$ . Insbesondere gilt  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ .

**Bemerkung (Beschreibung von sin und cos am Einheitskreis):** Eine kleine Rechnung zeigt, daß für  $u = \exp(ix)$  gilt  $|u| = 1$ . Damit handelt es sich also bei  $\sin$  und  $\cos$  in der Tat um die Verhältnisse der Seiten eines rechtwinklichen Dreiecks am Einheitskreis. **Zeichnung.**

Bew. Wir betrachten nur  $\sin$ . (Der andere Fall kann analog behandelt werden.)

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x) - \sin(p)}{x - p} &= \Im \frac{\exp(ix) - \exp(ip)}{x - p} \\ &= \Im i \frac{\exp(ix) - \exp(ip)}{ix - ip} \\ &= \Re \frac{\exp(ix) - \exp(ip)}{ix - ip} \\ &\rightarrow \Re \exp(ip) = \cos(p). \end{aligned}$$

Zum 'Insbesondere':

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - 0}{x - 0} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \rightarrow \sin'(0) = \cos(0) = 1.$$



**Potenzreihe.** Sei  $(a_n)$  Folge in  $\mathbb{C}$  mit  $\rho := \limsup \sqrt[n]{|a_n|} < \infty$  und  $R := \frac{1}{\rho}$  und

$$f : U_R(0) \longrightarrow \mathbb{C}, f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

Dann gilt

$$\frac{f(w) - f(z)}{w - z} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}, \quad w \rightarrow z.$$

Sind die  $a_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , alle reell, so ist die Einschränkung von  $f$  auf  $(-R, R)$  differenzierbar mit  $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ .

**Beachte.** Es handelt sich bei der Ableitung um die durch formale Differentiation der Summanden gewonnene Funktion. Das Problem besteht darin, die Vertauschung von Summenbildung und Ableitung zu begründen. Wie üblich verlangt diese Vertauschung von Grenzwerten Arbeit!

Bew. Man sieht leicht  $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ . Insbesondere ist

$$g : U_R(0) \longrightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

wohldefiniert durch eine absolut konvergente Reihe. Wir betrachten nun

$$\frac{f(z) - f(w)}{z - w} = \frac{1}{z - w} \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z^n - w^n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left( \sum_{k=0}^{n-1} z^k w^{n-k-1} \right).$$

Damit folgt für jedes  $N \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} & \frac{f(z) - f(w)}{z - w} - g(w) \\ &= \left[ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sum_{k=0}^{n-1} z^k w^{n-k-1} \right] - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n w^{n-1} \\ &= \left[ \sum_{n=1}^N a_n \sum_{k=0}^{n-1} (z^k w^{n-k-1} - w^{n-1}) \right] + \left[ \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \sum_{k=0}^{n-1} z^k w^{n-k-1} \right] - \sum_{n=N+1}^{\infty} n a_n w^{n-1}. \end{aligned}$$

Sei  $S > 0$  mit  $|w| < S < R$  beliebig. Ist  $z$  so nahe an  $w$ , daß auch  $|z| < S$  gilt, so kann man jeden einzelnen der beiden letzten Summen im Betrag abschätzen durch

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} n |a_n| S^{n-1}.$$

Dieser Term geht für  $N \rightarrow \infty$  gegen 0. Außerdem geht bei festem  $N$  aber der erste Term für  $z \rightarrow w$  gegen 0. Damit folgt die gewünschte

Konvergenz

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} - g(w) \right| \rightarrow 0$$

auf folgende Weise: Wähle zu beliebigem  $\varepsilon > 0$  zunächst  $N \in \mathbb{N}$  so groß, daß die obigen beiden letzten Terme kleiner als  $\varepsilon/3$  sind für  $|z| < S$ . Wähle anschließend  $\delta > 0$  so klein, daß für  $|z - w| < \delta$  sowohl  $|z| < S$  also auch

$$\left| \sum_{n=1}^N a_n \left( \sum_{k=0}^{n-1} z^k w^{n-k-1} \right) - n w^{n-1} \right| < \varepsilon/3$$

gilt. (Das ist möglich, da es sich um eine endliche Summe stetiger Funktionen handelt).

**PROPOSITION.** (*Ableitung der Umkehrfunktion*) Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  streng monoton, stetig und differenzierbar in  $p$  mit  $f'(p) \neq 0$ . Dann ist die Umkehrfunktion  $g := f^{-1} : f(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $q = f(p)$ , und es gilt

$$g'(q) = \frac{1}{f'(p)} = \frac{1}{f'(g(q))}.$$

*Beweis.* Sei  $y = f(x)$ ,  $q = f(p)$ , also  $x = g(y)$ ,  $p = g(q)$ . Dann folgt  $x \rightarrow p$  aus  $y \rightarrow q$ . Damit erhält man

$$\frac{g(y) - g(q)}{y - q} = \frac{x - p}{f(x) - f(p)} \rightarrow \frac{1}{f'(p)}$$

für  $x \rightarrow p$ . □

**Zeichnung.** Spiegeln

**Bemerkung.** Die Voraussetzung  $f'(p) \neq 0$  ist nötig, andernfalls hat man eine waagerechte Tangente. (**Beispiel.** Quadrat und Wurzel bei 0).

**Beispiele** (Umkehrfunktion)

- **$k$ -te Wurzel als Umkehrfunktion:** Die Funktion  $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(y) = \sqrt[k]{y} = y^{1/k}$  ist differenzierbar mit Ableitung  $g'(y) = \frac{1}{k} y^{(1/k)-1}$ .

Bew. Es ist  $g$  Umkehrfunktion von  $f(x) = x^k$ . Damit gilt mit  $y = f(x)$ ,  $x = g(y) = y^{1/k}$  also

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{kx^{k-1}} = \frac{1}{k} \frac{1}{y^{(k-1)/k}}.$$

- **Der Logarithmus als Umkehrfunktion:** Die Funktion  $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(y) = \ln y$  ist differenzierbar mit  $\ln'(y) = 1/y$ .

Bew.  $\ln$  ist Umkehrfunktion von  $\exp$ . Damit gilt mit  $y = \exp(x)$ ,  $x = \ln y$  also

$$\ln'(y) = \frac{1}{\exp'(x)} = \frac{1}{\exp(x)} = \frac{1}{y}.$$

Nachdem wir nun den Logarithmus kennen, können wir noch die allgemeine Potenz einführen und auf Differenzierbarkeit untersuchen.

**Beispiel.** (Allgemeine Potenz) Für  $\alpha \in \mathbb{R}$  und  $x > 0$  definiert man

$$x^\alpha := e^{\alpha \ln x}$$

und nennt dies die  $\alpha$ -te Potenz von  $x$ . Dann folgt sofort

$$\ln x^\alpha = \alpha \ln x.$$

Es ist

$$P_\alpha : (0, \infty) \longrightarrow (0, \infty), P_\alpha(x) = x^\alpha$$

differenzierbar mit

$$P'_\alpha(x) = \alpha P_{\alpha-1}(x) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

**Zeichnung.** (für  $\alpha < 0$ ,  $0 < \alpha < 1$ ,  $\alpha = 1$ ,  $1 < \alpha$ ).

Bew. Nach Kettenregel gilt

$$P'_\alpha(x) = e^{\alpha \ln x} \alpha \frac{1}{x} = e^{\alpha \ln x} \alpha \frac{1}{e^{\ln x}} = e^{(\alpha-1) \ln x} \alpha.$$

Für  $a > 0$  ist

$$\exp_a : \mathbb{R} \longrightarrow (0, \infty), x \mapsto a^x$$

differenzierbar mit

$$\exp'_a(x) = \ln a \exp_a(x).$$

Bew. Es gilt  $\exp_a(x) = e^{x \ln a}$ . Damit folgt die Behauptung sofort aus der Kettenregel.

Für die allgemeine Potenz gilt:

$$x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta} \quad \text{sowie} \quad x^\alpha y^\alpha = (xy)^\alpha$$

Bew. Erste Aussage folgt direkt aus der Definition:

$$x^\alpha x^\beta = e^{\alpha \ln x} e^{\beta \ln x} = e^{(\alpha+\beta) \ln x} = x^{\alpha+\beta}.$$

Zweite Aussage folgt mit

$$x^\alpha x^\beta = e^{\alpha \ln x} e^{\alpha \ln y} = e^{\alpha(\ln x + \ln y)} = e^{\alpha \ln(xy)}.$$

(Nutzt Rechenregel  $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ ): Bew.  $x = e^a$ ,  $y = e^b$ . Dann gilt

$$\ln x + \ln y = \ln e^a + \ln e^b = a + b = \ln(e^{a+b}) = \ln(xy).$$

**Beachte.** Für  $k \in \mathbb{Z}$  haben wir nun  $x^k$  und  $x^{1/k}$  auf zwei Arten definiert. Man kann sich aber leicht überlegen, daß beide Arten übereinstimmen:

Sei  $k \in \mathbb{N}$ . Dann gilt  $P_k(x) = e^{k \ln x} = e^{\ln x} \dots e^{\ln x} = x^k$ . Ebenso gilt für  $y := e^{\frac{1}{k} \ln x}$  offenbar  $y > 0$  sowie  $y^k = \dots = e^{\ln x} = x$ . Damit gilt also  $y = x^{1/k}$ .

### Beispiel - nichtdifferenzierbare Funktion

- Die Funktion  $\text{abs} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto |x|$  ist in  $x \neq 0$  differenzierbar und in  $x = 0$  nicht differenzierbar. (Dort existieren die links und rechtsseitigen Ableitungen und sind verschieden).

**Zeichnung.**

Bew. Für  $p > 0$  gilt  $\frac{\text{abs}(x) - \text{abs}(p)}{x-p} = \frac{x-p}{x-p} = 1 \rightarrow 1, x \rightarrow p$ .

Für  $p < 0$  gilt  $\frac{\text{abs}(x) - \text{abs}(p)}{x-p} = \frac{-x - (-p)}{x-p} = -1 \rightarrow -1, x \rightarrow p$ .

Für  $p = 0$  gilt  $\frac{\text{abs}(x) - \text{abs}(p)}{x-p} = |x|/x = \pm 1$  für  $x > 0$  bzw.  $x < 0$ . Damit existiert die Ableitung nicht.

- Die Funktion  $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $u(x) = 0$  falls  $x$  rational ist und  $u(x) = x^2$  falls  $x$  irrational ist, ist in allen  $x \neq 0$  unstetig also nicht differenzierbar und in  $x = 0$  differenzierbar mit Ableitung Null. (Übung).

**DEFINITION.** Ist  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar und  $f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, so heißt  $f$  stetig differenzierbar.

**Bemerkung.** Unter Umständen ist es praktisch auch die Ableitungen in Randpunkten bilden zu können. Dazu definiert man (falls existiert) für  $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  bzw.  $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

und

$$f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}.$$

## 2. Differenzierbare Funktionen auf Intervallen

In diesem Abschnitt wollen wir differenzierbare Funktionen auf Intervallen detaillierter behandeln. Wir werden sehen, daß die Ableitung wichtige Informationen über Monotonie und Extremwerte von Funktionen kodiert. Eine wesentliche Rolle in den Betrachtungen spielt der Mittelwertsatz. Konkret betrachten wir Funktionen

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

und nehmen meist an:

- $f$  stetig auf  $[a, b]$
- $f$  differenzierbar in  $(a, b)$

**DEFINITION (Lokale Extrema).** Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben.

- Es hat  $f$  in  $\xi \in I$  ein lokales  $\begin{smallmatrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{smallmatrix}$  wenn ein  $\delta > 0$  existiert mit  $\begin{smallmatrix} f(x) \leq f(\xi) \\ f(x) \geq f(\xi) \end{smallmatrix}$ , für alle  $x \in I$  mit  $|x - \xi| < \delta$ .
- Gilt  $\begin{smallmatrix} f(x) \leq f(\xi) \\ f(x) \geq f(\xi) \end{smallmatrix}$  für alle  $x \in I$ , so hat  $f$  in  $\xi$  ein globales  $\begin{smallmatrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{smallmatrix}$ .

Sind die entsprechenden Ungleichungen strikt für  $x \neq \xi$ , so spricht man von einem strikten  $\begin{smallmatrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{smallmatrix}$ . Maxima und Minima werden auch als Extrema bezeichnet.

**THEOREM** (Notwendige Bedingung für lokale Extrema). Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar. Hat  $f$  in  $\xi \in (a, b)$  ein lokales Extremum, so gilt  $f'(\xi) = 0$ . **Zeichnung.**

*Beweis.* Wir betrachten nur den Fall, daß  $f$  in  $\xi$  ein lokales Maximum besitzt (für Minimum ist der Beweis analog).

Für  $x > \xi$  und  $x$  nahe an  $\xi$  gilt:  $\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \leq 0$ . Damit folgt

$$f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \leq 0$$

Für  $x < \xi$  und  $x$  nahe an  $\xi$  gilt:  $\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \geq 0$ . Damit folgt

$$f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \geq 0$$

Damit ergibt sich insgesamt  $f'(\xi) = 0$ . □

**Bemerkung zu Chancen und Schwächen des vorigen Satzes.**

- Es handelt sich um eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung, wie das Beispiel  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3$  in  $\xi = 0$  zeigt.
- Eine differenzierbare Funktion muss auf  $(a, b)$  kein Extremum haben (siehe etwa  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x$ ).
- Eine stetige Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  muss Minimum und Maximum annehmen (s.o.). Allerdings könnten diese Extrema am Rand liegen.
- Ist  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und differenzierbar auf  $(a, b)$  und liegen die Extrema nicht am Rand, so werden sie (sowie möglicherweise weitere Punkte) durch Lösen der Gleichung  $f'(\xi) = 0$  gefunden.

**THEOREM** (Rolle). Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und differenzierbar auf  $(a, b)$  mit  $f(a) = f(b)$ . Dann existiert mindestens ein  $\xi \in (a, b)$  mit  $f'(\xi) = 0$ .

**Zeichnung.**

*Beweis.* Idee: In Extrema verschwindet die Ableitung.

$f$  ist stetig auf dem kompakten Intervall  $[a, b]$ . Daher nimmt  $f$  ein Minimum und ein Maximum an.

Fall 1: Es ist  $f$  konstant = 0. Dann kann man jedes  $\xi \in (a, b)$  wählen.

*Fall 2: Es ist  $f$  nicht konstant.* Sei  $c := f(a) = f(b)$ . Dann gilt  $\min f \neq c$  oder  $\max f \neq c$ . Sei o.E.  $\max f \neq c$  und sei  $\xi \in (a, b)$  ein Punkt in dem  $f$  das Maximum annimmt. Dann gilt aber  $f'(\xi) = 0$ .  $\square$

**THEOREM (Mittelwertsatz).** *Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und differenzierbar in  $(a, b)$ . Dann existiert ein  $\xi \in (a, b)$  mit*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**Zeichnung.**

*Beweis.* Idee: Ziehe von  $f$  die Gerade durch  $(a, f(a))$  und  $(b, f(b))$  ab  
**Zeichnung:** Betrachte

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = f(x) - \underbrace{\left( f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right)}_{\text{Gerade durch } (a, f(a)), (b, f(b))}.$$

Dann ist  $F$  stetig und differenzierbar auf  $(a, b)$  und es gilt  $F(a) = 0 = F(b)$ . Nach dem Satz von Rolle existiert daher ein  $\xi \in (a, b)$  mit  $0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .  $\square$

**THEOREM (Verallgemeinerter Mittelwertsatz).** *Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und auf  $(a, b)$  differenzierbar. Dann existiert ein  $\xi \in (a, b)$  mit*

$$(f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi).$$

**Beachte.** Das kann man (wenn entsprechende Terme nicht verschwinden) auch so schreiben:

$$\frac{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{\frac{g(a) - g(b)}{(b - a)}} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

In diesem Sinne handelt es sich um eine 'simultane' Mittelwertbildung.

*Beweis.* Betrachte

$$F(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a))$$

Damit ist  $F$  stetig, differenzierbar auf  $(a, b)$  und  $F(a) = 0$ ,  $F(b) = 0$ . Der Satz von Rolle liefert  $\xi \in (a, b)$  mit

$$0 = F'(\xi) = (f(b) - f(a))g'(\xi) - (g(b) - g(a))f'(\xi)$$

und damit die Behauptung.  $\square$

**Bemerkungen.** Es sind Mittelwertsatz, Satz von Rolle und verallgemeinerter Mittelwertsatz äquivalent in folgendem Sinne:

- Aus dem Satz von Rolle folgt die Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes (siehe Beweis).
- Aus der Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes folgt der Mittelwertsatz mit  $f = f$  und  $g = \text{id}$ .
- Aus dem Mittelwertsatz folgt der Satz von Rolle (Klar.)

**THEOREM** (Charakterisierung von Monotonie mittels Ableitungen).  
 Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und differenzierbar auf  $(a, b)$ . Dann gilt:

- (a)  $f$  konstant  $\Leftrightarrow f' \equiv 0$  auf  $(a, b)$   
 (b)  $f$  monoton  $\begin{matrix} \text{wachsend} \\ \text{fallend} \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} f' \geq 0 \\ f' \leq 0 \end{matrix}$  auf  $(a, b)$   
 (c)  $\begin{matrix} f' > 0 \\ f' < 0 \end{matrix} \Rightarrow f$  ist strikt  $\begin{matrix} \text{wachsend} \\ \text{fallend} \end{matrix}$

*Beweis.* (a) Das folgt sofort aus (b). (Übung: Direkter Beweis.)

(b) Wir zeigen zunächst  $\Rightarrow$ : Wir behandeln nur monoton wachsendes  $f$ . (Der andere Fall kann analog behandelt werden). Für  $\xi \in (a, b)$  und  $x \neq \xi$  gilt aufgrund der Monotonie dann

$$\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \geq 0.$$

Damit folgt

$$f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \geq 0$$

Wir zeigen nun  $\Leftarrow$ : Seien  $x, y \in [a, b]$  mit  $x < y$ . Aus dem Mittelwertsatz folgt

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) \geq 0$$

und damit

$$f(y) - f(x) \geq 0.$$

(c) Wir betrachten nur  $f' > 0$ . (Der andere Fall kann analog behandelt werden). Sei  $x < y$ . Nach dem Mittelwertsatz gilt

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) > 0$$

also

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) > 0.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**Bemerkung.** Die Umkehrung in c) gilt nicht. Betrachte dazu  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3$  in 0.

←  
Ende der 25. Vorlesung.

**FOLGERUNG** (Ableitung bestimmt Funktion bis auf eine Konstante).  
 Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und auf  $(a, b)$  differenzierbar mit  $f' = g'$ .  
 Dann ist  $f - g$  konstant. Gibt es in diesem Fall ein  $c$  mit  $f(c) = g(c)$ ,  
 so folgt  $f = g$ .

*Beweis.* Setze  $h := f - g$ . Dann gilt  $h' = f' - g' = 0$  auf  $(a, b)$  und nach obigem Satz ist  $h = \text{const}$ .  $\square$

Nachdem wir nun die erste Ableitung untersucht haben, wollen wir sehen, was man aus der zweiten Ableitung lernen kann.

DEFINITION. Ist  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar und  $f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  ebenfalls differenzierbar, so heißt  $f$  zweimal differenzierbar und man nennt  $f'' := (f')'$  die zweite Ableitung von  $f$ .

**Bemerkung.** Offenbar ist  $f'$  stetig, wenn  $f$  zweimal differenzierbar ist.

THEOREM (Hinreichende Bedingung für strikte lokale Extrema). Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  zweimal differenzierbar. Gilt für ein  $\xi \in (a, b)$

$$f'(\xi) = 0 \text{ und } \begin{matrix} f''(\xi) < 0 \\ f''(\xi) > 0, \end{matrix}$$

so hat  $f$  in  $\xi$  ein striktes lokales <sup>Maximum</sup>/<sub>Minimum</sub>. **Zeichnung.** ( $f, f', f''$  in beiden Fällen)

*Beweis.* Wir betrachten  $f'(\xi) = 0, f''(\xi) < 0$  (anderer Fall analog). Wegen

$$0 > f''(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f'(x) - f'(\xi)}{x - \xi} = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f'(x)}{x - \xi}$$

gilt für alle  $x$  nahe an  $\xi$  also

$$\frac{f'(x)}{x - \xi} < 0.$$

Damit gibt es ein  $\delta > 0$  mit

- $f'(x) < 0$  für  $x \in (\xi, \xi + \delta)$
- $f'(x) > 0$  für  $x \in (\xi - \delta, \xi)$

Also ist  $f$  strikt <sup>fallend</sup>/<sub>wachsend</sub> in  <sup>$(\xi, \xi + \delta)$</sup> / <sub>$(\xi - \delta, \xi)$</sub> .

Daher hat  $f$  striktes Maximum in  $\xi$ . □

**Bemerkung.** Diese Bedingung ist nicht notwendig. (Beispiel:  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4$ . Dann hat  $f$  ein striktes Minimum in  $\xi = 0$ . Aber  $f''(\xi) = 12\xi^2 = 0$ .)

Die Betrachtungen zum Verhalten von Extremwerten mit  $f''(\xi) < 0$  bzw.  $f''(\xi) > 0$  lassen sich verallgemeinern. Dazu brauchen wir noch einen Begriff.

DEFINITION (konkav und konvex).  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt <sup>konkav</sup>/<sub>konvex</sub>, wenn für alle  $c, d \in [a, b]$  mit  $c < d$  und  $\lambda \in (0, 1)$  gilt

$$f(c + \lambda(d - c)) \underset{\geq}{\underset{\leq}} f(c) + \lambda(f(d) - f(c)).$$

**Beachte.** Sei  $\lambda \in [0, 1]$  und  $\mu = 1 - \lambda$ . Dann gilt

$$c + \lambda(d - c) = \lambda d + (1 - \lambda)c = (1 - \mu)d + \mu c = d + \mu(c - d)$$

und mit der Geraden

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = f(c) + \frac{f(d) - f(c)}{d - c}(x - c)$$

durch  $(c, f(c))$  und  $(d, f(d))$  gilt



$$g(c + \lambda(d - c)) = f(c) + \lambda(f(d) - f(c)) = \lambda f(d) + (1 - \lambda)f(c).$$

**Zeichnung.** Konvex: Sekantenabschnitt verläuft oberhalb der Funktion

Konkav: Sekantenabschnitt verläuft unterhalb der Funktion

**Bemerkung.**  $f$  konvex  $\Leftrightarrow -f$  konkav

PROPOSITION. Sei  $I$  ein offenes Intervall in  $\mathbb{R}$  und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Ist  $f$  konvex oder konkav, so ist  $f$  stetig.

*Beweis.* Wir betrachten nur konvexes  $f$ . (Der andere Fall kann analog behandelt werden.) Sei  $\xi \in I$  beliebig. Wähle  $x < \xi < y$  aus  $I$  beliebig. Sei  $g_1$  die Sekante durch  $(x, f(x))$  und  $(\xi, f(\xi))$  und  $g_2$  die Sekante durch  $(\xi, f(\xi))$  und  $(y, f(y))$ . Dann verläuft nach Konvexität also für  $s > \xi$

- Zeichnung.**
- $g_2$  oberhalb des Graphen von  $f$  auf  $[\xi, y]$
  - $g_1$  unterhalb des Graphen von  $f$  auf  $[\xi, y]$ .

Damit folgt leicht  $\lim_{s \rightarrow \xi^+} f(s) = f(\xi)$ . Der Grenzwert von links kann analog untersucht werden.  $\square$

Wir kommen nun zur schon angekündigten Verallgemeinerung der Betrachtungen um Minima/Maxima zweimal differenzierbarer Funktionen.

THEOREM (Charakterisierung konkaver und konvexer Funktionen). Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann gilt:

- (a) Ist  $f$  differenzierbar, so ist  $f$   $\begin{smallmatrix} \text{konkav} \\ \text{konvex} \end{smallmatrix}$  genau dann, wenn  $f'$   $\begin{smallmatrix} \text{fallend} \\ \text{wachsend} \end{smallmatrix}$  ist.
- (b) Ist  $f$  zweimal differenzierbar, so ist  $f$   $\begin{smallmatrix} \text{konkav} \\ \text{konvex} \end{smallmatrix}$  genau dann, wenn gilt  $f'' \begin{smallmatrix} \leq 0 \\ \geq 0 \end{smallmatrix}$ .

*Beweis.* Offenbar folgt (b) aus (a) und der schon gegebenen Charakterisierung von Monotonie. Es bleibt also (a) zu zeigen. Wir betrachten nur konvexe  $f$  bzw. monoton wachsende  $f'$ .

Sei  $f'$  monoton wachsend: Sei  $x < \xi < y$  in  $(a, b)$ . Sei  $g_1$  die Gerade durch  $(x, f(x))$  und  $(\xi, f(\xi))$  und  $g_2$  die Gerade durch  $(\xi, f(\xi))$  und  $(y, f(y))$ . **Zeichnung.** Nach dem Mittelwertsatz und der Monotonie von  $f'$  ist die Steigung von  $g_1$  kleiner gleich der Steigung von  $g_2$ . Damit folgt, daß  $(\xi, f(\xi))$  unterhalb der Geraden durch  $(x, f(x))$  und  $(y, f(y))$  liegt.

Sei  $f$  konvex. **Zeichnung.** Sei  $x < y$ . Sei  $c$  die Steigung der Geraden durch  $(x, f(x))$  und  $(y, f(y))$ . Sei  $\xi \in (x, y)$ . Dann ist die Steigung der Geraden durch  $(\xi, f(\xi))$  und  $(x, f(x))$  kleiner oder gleich  $c$  aufgrund der

Konvexität. Da  $\xi \in (x, y)$  beliebig war, folgt, daß  $f'(x) \leq c$ . Ähnlich sieht man aber  $c \leq f'(y)$ .  $\square$

### Beispiele

- Die Funktion  $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto \ln(x)$  ist konkav.  
Bew.  $\ln'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ .
- Die Exponentialfunktion  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto \exp x$  ist konvex.  
Bew.  $\exp''(x) = \exp x > 0$ .

**Bemerkung.** Ist  $f$  konvex und streng monoton wachsend mit der Umkehrfunktion  $g$ , so ist  $g$  konkav und umgekehrt. Ist  $f$  nicht monoton wachsend so gilt die Aussage im allgemeinen nicht (vgl. etwa die Funktion  $f(x) = 1/x$ .)

### 3. Taylorscher Satz und L'Hospital'sche Regel

In diesem Abschnitt diskutieren wir Taylorschen Satz und L'Hospital'sche Regel. Dabei geht es um

- Approximation von Funktionen durch Polynome (Taylorscher Satz)
- Verhalten von Termen der Form  $0/0$  bzw  $\infty/\infty$  bzw  $0\infty$  (L'Hospital'sche Regel).

Wir werden beides als Konsequenzen aus dem verallgemeinerten Mittelwertsatz erhalten.

Wir beginnen mit dem Taylorschen Satz.

**DEFINITION** ( $k$ -te Ableitung). Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein offenes Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion. Man definiert induktiv die  $k$ -te Ableitung  $f^{(k)}$  durch

$$f^{(0)} := f, \quad f^{(k+1)} := (f^{(k)})'$$

(falls  $f^{(k)}$  auf  $I$  differenzierbar ist). Existiert  $f^{(k)}$  für jedes  $k \in \mathbb{N}$ , so heißt  $f$  beliebig oft differenzierbar oder auch unendlich oft differenzierbar.

#### Idee - Taylorscher theorem

- $f$  stetig in  $p$ :

$$f(x) = f(p) + r(x)$$

mit  $r(x) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow p$ .

- $f$  differenzierbar in  $p$ :

$$f(x) = f(p) + f'(p) \cdot (x - p) + r(x)(x - p)$$

mit  $r(x) \rightarrow 0$  für  $x \rightarrow p$  (nämlich  $r(x) = \frac{\varphi(x)}{|x-p|} \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow p$ )

- $f$   $k$ -mal differenzierbar in  $p$ :

$$f(x) = \sum_{j=0}^k \frac{f^{(j)}(p)}{j!} (x-p)^j + r(x)(x-p)^k$$

mit  $r(x) \rightarrow 0, x \rightarrow p$ .

**DEFINITION** (Das  $n$ -te Taylorpolynom). Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbar. Dann definiert man zu  $p \in (a, b)$  das  $n$ -te Taylorpolynom von  $f$  im Punkt  $p$  durch

$$P_{n,p}(x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(p)}{k!} (x-p)^k.$$

**PROPOSITION.** Sei  $P$  ein Polynom vom Grad  $n$  (oder kleiner) mit

$$P(c) = P'(c) = \dots = P^{(n)}(c) = 0$$

für ein  $c$ . Dann gilt  $P \equiv 0$ .

*Beweis.* Das folgt durch Induktion. (Beachte.  $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ . Dann gilt  $P^{(n)} = a_n n!$  ....)  $\square$

**LEMMA** (Charakterisierung Taylorpolynom). Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbar und  $p \in (a, b)$ . Dann ist  $P_{n,p}$  das eindeutige Polynom vom Grad höchstens  $n$  mit

$$P_{n,p}^{(k)}(p) = f^{(k)}(p), \quad k = 0, \dots, n.$$

('P und  $f$  stimmen bis zur  $n$ -ten Ableitung in  $p$  überein.')

*Beweis. Eindeutigkeit.* Das folgt aus vorangehender Proposition.

*Gewünschte Eigenschaften:* Das folgt durch eine direkte Rechnung.

Diese Rechnung nutzt, daß die  $l$ -te Ableitung von  $(x-p)^k$  an der Stelle  $p$  gegeben ist durch

$$\left( (x-p)^k \right)^{(l)} = \begin{cases} k! & l = k \\ 0 & l > k \\ 0 & l < k \end{cases} \quad (x=p)$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

Die Frage ist nun, wie sich  $f$  von  $P_{n,p}$  unterscheidet. Eine erste Antwort gibt der folgende Satz.

**THEOREM** (Taylorsche Formel mit Lagrange Restglied). Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$   $(n+1)$ -mal differenzierbar und  $p \in (a, b)$ . Dann existiert zu jedem  $x \in (a, b)$  ein  $t = t(x)$  zwischen  $x$  und  $p$  mit

$$f(x) = P_{n,p}(x) + R_{n+1,p}(t)$$

mit dem Lagrange Restglied

$$R_{n+1,p}(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x-p)^{n+1}$$

(und natürlich  $P_{n,p}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(p)}{k!} (x-p)^k$ .)

*Beweis.* Beachte  $x, p$  gegeben! Wir entwickeln um  $\xi$ . Sei dazu

$$h(\xi) := (x - \xi)^{n+1}$$

$$g(\xi) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} (x - \xi)^k.$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \cdot) & g(x) = f(x) \quad (k=0) \\ \cdot) & g(p) = P_{n,p}(x) \\ \cdot) & g'(\xi) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n \quad (!) \quad \text{Teleskopsumme} \end{aligned}$$

Nach verallgemeinertem Mittelwertsatz existiert ein  $t$  zwischen  $x$  und  $p$  mit:

$$(g(x) - g(p))h'(t) = (h(x) - h(p))g'(t).$$

Also gilt

$$(f(x) - P_{n,p}(x))(n+1)(-1)(x-t)^n = (-1)(x-p)^{n+1} \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$$

$$\Rightarrow f(x) - P_{n,p}(x) = \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x-p)^{n+1}}_{=R_{n+1,p}(t)}$$

$$\Rightarrow f(x) = P_{n,p}(x) + R_{n+1,p}(t)$$

(Es bleibt noch (!) zu begründen:

$$\begin{aligned} g(\xi) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} (x - \xi)^k \\ g'(\xi) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!} (x - \xi)^k - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} k(x - \xi)^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{f^{(k)}(\xi)}{(k-1)!} (x - \xi)^{k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{(k-1)!} (x - \xi)^{k-1} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n \end{aligned}$$

Damit ist der Beweis von (!) abgeschlossen.  $\square$

**Bemerkung.** (Übung). Ist  $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$   $(n+1)$ -mal differenzierbar mit  $g^{(n+1)} = 0$ , so ist  $g$  Polynom vom Grad höchstens  $n$ .

**THEOREM** (Taylorsche Formel mit Abschätzung). Sei  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbar mit  $n \geq 1$  und  $p \in (a, b)$ . Dann gibt es eine Funktion  $r : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $r(x) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow p$  und

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(p)}{k!} (x-p)^k + r(x) (x-p)^n.$$

**Beachte:** Für  $n = 1$  ist uns das wohlbekannt:

$$f(x) = f(p) + f'(p) (x-p) + \underbrace{\frac{\varphi(x)}{(x-p)}}_{=r(x)} (x-p).$$

*Beweis.* Wir setzen  $g(x) = f(x) - P_{n,p}(x)$ . Dann gilt:

$$g(p) = g'(p) = \dots = g^{(n)}(p) = 0.$$

Zu zeigen: Es existiert  $r : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $r(x) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow p$  und  $|g(x)| \leq r(x) |x-p|^n$ .

Es gilt nun

$$|g(x)| \leq \frac{|g^{(n-1)}(t_x)|}{(n-1)!} |x-p|^{n-1} \quad (\diamond)$$

für ein  $t_x$  zwischen  $x$  und  $p$  (einschließlich). (Denn: Gilt  $n = 1$  so wähle  $t_x = x$ ; im Falle  $n \geq 2$  wende Taylorformel mit  $(n-2)$  an).

Nun ist  $g^{(n-1)}$  differenzierbar, d.h.

$$g^{(n-1)}(t_x) = \underbrace{g^{(n-1)}(p)}_{=0} + \underbrace{g^{(n)}(p)(t_x-p)}_{=0} + \varphi(t_x) \quad (\diamond\diamond)$$

mit

$$\frac{\varphi(y)}{y-p} \rightarrow 0, \quad y \rightarrow p.$$

$$\begin{aligned} \left. \begin{array}{l} (\diamond) \\ (\diamond\diamond) \end{array} \right\} &\Rightarrow |g(x)| \leq \frac{\varphi(t_x)}{(n-1)!} |x-p|^{n-1} \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \underbrace{\frac{|\varphi(t_x)|}{|t_x-p|}}_{\rightarrow 0, x \rightarrow p} \underbrace{\frac{|t_x-p|}{|x-p|}}_{\leq 1} |x-p|^n \\ &=: r(x) |x-p|^n \end{aligned}$$

Das beendet den Beweis. □

Mithilfe des Satzes von Taylor können wir Funktionen mit 'vielen' verschwindenden Ableitungen auf Extrema untersuchen: Sei also  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$   $n \geq 2$ -mal differenzierbar mit

$$f'(p) = \dots = f^{(n-1)}(p) = 0, \quad f^{(n)}(p) \neq 0.$$

Dann gilt:

- Ist  $n$  ungerade, so hat  $f$  in  $p$  einen Wendepunkt (d.h.  $f(x) - f(p)$  wechselt in  $p$  das Vorzeichen).
- Ist  $n$  gerade, so hat  $f$  in  $p$  ein lokales  $\begin{matrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{matrix}$ , falls  $\begin{matrix} f^{(n)}(p) < 0 \\ f^{(n)}(p) > 0 \end{matrix}$ .

*Beweis.* Voriger Satz liefert

$$f(x) = f(p) + \left( \frac{f^{(n)}(p)}{n!} + r(x) \right) (x - p)^n$$

Für  $x$  nahe  $p$  hat (...) dasselbe Vorzeichen wie  $f^{(n)}(p)$  (da  $r(x) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow p$ ) Damit folgt

$$f(x) \simeq f(p) + (\text{Vorzeichen}) (x - p)^n.$$

□

**Notation - Landausymbole.** Eine passende Notation für obige Resultate liefern die Landausymbole:  $o$  'klein ohhh von' und  $\mathcal{O}$  'groß Ohhh von' definiert wie folgt: Sei  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $p$  Berührungspunkt von  $D$ . Dann:

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow p \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0$$

$$f(x) = \mathcal{O}(g(x)), \quad x \rightarrow p \Leftrightarrow \exists C > 0 \text{ mit } |f(x)| \leq C \cdot |g(x)| \text{ für } x \text{ nahe } p.$$

Damit können wir die Abschätzungen aus dem Taylorschen Satz wie folgt formulieren.

**FOLGERUNG.** Sei  $I$  ein offenes Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Dann gilt:

(a) Ist  $f$   $n$ -mal differenzierbar (mit  $n \geq 1$ ), so gilt  $f(x) = P_{n,p}(x) + o((x - p)^n)$ .

(b) Ist  $f$   $(n+1)$ -mal differenzierbar (mit  $n \geq 1$ ) so gilt  $f(x) = P_{n,p}(x) + \mathcal{O}((x - p)^{n+1})$

*Beweis.* (a) folgt sofort aus der vorangehenden Variante des Satz von Taylor.

(b) Das folgt leicht wegen

$$f(x) = P_{n,p}(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(p)}{(n+1)!} (x - p)^{n+1} + o((x - p)^{n+1})}_{=\mathcal{O}((x-p)^{n+1})}.$$

Das beendet den Beweis.

□

Wir kommen nun noch zu einem weiteren Thema (das oft mit dem Taylorschen Satz verwechselt wird).

DEFINITION (Taylor-Reihe). Ist  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  beliebig oft differenzierbar, so können wir die sogenannte **Taylor-Reihe** von  $f$  im Entwicklungspunkt  $p$

$$T_{f,p}(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(p)}{k!} (x-p)^k.$$

bilden.

### Bemerkungen.

- ! Der Satz von Taylor behandelt NICHT die Taylorreihe: Beim Satz von Taylor geht es (bei festem  $n$ ) um die Frage, wie nahe  $P_{n,p}(x)$  an  $f(x)$  ist für  $x$  nahe  $p$ . Bei Taylorreihen geht es (bei festem  $x$ ) um die Frage, wie nahe  $P_{n,p}(x)$  an  $f(x)$  ist für große  $n$ .
- ! Es ist nicht klar, daß Reihe für  $x \neq p$  konvergiert.
- ! Selbst wenn  $T_f(x)$  konvergiert, ist nicht automatisch auch  $f(x) = T_f(x)$ . Dazu ein Beispiel: Sei

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & : x > 0 \\ 0 & : x \leq 0 \end{cases}$$

Dann ist  $f$  für  $x < 0$  beliebig oft differenzierbar mit Ableitung 0. Ebenso ist  $f$  für  $x > 0$  beliebig oft differenzierbar und die Ableitung hat die Form

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x}}$$

mit geeigneten Polynomen  $P_n$  (Induktion). Damit folgt (Induktion), daß  $f^{(n)}(0) = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}_0$ . (Denn:  $n = 0$ : klar.

$n \implies (n+1)$  :

$$\begin{aligned} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} &= \frac{f^{(n)}(x)}{x} \\ \frac{f^{(n)}(x)}{x} &= \frac{0}{x} = 0, \quad x < 0 \\ \frac{f^{(n)}(x)}{x} &= \frac{P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \frac{1}{x} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}} \\ &\stackrel{!}{\rightarrow} 0, \quad x \rightarrow 0^+ \end{aligned}$$

$$! \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}} \stackrel{(y=\frac{1}{x})}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} y P_n(y) e^{-y} = 0.$$

Insgesamt gilt also

$$f \neq 0 \text{ aber } T_{f,0}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{0}{k!} (x)^k \equiv 0.$$

- Ist  $R_n(x) = f(x) - P_{n,p}(x)$ , so gilt

$$f(x) = T_{f,p}(x) \Leftrightarrow R_n(x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Die vorhergehende Bemerkung zeigt, daß Taylorreihen nur mit großer Vorsicht zu behandeln sind. Im Falle von Potenzreihen ist die Lage (wie üblich) sehr schön:

**PROPOSITION.** (*Potenzreihe ist Taylorreihe*) Sei  $(a_n)$  eine Folge in  $\mathbb{R}$  mit  $\rho = \limsup \sqrt[n]{|a_n|} < \infty$  und  $R := \frac{1}{\rho}$  und

$$f : (-R + p, R + p) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - p)^n.$$

Dann ist  $f$  beliebig oft differenzierbar und es gilt  $f^{(n)}(p) = a_n n!$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Insbesondere ist die Taylorreihe von  $f$  gerade die  $f$  definierende Potenzreihe.

*Beweis.* Wir wissen schon, daß  $f$  differenzierbar ist mit  $f'(x) = g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - p)^{n-1}$ , wobei die Reihe für  $g$  auch auf  $(p - R, p + R)$  absolut konvergiert. Damit gilt also  $f'(p) = a_1$  und eine Induktion liefert die erste Aussage. Das 'Insbesondere' folgt dann sofort.  $\square$

Wir kommen nun zu den Regeln von **L'Hospital**. Dabei geht es um Grenzwerte der Form  $0/0$  bzw.  $\infty/\infty$  (bzw.  $0 \times \infty$ ). Wir betrachten also Funktionen  $f$  und  $g$  mit  $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$  bzw.  $f(x) \rightarrow \infty$  und  $g(x) \rightarrow \infty$  und untersuchen  $f(x)/g(x)$ .

Zur **Einstimmung** betrachten wir eine einfache Situation: Seien  $f, g$  differenzierbar in  $a \in \mathbb{R}$  mit

$$f(a) = g(a) = 0, \quad g'(a) \neq 0.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \frac{f'(a)}{g'(a)}. \end{aligned}$$



Allgemein können wir Ausdrücke der Form  $'\frac{0}{0}'$  und  $'\frac{\infty}{\infty}'$  mit folgenden Sätzen behandeln.

**THEOREM** (L'Hospital für  $'\frac{0}{0}'$  bei  $a \in \mathbb{R}$ ). *Seien  $a < b$  und  $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und differenzierbar in  $(a, b)$  mit  $g'(x) \neq 0$  für alle  $x \in (a, b)$  gegeben, und es gelte*

$$f(a) = 0 = g(a).$$

*Existiert der Grenzwert  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  (ggf. mit Wert  $\pm\infty$ ), so existiert auch  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$  und es gilt*

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

*Eine entsprechende Aussage gilt für  $f, g : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .*

**Bemerkung.** Die Voraussetzungen implizieren  $g(x) \neq 0$  für  $x \neq a$  wegen

$$g(x) = g(x) - 0 = g'(\xi)(x - a) \neq 0.$$

*Beweis.* Es gilt nach dem verallgemeinerten Mittelwertsatz

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \stackrel{\text{vMWS}}{=} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

mit einem  $\xi$  zwischen  $x$  und  $a$ . Nach Voraussetzung existiert

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

und damit auch

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Damit folgt die Behauptung. □

**THEOREM** (L'Hospital für  $'\frac{0}{0}'$  bei  $\pm\infty$ ). *Seien  $c > 0$  und differenzierbare  $f, g$  in  $(c, \infty)$  mit  $g'(x) \neq 0$  auf  $(c, \infty)$  gegeben und es gelte*

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x).$$

*Existiert  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  (ggf. mit Wert  $\pm\infty$ ), so existiert auch*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

*und es gilt*

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

*Analoge Aussage gilt bei  $-\infty$ .*

*Beweis.* Falls jeweils der Grenzwert auf der rechten Seite existiert, gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{(x=\frac{1}{t})}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} \stackrel{\text{voriger Theorem}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{t^2} f'(\frac{1}{t})}{-\frac{1}{t^2} g'(\frac{1}{t})} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'(\frac{1}{t})}{g'(\frac{1}{t})} \stackrel{(x=\frac{1}{t})}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Da der letzte Grenzwert nach Voraussetzung existiert, folgt die Behauptung.  $\square$

←  
Ende der 27. Vorlesung

Nachdem wir den Fall  $\frac{0}{0}$  behandelt haben, kommen wir nun zum Fall  $\frac{\infty}{\infty}$ .

**THEOREM** (L'Hospital für  $\frac{\infty}{\infty}$  von links bzw. rechts). Sei  $a \in \mathbb{R}$  bzw.  $a = \infty$ . Seien  $f, g$  stetig und differenzierbar mit  $g'(x) \neq 0$  auf einem offenen Intervall links von  $a$  (d.h. auf  $(a-r, a)$  für ein  $r > 0$  falls  $a \in \mathbb{R}$  bzw.  $(c, \infty)$  für ein  $c > 0$  falls  $a = \infty$ ) und es gelte

$$\infty = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} g(x).$$

Existiert  $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  (ggf. mit Wert  $\pm \infty$ ), so existiert auch  $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)}$  und es gilt

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Entsprechende Aussagen gelten für Grenzwerte von rechts.

*Beweis.* Wir betrachten nur den Fall  $a = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$ .

Nach Voraussetzung existiert zu jedem  $S > 0$  ein  $d > 0$  mit  $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \geq S$  für  $x > \xi \geq d$ . Nach dem verallgemeinerten Mittelwertsatz gilt dann

$$\frac{f(x) - f(d)}{g(x) - g(d)} \stackrel{\text{vMWS}}{=} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \geq S$$

und damit

$$f(x) - f(d) \geq S(g(x) - g(d))$$

für  $x > d$ . (Da  $g'$  nicht verschwindet, ist  $g$  streng monoton. Wegen  $g \rightarrow \infty$  muss  $g$  wachsend sein. also gilt  $g(x) - g(d) > 0$ .) Es folgt

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geq S - S \underbrace{\frac{g(d)}{g(x)}}_{\rightarrow 0, x \rightarrow \infty} + \underbrace{\frac{f(d)}{g(x)}}_{\rightarrow 0, x \rightarrow \infty}$$

und nach Bilden des Grenzwertes also

$$\liminf_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \geq S.$$

Da  $S > 0$  beliebig war, folgt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**Bemerkungen.**

- **!** Die Sätze von L'Hospital haben zwei Voraussetzungen: (1) Konvergenz von  $f$  und  $g$  gegen 0 bzw.  $\pm\infty$  und (2) Konvergenz von  $\frac{f'}{g'}$ . Beide Voraussetzungen sind nötig, wie man an folgendem Beispiel sieht:  $f(x) = 1$ ,  $g(x) = x + 7$ . Dann gilt  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/g(x) = 1/7$  und  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)/g'(x) = 0$ .
- Ist  $f$  stetig differenzierbar in  $(a, b)$  und  $p \in (a, b)$ , so liefert die L'Hospital'sche Regel

$$\lim_{x \rightarrow p, x \neq p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f'(x)}{1} = f'(p).$$

Tatsächlich kann man das auch ohne L'Hospital'sche Regel und ohne Stetigkeit der Ableitung direkt aus der Definition der Differenzierbarkeit folgen ;-)

**Beispiele - L'Hospital:**

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \frac{1}{2}$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$ .

**Zur Anwendung noch zwei Tipps.**

- Gegebenenfalls kann man L'Hospital auch iterieren (d.h. mehrmals hintereinander anwenden):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x} \stackrel{\text{falls ex.}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x} \stackrel{\text{falls ex.}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x} = 0.$$

- Man kann L'Hospital auch verwenden, um Ausdrücke der Form  $0 \times \infty$  zu untersuchen. Dazu schreibt man diese in der Form  $\infty/\infty$  bzw.  $0/0$ : Sei  $\alpha > 0$ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(x)}{x^{-\alpha}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{\alpha} \frac{x^{\alpha+1}}{x} \\ &= -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0 \end{aligned}$$

## Das Riemann Integral in einer Dimension

**Ziel.** Ordne für geeignetes  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  der Fläche zwischen dem Graphen von  $f$  und der  $x$ -Achse einen Wert zu (wobei unterhalb der  $x$ -Achse negativ gezählt wird). Der Wert der Fläche wird mit  $\int_a^b f(x)dx$  bezeichnet. Dabei soll gelten:

- $f(x) \equiv c \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = c(b - a)$
- $c \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$
- $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

Außerdem soll folgende Stetigkeitseigenschaft gelten:

- Sind  $f_n, g_n, n \in \mathbb{N}$ , zulässig und gilt  $f_n \leq f \leq g_n$  sowie  $\int_a^b (g_n - f_n)dx \rightarrow 0$ , so ist auch  $f$  zulässig und es gilt

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx.$$

Es zeigt sich, daß durch diese Forderungen  $\int_a^b f dx$  eindeutig bestimmt ist. Es wird als das Riemann-Integral von  $f$  bezeichnet. Das Riemann-Integral ist dann *linear* d.h.

$$\int_a^b f(x) + \lambda g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \lambda \int_a^b g(x)dx$$

und *positiv* d.h.

$$f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq 0$$

und mit gleichmäßiger Konvergenz verträglich. Stetige Funktionen und monotone Funktionen sind Riemann-integrierbar. Ebenso stückweise stetige und stückweise monotone Funktionen.

**Bemerkung.** Die entscheidende Einschränkung des Riemannintegrals ist die vergleichsweise unflexible Stetigkeitseigenschaft. Es gibt eine Reihe von zum Teil deutlich flexibleren Integralbegriffen (Lebesgue-Integral, Bochner-Integral, Daniell-Integral, Darboux-Integral, Pettis-Integral). Das wird zumindest zum Teil in späteren Vorlesungen behandelt.

Um über Riemann-Integrale sprechen zu können, müssen wir voraussetzen:

- Das Intervall  $[a, b]$  ist beschränkt und abgeschlossen d.h.  $-\infty < a < b < \infty$ ,
- Die Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist beschränkt.

Wir gehen nun in zwei Schritten vor: Im ersten Schritt zerlegen wir das Intervall in Teilintervalle und approximieren  $f$  auf den Teilstücken durch konstante Funktionen. Für diese Approximation ist das Integral durch obige Forderungen eindeutig festgelegt. Im zweiten Schritt führen wir einen Grenzübergang durch. Dieser Grenzübergang muss gerechtfertigt werden. Diese Rechtfertigung wird durch eine Definition geliefert: Die Funktionen, wo er gelingt, heißen Riemann-integrierbar.

## 1. Grundlegendes zu Riemann Integration

DEFINITION (Zerlegung). Sei  $-\infty < a \leq b < \infty$ . Ein Tupel

$$Z = (p, \dots, x_n)$$

mit  $a = p < x_1 < \dots < x_n = b$  heißt Zerlegung von  $[a, b]$ .

Die Feinheit  $|Z|$  der Zerlegung  $Z$  ist definiert als

$$|Z| = \max\{x_i - x_{i-1}, i = 1, \dots, n\}.$$

Eine Zerlegung  $Z' = (q, \dots, y_k)$  heißt Verfeinerung von  $Z = (p, \dots, x_n)$ , wenn gilt

$$\{y_i : i = 0, \dots, k\} \supset \{x_i : i = 0, \dots, n\}.$$

Man schreibt dann  $Z' \supset Z$ . Zur Zerlegung  $Z = (p, \dots, x_n)$  und  $Z' = (q, \dots, y_k)$  definieren wir die Vereinigung  $Z \cup Z'$  als die Zerlegung mit den Punkten  $\{x_i : i = 0, \dots, n\} \cup \{y_i : i = 0, \dots, k\}$ .

Approximiert man  $f$  entlang einer Zerlegung  $Z$ , so gibt es mehrere Möglichkeiten **Zeichnung**.

- "Durch Rechtecke von unten" (jeweils kleinster Funktionswert auf  $[x_{i-1}, x_i]$ )
- "Durch Rechtecke von oben" (jeweils größter Funktionswert auf  $[x_{i-1}, x_i]$ )
- "Durch irgendwelche Rechtecke" (irgendein Funktionswert auf  $[x_{i-1}, x_i]$ )

Uns wird es um Funktionen gehen, bei denen alle drei Möglichkeiten im Grenzwert den selben Wert ergeben.

DEFINITION (Obersumme und Untersumme). Zu  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt und Zerlegung  $Z = (p, \dots, x_n)$  von  $[a, b]$  definieren wir die Obersumme von  $f$  bezüglich  $Z$  durch

$$O_Z(f) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$$

die Untersumme von  $f$  bezüglich  $Z$  durch

$$U_Z(f) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$$

PROPOSITION (Eigenschaften von  $U_Z, O_Z$ ). *Es gilt:*

(a)  $U_Z(f) \leq O_Z(f)$  für alle  $Z$

(b)  $Z_1 \subseteq Z_2 \Rightarrow U_{Z_1}(f) \leq U_{Z_2}(f), O_{Z_1}(f) \geq O_{Z_2}(f)$

(c)  $Z_1, Z_2$  beliebig  $\Rightarrow U_{Z_1}(f) \leq O_{Z_2}(f)$

*Beweis.* (a) klar.

(b) Wir betrachten nur  $U_Z$  ( $O_Z$  kann analog behandelt werden).

o.E.:  $Z_2$  hat genau einen Punkt mehr als  $Z_1$ .

$Z_1: a = p < \dots < \alpha < \beta < \dots = b$

$Z_2: a = p < \dots < \alpha < \gamma < \beta < \dots = b$

In  $Z_1: (\beta - \alpha) \inf_{\alpha \leq x \leq \beta} f(x) = (\beta - \gamma) \inf_{\alpha \leq x \leq \beta} f(x) + (\gamma - \alpha) \inf_{\alpha \leq x \leq \beta} f(x)$

In  $Z_2: (\beta - \alpha) \inf_{\alpha \leq x \leq \beta} f(x) \leq (\gamma - \alpha) \inf_{\alpha \leq x \leq \gamma} f(x) + (\beta - \gamma) \inf_{\gamma \leq x \leq \beta} f(x)$

Damit folgt die Behauptung (b).

(c)  $U_{Z_1}(f) \stackrel{\text{b)}}{\leq} U_{Z_1 \cup Z_2}(f) \stackrel{\text{a)}}{\leq} O_{Z_1 \cup Z_2}(f) \leq O_{Z_2}(f)$  Das beendet den Beweis.  $\square$

DEFINITION (Riemann-Summe). *Ist  $Z = (p, \dots, x_n)$  eine Zerlegung von  $[a, b]$  und  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$  mit  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$  gegeben.*

*So definiert man die Riemann-Summe von  $f$  bezüglich der Zerlegung  $Z$  und den Stützstellen  $\xi$  als*

$$S_{Z, \xi}(f) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f(\xi_i)$$

LEMMA (Charakterisierung Riemann-integrierbarkeit). *Sei  $-\infty < a \leq b < \infty$  und  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt. Dann sind äquivalent:*

(i)  $\sup_Z U_Z(f) = \inf_Z O_Z(f)$

(ii) Für alle  $\varepsilon > 0$  existiert eine Zerlegung  $Z$  von  $[a, b]$  mit  $O_Z(f) - U_Z(f) \leq \varepsilon$

(ii) Es existiert ein  $I_f \in \mathbb{R}$ , sodaß zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $\delta > 0$  existiert mit

$$|S_{Z, \xi}(f) - I_f| \leq \varepsilon$$

für alle Zerlegungen  $Z$  mit Feinheit  $|Z| \leq \delta$ .

In diesem Fall gilt:

$$I_f = \sup_Z U_Z(f) = \inf_Z O_Z(f)$$

*Beweis.* (ii)  $\Rightarrow$  (i): Da  $U_{Z_1}(f) \leq O_{Z_2}(f)$  für alle  $Z_1, Z_2$  (s.o.) folgt

$$\sup_{Z_1} U_{Z_1}(f) \leq \inf_{Z_2} O_{Z_2}(f)$$

Wähle nun  $Z_1 = Z_2 = Z$ . Damit ergibt sich:

$$0 \leq \inf O_Z(f) - \sup U_Z(f) \leq \varepsilon$$

Da  $\varepsilon > 0$  beliebig, gilt (i).

(i)  $\Rightarrow$  (ii): Zu  $\varepsilon > 0$  existieren  $Z_1$  und  $Z_2$  mit

$$0 \leq O_{Z_2}(f) - U_{Z_1}(f) \leq \varepsilon$$

Da  $O_{Z_2}(f) \geq O_{Z_1 \cup Z_2}(f)$  und  $U_{Z_1}(f) \leq U_{Z_1 \cup Z_2}(f)$  folgt

$$O_{Z_1 \cup Z_2}(f) - U_{Z_1 \cup Z_2}(f) \leq \varepsilon$$

und damit (ii) mit  $Z = Z_1 \cup Z_2$ .

(i)/(ii)  $\Rightarrow$  (iii): Sei  $C > 0$  mit  $|x| \leq C$  für alle  $x \in [a, b]$ . Sei

$$I_f := \sup_Z U_Z(f) = \inf_Z O_Z(f)$$

und  $\varepsilon > 0$  beliebig. Nach (i)/(ii) existiert eine Zerlegung  $\tilde{Z} = (p, \dots, x_N)$  mit

$$I_f - \frac{\varepsilon}{2} \leq U_{\tilde{Z}}(f) \leq O_{\tilde{Z}}(f) \leq I_f + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Für eine sehr feine Zerlegung  $Z$  liegen nun die Terme von  $S_{Z,\xi}$  zwischen den Termen von  $O_{\tilde{Z}}(f)$  und  $U_{\tilde{Z}}(f)$  außer an den Punkten  $p, \dots, x_N$

**Zeichnung.** Für  $Z = (q, \dots, y_k)$  mit Feinheit  $\delta$  gilt:

$$U_{\tilde{Z}}(f) - \delta NC \leq S_{Z,\xi}(f) \leq O_{\tilde{Z}}(f) + \delta NC$$

wobei  $N$  die Anzahl der Intervalle ist. Nach der Definition von  $I_f$  ergibt sich

$$I_f - \frac{\varepsilon}{2} - \delta NC \leq U_{\tilde{Z}}(f) - \delta NC \leq S_{Z,\xi}(f) \leq O_{\tilde{Z}}(f) + \delta NC \leq I_f + \frac{\varepsilon}{2} + \delta NC$$

Für alle  $\delta > 0$  mit  $\delta NC \leq \frac{\varepsilon}{2}$  ergibt sich also

$$|S_{Z,\xi}(f) - I_f| \leq \varepsilon$$

(iii)  $\Rightarrow$  (ii): Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig und  $\delta > 0$  gemäß (iii) gewählt. Dann gilt

$$I_f + \varepsilon \geq S_{Z,\xi}(f) \geq I_f - \varepsilon$$

für jede Wahl der Stützstellen  $\xi$ . Damit folgt auch

$$I_f + \varepsilon \geq O_Z(f) \geq U_Z(f) \geq I_f - \varepsilon$$

Das liefert gerade

$$O_Z(f) - U_Z(f) \leq 2\varepsilon$$

und da  $\varepsilon > 0$  beliebig war, folgt die Behauptung.  $\square$

**Bemerkung.** Hinter (iii) verbirgt sich Konvergenz eines *Netzes*. Man schreibt dann auch  $\lim_{|Z| \rightarrow 0} S_{Z,f}(\xi)$  für den Grenzwert  $I_f$ .

DEFINITION (Riemann-Integrierbarkeit). *Eine beschränkte Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt Riemann-integrierbar, wenn eine der Bedingungen des vorigen Lemmas erfüllt ist. Dann definiert man das Riemann-Integral von  $f$  in  $[a, b]$  als*

$$\int_a^b f(x)dx := \int_a^b f dx := \sup_Z U_Z(f) = \inf_Z O_Z(f) = I_f =: \lim_{|Z| \rightarrow 0} S_{Z,\xi}(f)$$

Weiterhin setzt man  $\int_b^a f(x)dx := -\int_a^b f(x)dx$  sowie  $\int_a^a f(x)dx = 0$ .

Es gibt im wesentlichen drei Klassen von Riemann-integrierbaren Funktionen:

- Treppenfunktionen
- stetige Funktionen
- monotone Funktionen

DEFINITION (Treppenfunktion). *Eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt Treppenfunktion, wenn es eine Zerlegung  $Z = (p, \dots, x_n)$  von  $[a, b]$  und  $c_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, \dots, n$  gibt mit*

$$f \equiv c_i \text{ auf } (x_{i-1}, x_i)$$

**Bemerkung.** Die Werte einer Treppenfunktion in den Stellen  $x_j$  sind unerheblich.

PROPOSITION (Treppenfunktionen sind Riemann-integrierbar). *Jede Treppenfunktion ist Riemann-integrierbar und es gilt*

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})c_i$$

wenn  $f \equiv c_i$  auf  $(x_{i-1}, x_i)$  für die Zerlegung  $Z = (p, \dots, x_n)$  von  $[a, b]$ .

*Beweis.* Übung □

PROPOSITION (Stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar). *Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar.*

*Beweis.* Da  $[a, b]$  beschränkt und abgeschlossen ist, ist das stetig  $f$  auf  $[a, b]$  beschränkt und gleichmäßig stetig, d. h. für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$  mit  $|f(x) - f(\tilde{x})| \leq \varepsilon$  für  $|x - \tilde{x}| < \delta$ .

Sei  $\varepsilon > 0$  gegeben. Ziel: Finde  $Z$  mit  $O_Z(f) - U_Z(f) < \varepsilon$ .

Da  $f$  gleichmäßig stetig ist, existiert ein  $\delta > 0$  mit

$$(\star) \quad |f(x) - f(\tilde{x})| < \frac{\varepsilon}{b-a} \text{ für } |x - \tilde{x}| < \delta$$



Wähle nun eine beliebige Zerlegung  $Z$  mit  $|Z| < \delta$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} O_Z(f) - U_Z(f) &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \underbrace{\left( \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) - \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) \right)}_{\leq \frac{\varepsilon}{b-a}, \text{ nach } (\star)} \\ &\leq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \frac{\varepsilon}{b-a} \\ &= (b-a) \frac{\varepsilon}{b-a} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**PROPOSITION** (Monotone Funktionen sind Riemann-integrierbar). *Jede monotone Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist Riemann-integrierbar.*

*Beweis.* Sei  $f$  o.E. monoton wachsend (anderer Fall analog). Sei

$$Z = \left( a, a + \frac{b-a}{n}, \dots, a + (n-1) \frac{b-a}{n}, b \right)$$

eine äquidistante Zerlegung mit Feinheit  $\frac{b-a}{n}$ . Dann gilt wegen der Monotonie:

$$\sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) = f(x_i) \quad \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) = f(x_{i-1})$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} O_Z(f) - U_Z(f) &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) (f(x_i) - f(x_{i-1})) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \\ (\text{Teleskopsumme}) &= \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) \\ &\rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Damit folgt die Riemann-Integrierbarkeit.  $\square$

**Bemerkung.** Die vorangehenden beiden Aussagen gelten auch, wenn man das Intervall  $[a, b]$  in abgeschlossene Intervalle teilen kann, auf denen  $f$  die entsprechende Eigenschaft hat.

**PROPOSITION** (Eigenschaften: Linear und positiv). *Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar und  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Dann gilt:*

(a)  $f + \alpha g$  ist Riemann-integrierbar mit

$$\int_a^b f + \alpha g dx = \int_a^b f dx + \alpha \int_a^b g dx$$

$$(b) f \leq 0 \Rightarrow \int_a^b f dx \leq 0$$

$$\text{Insbesondere gilt also } g \leq f \Rightarrow \int_a^b g dx \leq \int_a^b f dx$$

*Beweis.* (a) folgt aus Betrachtungen zu Riemann-Summen durch Grenzübergang.

(b) folgt aus Betrachtungen zu Riemann-Summen durch Grenzübergang.

Das 'Insbesondere' folgt dann mit (a) und (b). ( $g \leq f \Rightarrow 0 \leq f - g \Rightarrow \int_a^b f - g dx \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f dx - \int_a^b g dx$ .)  $\square$

**Bemerkung.** Die Riemann-integrierbaren Funktionen bilden einen unendlichdimensionalen Vektorraum (vgl. Lineare Algebra).

**PROPOSITION** (Eigenschaften: Zusammensetzen von Intervallen). *Seien  $-\infty < a < b < \infty$  und  $c \in (a, b)$  gegeben. Dann gilt:*

- Ist  $f : [a, b]$  Riemann-integrierbar, so sind auch die Einschränkungen  $f|_{[a, c]}$ ,  $f|_{[c, b]}$  Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$$

- Ist  $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar und  $g : [c, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar, so ist auch

$$h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \begin{cases} f(x) : & x \in [a, c) \\ 0 : & x = c \\ g(x) : & x \in (c, b] \end{cases}$$

Riemann-integrierbar und es gilt:

$$\int_a^b h dx = \int_a^c f dx + \int_c^b g dx$$

*Beweis.*

- Einfach (Einschränkung von "guten" Zerlegungen auf  $[a, c]$  bzw.  $[c, b]$ )
- Einfach (Zusammensetzen von "guten" Zerlegungen)

Das beendet den Beweis.  $\square$

**PROPOSITION** (Rechenregeln: Einfache Operationen). *Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar. Dann gilt:*

- $|f|$  ist Riemann-integrierbar und

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f| dx$$

- Die Funktionen  $\min\{f, g\}, \max\{f, g\} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  sind Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b \min\{f, g\} dx \leq \min\left\{\int_a^b f(x) dx, \int_a^b g(x) dx\right\}$$

sowie

$$\int_a^b \max\{f, g\} dx \geq \max\left\{\int_a^b f dx, \int_a^b g dx\right\}.$$

*Beweis.* Zum ersten Punkt: Eine einfache Fallunterscheidung zeigt

$$\sup_J |f(x)| - \inf_J |f(x)| \leq \sup_J f(x) - \inf_J f(x)$$

für jedes Teilintervall  $J$  von  $[a, b]$ . Damit folgt

$$O_Z(|f|) - U_Z(|f|) \leq O_Z(f) - U_Z(f).$$

Da  $f$  Riemann-integrierbar ist, folgt nun, daß  $|f|$  Riemann integrierbar ist. Wegen  $-|f| \leq f \leq |f|$  folgt dann aus der Positivität des Integrals

$$-\int_a^b |f| dx \leq \int_a^b f dx \leq \int_a^b |f| dx.$$

Das liefert die Behauptung. (Alternativ kann die Abschätzung auch mit der Dreiecksungleichung für Riemann-Summen bewiesen werden:  $|S_{Z,\xi}(f)| \leq S_{Z,\xi}(|f|)$ . Nach Grenzübergang folgt dann die Behauptung.)

Zum zweiten Punkt: Es gilt

$$\min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}, \quad \max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}$$

Nun folgt die Behauptung aus dem ersten Punkt und der Linearität des Integrals.  $\square$

**Beispiel - nicht Riemann-integrierbare Funktion.** Sei

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 & : x \text{ rational} \\ 0 & : x \text{ irrational} \end{cases}$$

gegeben. Dann gilt für jede Zerlegung  $z$  von  $[0, 1]$

$$U_Z(f) = 0 \text{ und } O_Z(f) = 1$$

Insbesondere ist  $f$  nicht Riemann-integrierbar.

*Beweis.* Da  $\mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  dicht in  $\mathbb{R}$  sind, gilt

$$U_Z(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) = 0$$

$$O_Z(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) = 1$$

$\square$

**Beispiel- Ausrechnen einer Riemannsumme.** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f = c \equiv \text{const.}$  gegeben. Dann gilt:

$$\int_a^b f(x)dx = c(b - a)$$

*Beweis.* Es handelt sich um eine Treppenfunktion.  $\square$

**Beispiel - Ausrechnen einer Riemannsumme.** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f = x$  gegeben. Dann gilt:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$$

**Zeichnung - Differenz der Flächen zweier Dreiecke.**

*Beweis.* Es ist  $f$  stetig und damit Riemann-integrierbar. Damit ergibt sich das Integral aus

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{|z| \rightarrow 0} S_{Z, \xi}(f)$$

Seien  $Z_n = \left(a, a + \frac{b-a}{n}, a + \frac{2(b-a)}{n}, \dots, b\right)$  und  $\xi_n = (x_1, \dots, x_n)$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned} S_{Z_n, \xi_n}(f) &= \sum_{i=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{b-a}{n} \left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{n} \left(na + \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n i\right) \\ &= (b-a)a + \frac{b-a}{n} \frac{b-a}{n} \frac{n(n+1)}{2} = ba - a^2 + \frac{b^2 - 2ab + a^2}{2} \frac{n(n+1)}{n^2} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} ba - a^2 + \frac{b^2}{2} - ab + \frac{a^2}{2} \\ &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \end{aligned}$$

$\square$

**Das war mühsam!!!**

## 2. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Für stetige Funktionen gibt es eine andere Methode als das Bilden von Riemann Summen, um das Riemann-Integral zu berechnen. Diese lernen wir jetzt kennen.

**DEFINITION (Stammfunktion).** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Eine Funktion  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt Stammfunktion zu  $f$ , wenn  $F$  differenzierbar ist mit  $F' = f$ .

←  
Ende der 29. Vorlesung

**Bemerkungen.**

- Zwei Stammfunktionen unterscheiden sich durch eine Konstante (denn  $F' = G'$  impliziert  $F - G = \text{constant}$  (nach Mittelwertsatz s.o.)).
- Seien  $F, f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben,  $f$  stetig und  $F' = f$  auf  $(a, b)$ . Dann gilt: In  $a$  existiert die rechtsseitige Ableitung von  $F$  und es gilt  $F'(a) = f(a)$ . In  $b$  existiert die linksseitige Ableitung von  $F$  und es gilt  $F'(b) = f(b)$ .  
(Bew.  $\frac{F(x)-F(a)}{x-a} = f(\xi)$  und  $f$  ist stetig....)
- $f = F'$  impliziert, daß  $f(I)$  ein Intervall ist (Zwischenwertsatz für Ableitungen, vgl. Übung). Damit hat man einen ersten Test, ob ein  $f$  eine Stammfunktion haben kann.

Nun zur angekündigten Methode zur Integration stetiger Funktionen:

**THEOREM** (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung - HDI).  
Sei  $-\infty < a < b < \infty$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann gilt:

- Die Funktion  $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $G(x) := \int_a^x f(t)dt$  ist eine Stammfunktion von  $f$ .
- Ist  $F$  eine Stammfunktion von  $f$ , so gilt

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

**Bemerkung.** Der HDI besagt insbesondere, daß jede stetige Funktion eine Stammfunktion besitzt und liefert dann eine Methode zur Integration, nämlich "Finde Stammfunktion". In diesem Sinne ist die Integration die Umkehrung der Differentiation. Den Differentiationsregeln 'Kettenregel' und 'Produktregel' entsprechen dabei die Substitutionsregel und die partielle Integration (s.u.).

*Beweis.* Zum ersten Punkt: Aus der Definition von  $G$  folgt

$$G(x+h) - G(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt.$$

**Idee.**  $G(x+h) - G(x) \sim h(f(x) + \text{kleiner Fehler})$ .

Durch Multiplizieren von  $\frac{1}{h}$  und **Trick!** Subtrahieren von

$$f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x)dt$$

erhält man

$$\frac{G(x+h) - G(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt$$

Daraus folgt dann durch Bilden des Betrages

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(x+h) - G(x)}{h} - f(x) \right| &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \\ &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \sup_{x \leq s \leq x+h} |f(s) - f(x)| dt \\ &= \frac{1}{h} \sup_{x \leq s \leq x+h} |f(s) - f(x)| \int_x^{x+h} dt \\ &= \sup_{x \leq s \leq x+h} |f(s) - f(x)| \\ &\rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0, \quad \text{da } f \text{ stetig} \end{aligned}$$

Nun zum zweiten Punkt: Ist  $F$  eine Stammfunktion zu  $f$ , so gilt  $F' = f = G'$  also  $(F - G)' = 0$ . Nach dem Mittelwertsatz existiert dann also eine Konstante  $c$  mit

$$F - G = c$$

also

$$F = G + c.$$

Damit folgt

$$F(b) - F(a) = (G(b) + c) - (G(a) + c) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**Bemerkung.** Zum Beweis des ersten Punktes des Hauptsatzes der Differential und Integralrechnung kann man auch nutzen:

$$h \min\{f(t) : x \leq t \leq x+h\} \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq h \max\{f(t) : x \leq t \leq x+h\}.$$

**Bemerkung.** Integrale unstetiger Funktionen sind im allgemeinen nicht differenzierbar: Betrachtet man zum Beispiel

$$f(x) = \begin{cases} 0 & : x < 0 \\ 1 & : x \geq 0 \end{cases}$$

So ist  $G(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$  gegeben durch

$$G(x) = \begin{cases} 0 & : x \leq 0 \\ x & : x > 0 \end{cases}.$$

Damit ist  $G$  in  $x = 0$  nicht differenzierbar.

**Notation.** Man schreibt  $F = \int f(x) dx$  oder  $F + C = \int f(x) dx$ , falls  $F$  eine Stammfunktion zu  $f$  ist also  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$  gilt. Ein solches  $F$  ist nur bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt. Weiterhin schreibt man dann  $F|_a^b$  für  $F(b) - F(a)$ .

### Beispiele - Stammfunktionen

- $\int x^\alpha dx = \frac{1}{1+\alpha} x^{\alpha+1} + C$  für  $\alpha \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ . Beachte:  $\int_a^b \frac{1}{x} dx = \ln |b| - \ln |a| = \ln \frac{b}{a}$  für  $0 < a < b$  bzw.  $a < b < 0$ .
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int a^x dx = \frac{1}{\ln(a)} a^x + C$  für  $a > 0$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$  mit  $\tan(x) = \sin x / \cos x$ .
- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$  mit  $\cot x = \cos x / \sin x$ .
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$
- $\int \sinh x dx = \cosh x + C$
- $\int \cosh x dx = \sinh x + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \operatorname{arsinh} x + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{arcosh} x + C$

Zum Finden von Stammfunktionen gibt es drei Methoden:

- Nachschauen in einer Liste (z. B. Bronstein),
- Substitutionsregel,
- partielle Integration.

Oft sind auch Kombinationen dieser Methoden nützlich.

**THEOREM** (Substitutionsregel). Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  stetig differenzierbar. Dann gilt

$$\int_c^d f \circ \varphi(t) \cdot \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(x) dx$$

*Beweis.* Sei  $F$  eine Stammfunktion zu  $f$ . Dann ist nach der Kettenregel  $F \circ \varphi$  differenzierbar mit

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

d. h.  $F \circ \varphi$  ist eine Stammfunktion zu  $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ . Damit folgt

$$\int_c^d f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F \circ \varphi(d) - F \circ \varphi(c) = \int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(x) dx.$$

Das beendet den Beweis. □

**Bemerkung.**

- Die Substitutionsregel ist also die Umkehrung der Kettenregel.
- Es wird nicht vorausgesetzt, daß  $\varphi$  bijektiv ist. Es ist möglich, daß  $\varphi(c) > \varphi(d)$ .

Die Substitutionsregel kann in zwei verschiedenen Varianten angewandt werden:

”Von links nach rechts“: Im Integral stehen bereits die Funktion  $\varphi$  und die Ableitung  $\varphi'$ , sodaß man direkt substituieren kann. Die wichtigste Anwendung dieser Variante ist die *logarithmische Integration*:

**Beispiele**

- Logarithmische Integration:

$$\int_a^b \frac{f'(t)}{f(t)} dt \stackrel{\varphi(t)=f(t)}{=} \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{1}{x} dx = \ln \frac{f(b)}{f(a)}.$$

(falls  $f$  auf  $[a, b]$  stetig ist und festes Vorzeichen hat (also insbesondere nicht verschwindet)).

- $\int_a^b \tan x dx = - \int_a^b \frac{\sin x}{\cos x} dx = \ln \frac{\cos(a)}{\cos(b)}.$
- $\int_a^b (2t)e^{t^2} dt \stackrel{\varphi(t)=t^2}{=} \int_a^b \varphi'(t)e^{\varphi(t)} dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} e^x dx = e^{b^2} - e^{a^2}.$

’Von rechts nach links‘: Durch geschicktes Substituieren versucht man das Integral zu vereinfachen. Dazu wird zunächst  $x$  durch  $\varphi(t)$  ersetzt und die Ableitung gebildet

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) \quad \text{’}dx = \varphi'(t)dt\text{’}.$$

Anschliessend ersetzt man dann die Grenzen  $a = \varphi(c)$  und  $b = \varphi(d)$  durch  $c$  mit  $a = \varphi(c)$  und  $d$  mit  $b = \varphi(d)$ .

**Beispiel**  $\int_a^b 2ye^{y^2} \stackrel{y=\sqrt{t}}{=} \int_{a^2}^{b^2} 2\sqrt{t}e^t \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \int_{a^2}^{b^2} e^t dt = e^{a^2} - e^{b^2}$

Wir kommen nun zur ’Umkehrung’ der Produktregel.

**THEOREM** (Partielle Integration). *Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $g$  stetig differenzierbar und  $F$  Stammfunktion zu  $f$ . Dann gilt:*

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = F(x)g(x)|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x)dx$$

*Beweis.* Nach Produktregel gilt  $(Fg)'(x) = F'g + Fg' = fg + Fg'$ . Also folgt  $fg = (Fg)' - Fg'$ . Integrieren liefert dann

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b (Fg)'(x)dx - \int_a^b F(x)g'(x)dx = Fg|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x)dx.$$

Das beendet den Beweis. □

**Beispiele.**

- Es gilt

$$\begin{aligned} \int_a^b x \sin x dx &= x(-\cos x)|_a^b - \int_a^b 1(-\cos x)dx \\ &= -x \cos x|_a^b + \int_a^b \cos x dx \\ &= -b \cos c + a \cos a + \sin b - \sin a \end{aligned}$$



- Es gilt

$$\begin{aligned}
 \int_a^b x^2 e^x dx &= x^2 e^x \Big|_a^b - \int_a^b 2x e^x dx \\
 &= x^2 e^x \Big|_a^b - \left( 2x e^x \Big|_a^b - \int_a^b 2e^x dx \right) \\
 &= x^2 e^x \Big|_a^b - 2x e^x \Big|_a^b + 2e^x \Big|_a^b \\
 &= (x^2 - 2x + 2) e^x \Big|_a^b
 \end{aligned}$$

Manchmal liefert partielle Integration eine Iterationsformel für ein Integral. **Beispiel**

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \sin^n x dx &= \int_a^b \underbrace{\sin x}_f \underbrace{\sin^{n-1} x}_g dx \\
 &= -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_a^b - \int_a^b (-\cos x)(n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx \\
 &= -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_a^b + \int_a^b (n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\
 &= -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_a^b + (n-1) \int_a^b (\sin^{n-2} x - \sin^n x) dx \\
 \Rightarrow n \int_a^b \sin^n x dx &= -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_a^b + (n-1) \int_a^b \sin^{n-2} x dx \\
 \Rightarrow \int_a^b \sin^n x dx &= \frac{-\cos x \sin^{n-1} x \Big|_a^b}{n} + \frac{n-1}{n} \int_a^b \sin^{n-2} x dx
 \end{aligned}$$

Es kann auch nützlich sein, die konstante Funktion 1 ins Integral zu schreiben. **Beispiel**

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \ln x dx &= \int_a^b \underbrace{1}_f \underbrace{\ln x}_g dx \\
 &= x \ln x \Big|_a^b - \int_a^b x \frac{1}{x} dx \\
 &= x \ln x \Big|_a^b - x \Big|_a^b
 \end{aligned}$$

**Bemerkung.** Wir haben partielle Integration und Substitution bisher nur für bestimmte Integrale eingeführt. Für die unbestimmten Integrale (Stammfunktionen) gelten analoge Regeln.

Erinnerung: Sind  $(h_n)$  und  $h$  Funktionen auf  $[a, b]$ , so heisst  $(h_n)$  gleichmaessig konvergent gegen  $h$ , falls zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $N = N_\varepsilon \in \mathbb{N}$

existiert mit

$$|h_n(x) - h(x)| \leq \varepsilon$$

fuer alle  $n \geq N$  und  $x \in [a, b]$ .

Als Anwendung des HDI lernen wir jetzt einen Satz ueber Vertauschung von Ableiten und Grenzwert kennen.

**THEOREM.** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Gibt es stetig differenzierbare Funktionen  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , und eine Funktion  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  mit

- $f_n(x) \rightarrow f(x)$  fuer jedes  $x \in [a, b]$ ,
- $f'_n \rightarrow g$  gleichmaig,

so ist  $f$  stetig differenzierbar und  $f' = g$ .

*Beweis.* Da  $(f'_n)$  stetig und gleichmaig gegen  $g$  konvergent, folgt Stetigkeit von  $g$ . Weiterhin gilt nach dem HDI (angewendet auf  $f_n$ )

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt$$

Bildet man nun Grenzwert und nutzt (!) gleichmaig Konvergenz der  $f'_n$  gegen  $g$ , so folgt

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$$

Nach dem HDI (beachte  $g$  stetig) ist dann  $f$  differenzierbar mit  $f' = g$ .

! Wir schaetzen ab

$$\left| \int_a^x f'_n(t) dt - \int_a^x g(t) dt \right| \leq \int_a^b |f'_n(t) - g(t)| dt \leq \sup_{x \in [a, b]} |f'_n(t) - g(t)| (b-a) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

□

### Bemerkung.

- Der Beweis zeigt, dass gleichmaessige Konvergenz der  $(f'_n)$  und Konvergenz der  $f_n$  in einem Punkt  $a$ , schon punktweise Konvergenz der  $f_n$  auf ganz  $[a, b]$  implizieren.
- Punktweise Konvergenz von  $f_n$  und  $f'_n$  reicht nicht, um Differenzierbarkeit von  $f$  sicherzustellen: Betrachte dazu

$$f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{\frac{1}{n} + x^2}.$$

Dann gilt  $f_n \rightarrow |\cdot|$  punktweise und  $f'_n(x) = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{n} + x^2}} \rightarrow \text{sgn}(x)$  punktweise. Aber  $|\cdot|$  ist nicht differenzierbar (in 0).

Nach dieser Anwendung des HDI, kommen wir noch zu einer Abgeschlossenheitseigenschaft des Vektorraumes der Riemann-integrierbaren Funktionen.

**THEOREM.** Sei  $-\infty < a < b < \infty$ . Sei  $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Wenn es Riemann-integrierbare Funktionen  $f_n, g_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  gibt mit

- $g_n \leq h \leq f_n$  fuer alle  $n \in \mathbb{N}$  und
- $\int_a^b (f_n - g_n) dx \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ ,

so ist auch  $h$  Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b h dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n dx.$$

*Beweis.* Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Das Ziel ist es nun zunaechst

$$O_Z(h) - U_Z(h) \leq \varepsilon$$

fuer eine geeignete Zerlegung  $Z$  zu zeigen.

Waehle nun ein  $N \in \mathbb{N}$  mit

$$(*) \quad \int_a^b f_N dx - \int_a^b g_N dx = \int_a^b (f_N - g_N) dx \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Da  $f_N$  und  $g_N$  Riemann-integrierbar sind, gibt es eine Zerlegung  $Z$  von  $[a, b]$  mit

$$\int_a^b g_N dx - \frac{\varepsilon}{3} \leq U_Z(g_N) \left( \leq \int_a^b g_N dt \right)$$

und

$$\int_a^b f_N dx + \frac{\varepsilon}{3} \geq O_Z(f_N) \left( \geq \int_a^b f_N dt \right).$$

Wegen  $g_N \leq h \leq f_N$  gilt also

$$(**) \quad \int_a^b g_N dx - \frac{\varepsilon}{3} \leq U_Z(g_N) \leq U_Z(h) \leq O_Z(h) \leq O_Z(f_N) \leq \int_a^b f_N dx + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Wegen (\*) folgt dann

$$O_Z(h) - U_Z(h) \leq \varepsilon.$$

Da  $\varepsilon > 0$  beliebig ist, ergibt sich die Riemannintegrierbarkeit von  $h$ . Weiterhin folgt aus (\*\*) auch

$$(***) \quad \left| \int_a^b h dx - \int_a^b f_N dx \right|, \left| \int_a^b h dx - \int_a^b g_N dx \right| \leq 2\varepsilon$$

fuer alle  $N$ , sodass (\*) gilt. Da (\*) fuer alle genuegend grossen  $N$  gilt, folgt (\*\*\*) fuer alle genuegend grossen  $N$ . Da  $\varepsilon > 0$  beliebig ist, folgt die Konvergenzaussage.  $\square$

**Bemerkung.** Nach Definition ist ein  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  genau dann Riemann-integrierbar, wenn es Treppenfunktionen  $f_n, g_n$  gibt, die die beiden im Theorem genannten Punkte erfuellen. Da alle Treppenfunktionen Riemann-integrierbar sind, sagt das Theorem damit, dass die Menge der Riemann-integrierbaren Funktionen, die kleinste Menge ist, die alle Treppenfunktionen enthaelt und under der in den beiden Punkten beschriebenen Konvergenz abgeschlossen ist.

FOLGERUNG. Seien  $h_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , Riemann-integrierbar und  $h_n$  konvergiere gleichmäßig gegen  $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann ist  $h$  Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b h(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h_n(x) dx$$

*Beweis.* Es ist zweierlei zu zeigen: Die Riemann-Integrierbarkeit von  $f$  und die Aussage ueber den Grenzwert.

Sei

$$\delta_n := \sup\{|h(x) - h_n(x)| : x \in [a, b]\}.$$

Die gleichmaessige Konvergenz der  $h_n$  gegen  $h$  bedeutet gerade, dass  $\delta_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ . Weiterhin sind die Funktionen  $g_n := h_n - \delta_n$  und  $f_n := h_n + \delta_n$  Riemann-integrierbar, und es gilt

- $g_n \leq h \leq f_n$  fuer alle  $n \in \mathbb{N}$
- $\int_a^b (f_n - g_n) dx \leq |b - a| 2\delta_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ .

Damit folgt aus dem vorigen Theorem, dass  $h$  Riemannintegrierbar ist mit

$$\int_a^b h dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n dx.$$

Offenbar gilt

$$\left| \int_a^b f_n dx - \int_a^b h_n dx \right| = \int_a^b (f_n - h_n) dx = \delta_n (b - a) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Damit folgt die gewuenschte Konvergenzaussage. □

**Erinnerung - Cauchy-Schwarz Ungleichung.** Sei  $V$  ein reeller Vektorraum und

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R} \quad (v, w) \mapsto \langle v, w \rangle$$

sei

- bilinear (d.h.  $\langle v + \alpha w, u \rangle = \dots, \langle u, v + \alpha w \rangle = \dots$ )
- symmetrisch (d.h.  $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ )
- positiv (d.h.  $\langle u, u \rangle \geq 0$  fuer alle  $u \in V$ ).

Dann gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$|\langle v, w \rangle| \leq \langle v, v \rangle^{1/2} \langle w, w \rangle^{1/2}$$

fuer alle  $v, w \in V$ .

(Bew. Es gilt

$$(*) \quad 0 \leq \langle v + \lambda w, v + \lambda w \rangle = \langle v, v \rangle + 2\lambda \langle v, w \rangle + \lambda^2 \langle w, w \rangle$$

fuer alle  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Wir unterscheiden zwei Faelle:

*Fall 1:*  $\langle w, w \rangle = 0$ . Aus (\*) fuer  $\lambda \rightarrow \infty$  und  $\lambda \rightarrow -\infty$  folgt dann  $\langle v, w \rangle = 0$ . Damit folgt die gewuenschte Ungleichung.

Fall 2:  $\langle w, w \rangle > 0$ . Dann koennen wir in (\*) dividieren und erhalten

$$0 \leq \frac{\langle v, v \rangle}{\langle w, w \rangle} + 2\lambda \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} + \lambda^2.$$

Quadratisches Ergaenzen ergibt dann

$$0 \leq \left( \lambda + \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} \right)^2 + \frac{\langle v, v \rangle}{\langle w, w \rangle} - \frac{|\langle v, w \rangle|^2}{|\langle w, w \rangle|^2}.$$

Da dies fuer alle  $\lambda$  gelten soll, folgt

$$0 \leq \frac{\langle v, v \rangle}{\langle w, w \rangle} - \frac{|\langle v, w \rangle|^2}{|\langle w, w \rangle|^2}.$$

Damit folgt die gewuenschte Ungleichung.)

**THEOREM.** (*Cauchy-Schwarz Ungleichung*) Sind  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar, so ist auch  $fg$  Riemann integrierbar und es gilt

$$\left| \int_a^b fg dx \right| \leq \left( \int_a^b f^2 dx \right)^{1/2} \left( \int_a^b g^2 dx \right)^{1/2}.$$

*Beweis.* Fuer  $f, g \geq 0$  Riemann-integrierbar, folgt die Riemannintegrierbarkeit von  $fg$  leicht. Der allgemeine Fall laesst sich darauf zurueckfuehren durch Zerlegen von  $f, g$  in Positiv- und Negativteil. Diese entstehen durch geeignete Maxima und Minimabbildung und sind daher Riemann-integrierbar.

Es bleibt die Ungleichung zu beweisen. Dazu betrachtet man auf dem Vektorraum  $R$  der Riemann-integrierbaren Funktionen auf  $[a, b]$  die Abbildung

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : R \times R \rightarrow \mathbb{R}, \langle f, g \rangle = \int_a^b fg dt.$$

Diese Abbildung ist offenbar bilinear, symmetrisch und positiv. Nun folgt die Ungleichung aus der Cauchy-Schwarz Ungleichung.  $\square$

**FOLGERUNG.** Sei  $-\infty < a < b < \infty$ . Ist  $w : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$  Riemann-integrierbar, so ist auch  $\sqrt{w}$  Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b \sqrt{w} dx \leq (b-a)^{1/2} \left( \int_a^b w dt \right)^{1/2}.$$

*Beweis.* Es reicht zu zeigen, dass  $\sqrt{w}$  Riemann-integrierbar ist. Die letzte Aussage folgt dann aus der Cauchy-Schwarz Ungleichung. Da  $w$  Riemann-integrierbar ist, existieren zu jedem  $\varepsilon > 0$  Treppenfunktionen  $\varphi, \psi$  mit

$$0 \leq \varphi \leq w \leq \psi$$

und  $\int_a^b \psi - \varphi dx \leq \varepsilon$ . Wegen der Monotonie der Wurzel sind dann  $\sqrt{\varphi}, \sqrt{\psi}$  Treppenfunktionen mit

$$0 \leq \sqrt{\varphi} \leq \sqrt{w} \leq \sqrt{\psi}.$$

Weiterhin gilt

$$\int_a^b (\sqrt{\psi} - \sqrt{\varphi}) dx \leq \int_a^b \sqrt{\psi - \varphi} dx \leq \left( \int_a^b (\psi - \varphi) dx \right)^{1/2} (b - a)^{1/2}.$$

Daraus folgt die gewünschte Integrierbarkeit nach dem Theorem (zur Abgeschlossenheit R.i. Funktionen).  $\square$

**Bemerkung.** Tatsächlich ist für jede stetige Funktion  $w$  auf  $\mathbb{R}$  und jedes Riemann-integrierbare  $f$  auf  $[a, b]$  auch  $w \circ f$  Riemann-integrierbar (Übung: Nutze, dass jedes stetige  $w$  auf Kompakte gleichmäßig durch Polynome approximiert werden kann).

← Ende der 1. Vorlesung

Zum Abschluss dieses Abschnittes diskutieren wir noch Integration komplexwertiger Funktionen

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) = u(x) + iv(x)$$

mit  $u, v : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ . Es heißt ein solches  $f$  Riemann-integrierbar, wenn  $u = \Re f$  und  $v = \Im f$  Riemann-integrierbar sind. Dann definiert man

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b u dx + i \int_a^b v dx.$$

Das Integral ist dann (Nachrechnen) linear d.h. es gilt

$$\int_a^b (f + zg) dx = \int_a^b f dx + z \int_a^b g dx.$$

Ist  $F = U + iV$  (mit reellwertigen  $U, V$ ) eine Stammfunktion von  $f = u + iv$  (d.h. es gilt  $U' = u$  und  $V' = v$ ), so folgt aus Anwendung des HDI auf Real- und Imaginärteil sofort

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx.$$

**PROPOSITION.** Ist  $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$  Riemann-integrierbar, so ist auch  $|f| : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar, und es gilt

$$\left| \int_a^b f dx \right| \leq \int_a^b |f| dx.$$

*Beweis.* Sei  $f = u + iv$  mit reellwertigem  $u$  und  $v$ . Dann ist

$$|f| = \sqrt{u^2 + v^2}$$

Riemann-integrierbar (nach den oben diskutierten Sätzen). Setze nun  $z := \int_a^b f dx$ . Ist  $z = 0$ , so ist nichts mehr zu zeigen. Andernfalls setzen wir

$$\alpha := \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Dann gilt nach Konstruktion von  $\alpha$  also

$$\left| \int_a^b f dx \right| = \alpha \int_a^b f dx = \int_a^b \alpha f dx.$$

Da die linke Seite reell ist, folgt also

$$\left| \int_a^b f dx \right| = \int_a^b \Re(\alpha f) dx \leq \int_a^b |\Re(\alpha f)| dx \leq \int_a^b |\alpha f| dx = \int_a^b |f| dx.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

### 3. Partialbruchzerlegung und Integration rationaler Funktionen

In diesem Abschnitt diskutieren wir die Integration rationaler Funktionen.

Eine rationale Funktion ist eine Funktion der Form  $\frac{P_1}{P_2}$  mit Polynomen  $P_1$  und  $P_2$ . (Diese Funktion ist dann ueberall definiert ausser in den Nullstellen von  $P_2$ .) Ist der Grad von  $P_1$  größer (oder gleich) dem Grad von  $P_2$ , so kann man nach Polynomdivision  $\frac{P_1}{P_2}$  schreiben als  $\frac{P_1}{P_2} = Q + \frac{R}{P_2}$  mit geeigneten Polynomen  $Q$  und  $R$ , wobei der Grad von  $R$  kleiner ist als der Grad von  $P_2$ .

#### Beispiel - Polynomdivision

$$\frac{x^3 + 5x^2 - 7x + 4}{2x - 8} \quad P_1 = x^3 + 5x^2 - 7x + 4, \quad P_2 = 2x - 8$$

$$(x^3 + 5x^2 - 7x + 4) : (2x - 8) = \frac{1}{2}x^2 + 4, 5x + 14, 5 + \frac{120}{2x - 8}$$

Für die Integration rationaler Funktionen reicht es also Funktionen der Form  $\frac{R}{P}$  mit  $\text{Grad} R < \text{Grad} P$  zu betrachten.

Hat  $P$  den Grad  $n$ , so hat  $P$  nach dem Fundamentalsatz der Algebra genau  $n$  Nullstellen (über  $\mathbb{C}$ ), d. h.

$$P(x) = a \prod_{i=1}^n (x - z_i) \quad \text{mit } z_i \in \mathbb{C}, a \neq 0$$

Ist  $P$  ein reelles Polynom, d. h. Koeffizienten von  $P$  sind reell, so ist mit  $z$  auch  $\bar{z}$  eine Nullstelle von  $P$  ( $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$ ). Weiterhin gilt mit  $z = \xi + i\mu$  mit  $\mu \neq 0$  dann

$$(x - z)(x - \bar{z}) = (x - \xi - i\mu)(x - \xi + i\mu) = (x - \xi)^2 + \mu^2,$$

wobei die rechte Seite ein reelles Polynom ist. Damit ist dann mit  $P$  auch das durch  $(x - z)(x - \bar{z})$  dividierte Polynom reell. Induktiv folgt, dass dann sogar die Vielfachheit von der Nullstelle  $z$  und der Nullstelle  $\bar{z}$  überein stimmen muessen. Ist diese Vielfachheit  $l$  so gilt natuerlich

$$(x - z)^l (x - \bar{z})^l = ((x - \xi)^2 + \mu^2)^l.$$

Ein reelles Polynom hat daher die Produktdarstellung

$$P(x) = a \prod_{i=1}^r (x - x_i)^{k_i} \prod_{j=1}^s [(x - \xi_j)^2 + \mu_j^2]^{l_j}$$

mit den reellen Nullstellen  $x_1, \dots, x_r$  der Vielfachheit  $k_i$  und den komplexen Nullstellen  $\xi_j \pm i\mu_j$   $j = 1, \dots, s$  der Vielfachheit  $l_j$ . Der Grad  $\text{Grad}P$  von  $P$  ist dann gerade

$$\sum_{i=1}^r k_i + 2 \sum_{j=1}^s l_j$$

**THEOREM.** (*Partialbruchzerlegung*) Zu reellen Polynomen  $R$  und  $P$  mit

$$P(x) = \prod_{i=1}^r (x - x_i)^{k_i} \prod_{j=1}^s [(x - \xi_j)^2 + \mu_j^2]^{l_j}$$

und  $\text{Grad}R < \text{Grad}P$  gibt es Koeffizienten  $a_{ik}, b_{jl}, c_{jl}$  mit

$$\frac{R(x)}{P(x)} = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{k_i} \frac{a_{ik}}{(x - x_i)^k} + \sum_{j=1}^s \sum_{l=1}^{l_j} \frac{b_{jl}x + c_{jl}}{((x - \xi_j)^2 + \mu_j^2)^l}$$

*Beweis.* Übung □

Die Zahlen  $a_{ik}, b_{jl}, c_{jl}$  werden durch Koeffizientenvergleich oder Einsetzen spezieller Werte für  $x$  bestimmt.

### Beispiel

$$\frac{-x^2 - 6x + 3}{(x - 1)^2(x^2 + 1)^2} = \frac{a_{11}}{x - 1} + \frac{a_{12}}{(x - 1)^2} + \frac{b_{11}x + c_{11}}{x^2 + 1} + \frac{b_{12}x + c_{12}}{(x^2 + 1)^2}$$

Nun Multiplikation mit dem Hauptnenner

$$= \frac{a_{11}(x - 1)(x^2 + 1)^2 + a_{12}(x^2 + 1)^2 + (b_{11}x + c_{11})(x - 1)^2(x^2 + 1) + (b_{12}x + c_{12})(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x^2 + 1)^2}$$

Koeffizientenvergleich ergibt:

$$\begin{aligned} x^5 : & \quad 0 = a_{11} + b_{11} \\ x^4 : & \quad 0 = -a_{11} + a_{12} - 2b_{11} + c_{11} \\ x^3 : & \quad 0 = 2a_{11} + 2b_{11} - 2c_{11} + b_{12} \\ x^2 : & \quad -1 = -2a_{11} + 2a_{12} - 2b_{11} + 2c_{11} - 2b_{12} + c_{12} \\ x^1 : & \quad -6 = a_{11} + b_{11} - 2c_{11} + b_{12} - 2c_{12} \\ x^0 : & \quad 3 = a_{11} + a_{12} + c_{11} + c_{12} \end{aligned}$$

Auflösen des Gleichungssystems liefert:

$$a_{11} = 0, \quad a_{12} = -1, \quad b_{11} = 0, \quad b_{12} = 2, \quad c_{11} = 1, \quad c_{12} = 3$$



### 3. PARTIALBRUCHZERLEGUNG UND INTEGRATION RATIONALER FUNKTIONEN

Damit folgt:

$$\frac{-x^2 - 6x + 3}{(x-1)^2(x^2+1)^2} = -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2+1} + \frac{2x+3}{(x^2+1)^2}$$

**Beachte.** Man kann die Koeffizienten auch durch Einsetzen geeigneter Werte von  $x$  bestimmen. Insbesondere gilt: Ist  $x_{i_0}$  eine  $k$ -fache Nullstelle von  $P$ , so gilt für  $a_{i_0 k}$ :

$$a_{i_0 k} = \left. \frac{R(x)}{P(x)} (x-p)^k \right|_{x=p}$$

Im Beispiel:

$$a_{12} = \left. \frac{-x^2 - 6x + 3}{(x^2 + 1)^2} \right|_{x=1} = -1$$

Mit dem Theorem wird die Integration von rationalen Funktionen auf eine Reihe von bekannten Integralen zurueckgefuehrt. Hier geben wir die Ergebnisse an:

- $\int \frac{a}{x-p} dx = a \ln |x-p| + C$ .
- $\int \frac{a}{(x-p)^n} dx = \frac{1}{1-n} \frac{a}{(x-p)^{n-1}} + C$  (
- $\int \frac{bx+c}{(x-\xi)^2+\mu^2} dx = \frac{b}{2} \int \frac{2x-2\xi}{(x-\xi)^2+\mu^2} dx + \frac{b\xi+c}{\mu} \int \frac{\frac{1}{\mu}}{\left(\frac{x-\xi}{\mu}\right)^2+1}$   
 $= \frac{b}{2} \log((x-\xi)^2 + \mu^2) + \frac{b\xi+c}{\mu} \arctan\left(\frac{x-\xi}{\mu}\right) + C$ . Dabei wurde zunaechst das Integral so umgeschrieben, dass der Zaehler die Ableitung des Nenners ist und anschliessend die Substitutionsregel angewendet.
- $\int \frac{bx+c}{((x-\xi)^2+\mu^2)^n} dx = \frac{b}{2(1-n)} \frac{1}{((x-\xi)^2+\mu^2)^{n-1}} + \frac{b\xi+c}{\mu^{2n-1}} \int \frac{dt}{(t^2+1)^n}$  mit  $t = \frac{x-\xi}{\mu}$ . Hier wurde aehnlich wie im vorigen Fall das Integral so umgeschrieben, dass der Zaehler die Ableitung des Terms unter der Klammer im Nenner ist, und anschliessend die Substitutionsregel angewendet. Fuer die auftretenden Terme

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+1)^n}$$

gibt es eine Rekursion wie folgt:

$$I_{n+1} = \frac{1}{2n} \left( \frac{t}{(t^2+1)^n} + (2n-1)I_n(t) \right)$$

Insbesondere

$$I_2 = \frac{1}{2} \left( \frac{t}{t^2+1} + \arctan t \right) + C$$

#### 4. Uneigentliche Integrale

Wir kommen nun zur uneigentlichen Integration. Bisher hatten wir immer vorausgesetzt:

- $[a, b]$  kompakt, d. h.  $a, b$  endlich
- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt

Wir schwächen das nun ab.

DEFINITION. (*Uneigentliche Riemann-Integrierbarkeit*)

- Sei  $-\infty \leq a < b < \infty$ . Die Funktion  $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt *uneigentlich Riemann-integrierbar bei  $a$* , wenn für  $x > a$  die Einschränkung von  $f$  auf  $[x, b]$  Riemann-integrierbar ist und der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt$$

existiert. **Zeichnung** In diesem Fall bezeichnen wir diesen Grenzwert mit

$$\int_a^b f(t) dt$$

- Sei  $b \leq \infty$  und  $-\infty < a < b$ . Die Funktion  $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  heißt *uneigentlich Riemann-integrierbar bei  $b$* , wenn für  $x < b$  die Einschränkung von  $f$  auf  $[a, x]$  Riemann-integrierbar ist und der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$$

existiert. **Zeichnung.** In diesem Fall bezeichnen wir diesen Grenzwert mit  $\int_a^b f(t) dt$ .

- Ist  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben und sind für ein (jedes)  $c \in (a, b)$  die Einschränkungen von  $f$  auf  $(a, c]$  bzw.  $[c, b)$  uneigentlich Riemann-integrierbar, so nennen wir  $f$  bei  $a$  und  $b$  *uneigentlich Riemann-integrierbar* **Zeichnung.** und setzen

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$$

#### Bemerkung

- Die Definition enthält zwei relevante Situationen:
  - $a$  bzw.  $b$  ist endlich und  $f$  hat Singularität, d. h. ist unbeschränkt bei  $a$  bzw.  $b$ , aber so, dass das Integral noch existiert.
  - Es gilt  $a = -\infty$  bzw.  $b = \infty$  und  $f$  faellt schnell genug bzw. oszilliert stark genug, um Existenz des Grenzwertes zu ermöglichen.
- Auf die im Grenzwerte auftretenden Integrale können die üblichen Rechenregeln (Substitutionsregel, partielle Integration...)

angewendet werden. In diesem Sinne bleiben diese Regeln auch für uneigentliche Integrale gültig.

### Beispiele.

- $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \exp(-t)$ . Dann gilt

$$\int_0^{\infty} \exp(-t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \exp(-t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} -\exp(-t) \Big|_0^x = 1.$$

- Sei  $\alpha > 0$ ,  $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{1}{t^\alpha}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{t^\alpha} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \Big|_x^1 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \Big|_x^1 \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} : & 0 < \alpha < 1 \\ \infty : & \alpha \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

- Sei  $\alpha > 0$ ,  $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{1}{t^\alpha}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt &= \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \Big|_1^x; \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \Big|_1^x \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} : & 1 < \alpha \\ \infty : & 0 < \alpha \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

- (Uebung): Es existiert  $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sin x dx$ , aber nicht  $\int_1^{\infty} \left| \frac{1}{x} \sin x \right| dx$ .

**Bemerkung.** Wir halten fest:  $\int_0^{\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$  existiert fuer kein  $\alpha \in \mathbb{R}$ . (Fuer  $\alpha > 0$  wurde das gerade oben diskutiert. Fuer  $\alpha \leq 0$  ist die Aussage sowieso klar.)

Eine wichtige Funktion (für 'später') wird mittels uneigentlichem Integral definiert.

PROPOSITION. Für  $x > 0$  existiert das uneigentliche Integral

$$\Gamma(x) := \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Es gilt

$$\Gamma(1) = 1 \quad \text{sowie} \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

Insbesondere folgt  $\Gamma(n+1) = n!$  für alle  $n \in \mathbb{N}$

*Beweis.* Wir zeigen zunächst Existenz des Integrals bei 0 und  $\infty$ . Da der Integrand positiv ist, geht es letzten Endes darum geeignete Beschränktheiten zu zeigen.

*Existenz bei 0 (für  $0 < x < 1$ ):* Für  $x < 1$  ist der Integrand unbeschränkt. Es existiert  $\int_0^1 t^{x-1} dt$  für alle  $x-1 > -1$  (nach obigem). Da  $e^{-t}$  auf  $[0, 1]$  beschränkt und stetig ist, existiert dann das uneigentliche Integral bei 0.

*Existenz bei  $\infty$ :* Für genügend große  $t$  gilt

$$|t^{x-1}e^{-t}| = \underbrace{\left|t^{x-1}e^{-\frac{t}{2}}\right|}_{\leq 1} \left|e^{-\frac{t}{2}}\right| \leq \left|e^{-\frac{t}{2}}\right|$$

Es ergibt sich

$$\int_1^R t^{x-1}e^{-t} dt = \int_1^{R_0} t^{x-1}e^{-t} dt + \int_{R_0}^R t^{x-1}e^{-t} dt \leq C + \int_{R_0}^R e^{-t/2} dt \leq \tilde{C} < \infty.$$

Damit existiert

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t} dt = \lim_{r \rightarrow 0} \int_r^1 t^{x-1}e^{-t} dt + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R t^{x-1}e^{-t} dt$$

Wir kommen nun zu den behaupteten Eigenschaften: Es gilt (s.o.)

$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$ . Weiterhin gilt mit partieller Integration:

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) &= \lim_{r \rightarrow 0} \int_r^1 t^x e^{-t} dt + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R t^x e^{-t} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \left( -t^x e^{-t} \Big|_r^1 + \int_r^R x t^{x-1} e^{-t} dt \right) + \lim_{R \rightarrow \infty} \left( -t^x e^{-t} \Big|_1^R + \int_1^R x t^{x-1} e^{-t} dt \right) \\ &= 0 + x\Gamma(x). \end{aligned}$$

Das 'Insbesondere' folgt sofort aus den Eigenschaften und einer Induktion.  $\square$

DEFINITION. *Die Abbildung*

$$\Gamma(0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \Gamma(x),$$

*heißt Gammafunktion.*

## Die Exponentialfunktion und ihre Verwandten

In diesem Kapitel untersuchen wir noch einmal systematisch die Exponentialfunktion und von ihr abgeleitete Funktionen.

Wir erinnern zunachst an einige Eigenschaften. Die Exponentialfunktion ist definiert durch die auf ganz  $\mathbb{C}$  absolut konvergente Reihe

$$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Sie hat folgende Eigenschaften.

- $\exp(0) = 1$  und  $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$ . Insbesondere verschwindet  $\exp$  nirgends und es gilt also  $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}$ .
- Die Exponentialfunktion ist stetig und es existiert

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\exp(z) - \exp(z_0)}{z - z_0} = \exp(z_0).$$

**PROPOSITION** (Restgliedabschätzung der Exponentialreihe). *Sei das Restglied der Exponentialreihe fuer  $N \in \mathbb{N}$  definiert durch  $R_N(z) = \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ . Dann gilt fuer  $|z| \leq 1 + \frac{N}{2} = \frac{2+N}{2}$*

$$|R_N(z)| \leq 2 \frac{|z|^{N+1}}{(N+1)!}$$

*Beweis.* Sei  $|z| \leq 1 + \frac{N}{2}$  und  $M > N$  beliebig. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=N+1}^M \frac{|z|^k}{k!} &= \frac{|z|^{N+1}}{(N+1)!} \left( 1 + \underbrace{\frac{|z|}{N+2}}_{\leq \frac{1}{2}} + \dots + \underbrace{\frac{|z|^{M-N-1}}{(N+1) \dots M}}_{\leq (\frac{1}{2})^{M-N-1}} \right) \\ &\leq \frac{|z|^{N+1}}{(N+1)!} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^l \\ &= 2 \frac{|z|^{N+1}}{(N+1)!} \end{aligned}$$

Das liefert die Behauptung. □

**Bemerkung.** Bei festem  $z$  wird  $z/n$  beliebig klein (für  $n$  gross) und daher konvergiert  $R_N(z)$  schliesslich extrem schnell gegen 0 für  $N \rightarrow \infty$  (auch wenn es für die kleinen  $N$  nicht unbedingt so aussieht, siehe etwa  $z = 1000\dots$ ).

FOLGERUNG. Die Zahl  $e = \exp(1)$  ist irrational.

*Beweis.* Annahme:  $e = \frac{p}{q}$  mit  $p, q \in \mathbb{N}$ . Sei o. E.  $q \geq 2$ . Dann gilt also

$$\underbrace{q!e}_{\in \mathbb{Z}} = \underbrace{q! \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!}}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{\lim_{M \rightarrow \infty} \left( q! \sum_{k=q+1}^M \frac{1}{k!} \right)}_{=: R_q}$$

und damit

$$R_q \in \mathbb{Z}.$$

Weiterhin gilt aber

$$\begin{aligned} 0 < R_q &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{q+1} \left( 1 + \frac{1}{q+2} + \dots + \frac{1}{(q+2)\dots M} \right) \\ &\leq \frac{1}{q+1} \sum_{l=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2} \right)^l \\ &= \frac{2}{q+1} \\ &\leq \frac{2}{3} \\ &< 1 \end{aligned}$$

Damit gehört  $R_q$  zu  $\mathbb{Z}$  und erfüllt  $0 < R_q < 1$ . Das ist ein Widerspruch.  $\square$

←  
Ende der 3. Vorlesung.

Wir kommen nun zu einer weiteren Darstellung für  $\exp(z)$ :

THEOREM (Exponentialfunktion als Grenzwert). Für  $z \in \mathbb{C}$  gilt

$$\exp(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{z}{n} \right)^n$$

**Bemerkung.** Die Konvergenz ist sehr langsam. Daher ist die Formel für praktische Anwendungen nicht so nützlich wie die Exponentialreihe. Für konzeptuelle Fragen ist es aber eine sehr nützliche Formel (Wachstumsprozesse).

*Beweis.* Es gilt

$$\left( 1 + \frac{z}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} \frac{z^k}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)n^k k!} z^k.$$

Vergleicht man mit der Exponentialreihe  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ , so sieht man, dass es darum gehen wird den Abstand von  $\frac{n!}{(n-k)n^k}$  zu 1 untersuchen. Offenbar gilt

- $\frac{n!}{(n-k)n^k} \leq 1$  fuer alle  $k, n \in \mathbb{N}$  mit  $k \leq n$ .
- $\frac{n!}{(n-k)n^k} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$  (bei festem  $k \in \mathbb{N}$ ).

Das werden wir nun nutzen: Für  $n, N \in \mathbb{N}$  mit  $N < n$  gilt:

$$\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^N \frac{n!}{(n-k)n^k} \frac{z^k}{k!} + \sum_{k=N+1}^n \frac{n!}{(n-k)n^k} \frac{z^k}{k!}$$

sowie

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^N \frac{z^k}{k!} + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Damit folgt aus der Dreiecksungleichung

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n - \exp(z) \right| \leq \left| \sum_{k=0}^N \left( \frac{n!}{(n-k)n^k} - 1 \right) \frac{z^k}{k!} \right| + \left| \sum_{k=N+1}^n \frac{n!}{(n-k)n^k} \frac{z^k}{k!} \right| + \left| \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \right|.$$

Nochmaliges Anwenden der Dreiecksungleichung und Nutzen von  $\frac{n!}{(n-k)n^k} \leq 1$  liefert

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{n^k} \right| \leq \sum_{k=0}^N \left| \frac{n!}{(n-k)n^k} - 1 \right| \frac{|z|^k}{k!} + 2R_N(|z|).$$

Ist nun  $\varepsilon > 0$  gegeben, so koennen wir nun zunächst  $N$  so groß wahlen, dass  $2R_N(|z|) < \frac{\varepsilon}{2}$  gilt. Anschliessend wählen wir dann  $n_\varepsilon$  so groß, sodass der erste Term kleiner als  $\frac{\varepsilon}{2}$  wird fuer alle  $n \geq n_\varepsilon$ . Dann gilt fuer  $n \geq n_\varepsilon$  also

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n - \exp(z) \right| \leq \varepsilon$$

und die Behauptung folgt. □

**Bemerkung.** (Übung) Zu  $a > 0$  existiert genau eine stetige Funktion  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit

- $F(x + y) = F(x)F(y)$  alle  $x, y \in \mathbb{R}$
- $a = F(1)$

Diese ist gegeben durch  $F(x) = \exp_a(x)$  *Beweis. Existenz:*  $F(x) = \exp(x \ln a)$  erfuehlt offenbar die gewuenschten Eigenschaften.

*Eindeutigkeit - Skizze:* Zeige  $F$  erfuehlt notwendigerweise  $F(p/q) = a^{p/q}$ . Nutze dann die Stetigkeit von  $F$  und die Dichtigkeit von  $\mathbb{Q}$  in  $\mathbb{R}$ ... □

Die Exponentialfunktion auf  $\mathbb{R}$  liefert auch die sogenannten **hyperbolische Funktionen**. Das diskutieren wir nun.

$$\begin{aligned}
\text{cosinus hyperbolicus} & \quad \cosh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \\
\text{sinus hyperbolicus} & \quad \sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \\
\text{tangens hyperbolicus} & \quad \tanh : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), x \mapsto \frac{\sinh x}{\cosh x} \\
\text{cotangens hyperbolicus} & \quad \coth : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow (-\infty, 1) \cup (1, \infty), x \mapsto \frac{\cosh x}{\sinh x}
\end{aligned}$$

Es gilt:

$$\begin{aligned}
1 &= \cosh^2(x) - \sinh^2(x) \\
\cosh' &= \sinh, \quad \sinh' = \cosh \\
\tanh' &= \frac{1}{\cosh^2} = 1 - \tanh^2 \\
\coth' &= -\frac{1}{\sinh^2} = 1 - \coth^2
\end{aligned}$$

Auf entsprechenden Intervallen existieren auch die Umkehrfunktionen (auch Area-Funktionen genannt):

- $\operatorname{arcosh} : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto \ln(x\sqrt{x^2-1})$   
 $\operatorname{arcosh}'(y) = \frac{1}{\sinh x} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 x - 1}} = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}} \quad (y = \cosh x)$
- $\operatorname{arsinh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ .  
 $\operatorname{arsinh}'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}$
- $\operatorname{artanh} : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2} \ln(1+x)/(1-x)$ .  
 $\operatorname{artanh}'(y) = \frac{1}{1-y^2} \quad (y \in (-1, 1))$
- $\operatorname{arcoth} : (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x+1)/(x-1)$ .  
 $\operatorname{arcoth}'(y) = \frac{1}{1-y^2} \quad (y \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1])$

Wir untersuchen nun die Exponentialfunktion auf dem Einheitskreis

$$S = \{x \in \mathbb{C} : |z| = 1\} \tag{1}$$

Wir betrachten also:

$$u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, u(x) = e^{ix} \tag{2}$$

und definieren:

$$\Re u = \cos x \tag{3}$$

$$\Im u = \sin x \tag{4}$$

Wir werden zeigen, dass man  $e^{ix}$  erhält, indem man auf dem Einheitskreis gegen den Uhrzeigersinn die Strecke  $x$  entlang geht. **Zeichnung.**



Aus den Differenzierbarkeitseigenschaften der Exponentialfunktion folgt leicht, dass  $\cos$  und  $\sin$  differenzierbar sind mit

$$\cos' = -\sin, \quad \sin' = \cos.$$

Weiterhin folgt aus der Funktionsgleichung der Exponentialfunktion die Additionstheoreme für  $\sin$  und  $\cos$

$$\sin(u \pm v) = \sin u \cos v \pm \cos u \sin v$$

$$\cos(u \pm v) = \cos u \cos v \mp \sin u \sin v$$

(Bew. Bilde Real- bzw. Imaginarteil auf beiden Seiten von  $e^{i(u+v)} = e^{iu}e^{iv} \dots$ )

Wir sammeln nun einige weitere Eigenschaften von  $\sin$  und  $\cos$ .

LEMMA (Eigenschaften von  $\sin$  und  $\cos$ ). (a) Für alle  $t \in \mathbb{R}$  gilt:

$$\begin{aligned} \sin t &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \dots \\ \cos t &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \dots \end{aligned}$$

- (b) Es ist  $\sin$  ungerade, d. h.  $\sin(-t) = -\sin(t)$   
und  $\cos$  gerade, d. h.  $\cos(t) = \cos(-t)$
- (c) Es gilt  $\sin^2 t + \cos^2 t = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Beweis. (a) Das folgt aus der Reihendarstellung für  $\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$  und den Definitionen  $\sin t = \Im e^{it}$ ,  $\cos t = \Re e^{it}$

(b) Mit  $\overline{e^{ix}} = e^{-ix}$  folgt dies direkt aus den Definitionen von  $\sin$  und  $\cos$ . Alternativ kann es auch direkt aus (a) geschlossen werden.

(c) Es gilt

$$\sin^2 t + \cos^2 t = (i \sin t + \cos t)^2 = (e^{it})^2 = e^{it} \overline{e^{it}} = e^{it} e^{-it} = e^{it} e^{-it} = e^0 = 1.$$

□

PROPOSITION. (Abschätzung für  $\sin$  und  $\cos$ )

Für  $t \in \mathbb{R}$  gilt  $\cos t \leq 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!}$ .  
Für  $t > 0$  gilt  $\sin t \geq t - \frac{t^3}{3!}$ .

Beweis. Hier wird nur die Abschätzung für  $\cos$  bewiesen ( $\sin$  kann analog behandelt werden). Wir unterscheiden zwei Fälle:

$$\underline{|t| < 7}: \cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \underbrace{\left( \frac{t^6}{6!} + \frac{t^8}{8!} - \dots \right)}_{< 0} \leq 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!}$$

$$\underline{|t| \geq 7}: 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} = 1 + t^2 \left( \frac{t^2}{24} - \frac{1}{2} \right) \geq 1 \geq \cos t$$

□

PROPOSITION (Analytische Beschreibung von  $\pi$ ). Die Funktion  $\sin$  erfüllt  $\sin 0 = 0$  und ist strikt positiv auf  $(0, 2]$ . Die Funktion  $\cos$  erfüllt  $\cos 0 = 1$  und  $\cos(2) < 0$  und ist auf  $[0, 2]$  strikt fallend. Insbesondere hat  $\cos$  in  $(0, 2)$  genau eine Nullstelle und in dieser Nullstelle nimmt  $\sin$  den Wert 1 an.

**Bemerkung. Zeichnung** zeigt, dass die Aussage der Proposition sofort folgt, wenn wir schon wuessten, dass  $e^{ix}$  am Einheitskreis durch Bewegung gegen den Uhrzeigersinn der Laenge  $x$  entsteht.

*Beweis.* Aussagen zu  $\sin$ . Es gilt  $\sin 0 = \Im e^{i0} = \Im 1 = 0$  sowie nach dem vorigen Proposition (fuer  $0 \leq t \leq 2$

$$\sin t \geq t - \frac{t^3}{3!} = t \left( 1 - \underbrace{\frac{t^2}{3!}}_{<1} \right) > 0.$$

Aussagen zu  $\cos$ : Es gilt  $\cos 0 = 1$  da  $1 = e^{i0} = \cos 0 + i \sin 0$ . Weiterhin ist  $\cos$  wegen  $\cos' = -\sin$  und dem schon gezeigten  $\sin > 0$  also strikt fallend auf  $(0, 2]$  (Mittelwertsatz). Außerdem gilt nach der vorigen Proposition

$$\cos 2 \leq 1 - \frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{24} = 1 - 2 + \frac{16}{24} = -1/3 < 0.$$

Nach dem Zwischenwertsatz hat also  $\cos$  auf  $(0, 2)$  eine Nullstelle. Da  $\cos$  strikt fallend ist, ist diese Nullstelle eindeutig.  $\square$

DEFINITION (Analytische 'Definition' von  $\pi$ ). Sei  $\pi \in \mathbb{R}$  so, dass  $\frac{\pi}{2}$  die eindeutige Nullstelle von  $\cos$  in  $(0, 2)$  ist.

THEOREM (Exponentialfunktion auf dem Einheitskreis). Die Abbildung

$$e^i : \mathbb{R} \longrightarrow S, x \mapsto e^{ix},$$

erfüllt  $e^{i(x+y)} = e^{ix} e^{iy}$  sowie

$$e^{i0} = 1, e^{i\frac{\pi}{2}} = i, e^{i\pi} = -1, e^{i\frac{3}{2}\pi} = -i, e^{i2\pi} = 1.$$

Insbesondere ist die Abbildung also  $2\pi$  periodisch d.h. es gilt  $e^{i(x+2\pi)} = e^{ix}$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ . Schliesslich ist die Einschränkung der Abbildung auf  $[0, 2\pi)$  bijektiv (auf  $S$ ).

**Zeichnung.** Bilder von  $(e^{i\frac{\pi}{2}})^k$ . Zerlege  $[0, 2\pi)$  entsprechend in vier Intervalle, zeichne deren Bild am Einheitskreis.

*Beweis.* Die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion liefert

$$(*) e^{i(x+y)} = e^{ix} e^{iy}.$$

Nach Konstruktion gilt  $e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = i$ . Damit folgt fuer  $k \in \mathbb{N}$  also aus (\*)

$$e^{ik\frac{\pi}{2}} = (e^{i\frac{\pi}{2}})^k = (i)^k.$$

Das liefert die entsprechenden Aussagen. Die Periodizitaet folgt dann aus (\*) wegen

$$e^{i(x+2\pi)} = e^{ix} e^{i2\pi} = e^{ix} 1 = e^{ix}.$$

Es bleibt die Bijektivitaet zu zeigen. Nach dem schon gezeigten (\*) reicht es, die Bijektivitaet der Abbildung

$$e^{i\cdot} : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow S \cap \{u + iv : u, v \geq 0\}$$

zu zeigen. Dazu zeigen wir zunaechst, dass  $\cos : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [0, 1]$  bijektiv ist:

Bew: Nach voriger Proposition und Definition ist  $\cos : [0, \frac{\pi}{2}]$  strikt fallend mit  $\cos(0) = 1$  und  $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ . Damit ist  $\cos : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$  injektiv (da strikt fallend) und sein Bild ist nach dem Zwischenwertsatz  $[0, 1]$ .

*Injektivitaet von  $e^{i\cdot}$  auf  $[0, \frac{\pi}{2}]$ :* Das folgt sofort, da  $\cos t = \Re e^{it}$  injektiv ist.

*Surjektivitaet von  $e^{i\cdot}$  auf  $[0, \frac{\pi}{2}]$ :* Sei  $a, b \geq 0$  mit  $a^2 + b^2 = 1$  gegeben. Dann existiert nach dem schon Bewiesenen ein  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$  mit  $a = \cos t$ . Dann gilt:  $b^2 = 1 - a^2 = 1 - \cos^2 t = \sin^2 t \stackrel{b \geq 0, \sin t \geq 0}{\Rightarrow} b = \sin t \Rightarrow a + ib = \cos t + i \sin t = e^{it}$  Wegen  $e^{i(t+s)} = e^{it} e^{is}$  folgen nun die Aussagen für die übrigen drei Quadranten einfach. □

←  
Ende der 4. Vorlesung

**Bemerkung.** Die Länge des Bogens auf  $S$  zwischen 1 und  $e^{it}$  ist gerade  $t$ . Zum Beweis betrachten wir den Polygonzug von 1 nach  $e^{it}$  mit Stützstellen  $e^{i\frac{t}{n}k}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$  **Zeichnung.** Seine Länge ist gegeben durch

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{i\frac{t}{n}(k+1)} - e^{i\frac{t}{n}k} \right| &= \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{\left| e^{i\frac{t}{n}k} \right|}_{=1} \left| e^{i\frac{t}{n}} - 1 \right| = \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{i\frac{t}{n}} - 1 \right| \\ &= n \left| e^{i\frac{t}{n}} - 1 \right| = \frac{\left| e^{i\frac{t}{n}} - 1 \right|}{\frac{1}{n}} = t \left| \frac{e^{i\frac{t}{n}} - 1}{i\frac{t}{n}} \right|. \end{aligned}$$

Verfeinert man diesen Polygonzug d.h. bildet man den Grenzwert  $n \rightarrow \infty$ , so erhaelt man die sogenannte Bogenlaenge. Diese ist dann also gegeben durch

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} t \underbrace{\left| \frac{e^{i\frac{t}{n}} - 1}{i\frac{t}{n}} \right|}_{\rightarrow 1, n \rightarrow \infty} = t.$$

(Hier nutzen wir  $\frac{e^z - 1}{z} \rightarrow 1, z \rightarrow 0$ .)

FOLGERUNG (Periodizität von  $\sin$  und  $\cos$ ). Die Funktionen  $\sin$  und  $\cos$  sind  $2\pi$ -periodisch und es gilt

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ mit } k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \text{ mit } k \in \mathbb{Z}$$

*Beweis.* Argumentation am Einheitskreis □

Mittels des vorigen Theorems können wir die sogenannte Polarzerlegung einführen. Polarzerlegung:

THEOREM (Polarzerlegung). Zu jedem  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  existieren eindeutige  $\rho > 0$  und  $\phi \in [0, 2\pi)$  mit  $z = \rho e^{i\phi}$ .

*Beweis. Existenz:*  $z = |z| \underbrace{\frac{z}{|z|}}_{\in S}$  Dann existiert  $\phi \in [0, 2\pi)$  mit  $e^{i\phi} = \frac{z}{|z|}$ .

Mit diesem  $\phi$  und  $\rho = |z|$  folgt dann  $z = \rho e^{i\phi}$ .

*Eindeutigkeit:* Es gelte  $z = \rho e^{i\phi}$ . Dann folgt  $|z| = \rho |e^{i\phi}| = \rho$ . Damit ist also  $\rho$  eindeutig bestimmt. Sei nun  $e^{i\phi} = e^{i\psi}$ . Dann gilt also

$$1 = e^{i(\phi-\psi)}$$

und damit

$$\phi - \psi = k2\pi$$

mit  $k \in \mathbb{Z}$ . Wegen  $\phi, \psi \in [0, 2\pi)$  folgt  $\phi = \psi$ . □

DEFINITION. Ist  $z = \rho e^{i\phi}$  mit  $\rho > 0$  und  $\phi \in \mathbb{R}$ , so nennt man  $\rho$  den Betrag von  $z$ , und  $\phi$  das Argument von  $z$ .

**Bemerkung** Es gilt  $z_1 z_2 = \rho_1 e^{i\phi_1} \rho_2 e^{i\phi_2} = \rho_1 \rho_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}$  Der Betrag des Produkts ist damit gleich dem Produkt der Beträge und das Argument des Produktes ist die Summe der Argumente.

Damit können wir nun eine ganze Reihe weiterer Funktionen einführen. Das diskutieren wir nun.

**Tangens und Arcustangens.** Für  $x$  mit  $\cos x \neq 0$ , d. h.  $x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$  definiert man  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ . Dann ist  $\tan x$   $\pi$ -periodisch und stetig differenzierbar (Quotientenregel anwenden) mit:

$$\tan'(x) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x > 0$$

Wegen  $\tan' > 0$  existiert die Umkehrfunktion

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Es ist  $\arctan$  stetig differenzierbar mit

$$\arctan'(y) = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + y^2} \quad (y = \tan x)$$

**Cotangens und Arcuscotangens.** Für  $x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$  definiert man den Cotangens durch

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Dann ist  $\cot$   $\pi$ -periodisch und stetig differenzierbar mit

$$\cot' x = -1 - \cot^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x} < 0$$

Insbesondere ist  $\cot$  strikt fallend und es existiert die Umkehrfunktion

$$\operatorname{arccot} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$$

Es ist  $\operatorname{arccot}$  stetig differenzierbar mit

$$\operatorname{arccot}'(y) = \frac{1}{-1 - \cot^2 x} = \frac{1}{-1 - y^2} = -\frac{1}{1 + y^2} \quad (y = \cot x)$$

## Metrische Räume und topologische Grundbegriffe

Bisher haben wir Analysis (Grenzwert, Konvergenz, Stetigkeit, Differenzierbarkeit) auf  $\mathbb{R}$  betrieben. Tatsächlich interessiert man sich oft für allgemeinere Situationen. Dabei geht es dann zum Beispiel um (Teil-)mengen) von

- $\mathbb{R}^N = \{(\xi_1, \dots, \xi_N) : \xi_j \in \mathbb{R}\} = \{x : \{1, \dots, N\} \longrightarrow \mathbb{R}\}$  bzw.  
 $\mathbb{C}^N = \{(\xi_1, \dots, \xi_N) : \xi_j \in \mathbb{C}\} = \{x : \{1, \dots, N\} \longrightarrow \mathbb{C}\}$
- $M^{N \times N} = N \times N$ -Matrizen über  $\mathbb{R}$  bzw  $\mathbb{C}$ .
- $\ell^2 = \{x : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C} : \sum |x_j|^2 < \infty\}$ .

Will man auf diesen Mengen Grenzwerte zu untersuchen / Analysis betreiben, so erweist sich das Konzept der Metrik als grundlegend.

### 1. Metrische Räume

In diesem Abschnitt geht es um Metrik. Das Konzept der Metrik gibt einen quantitativen Abstandsbegriff. Mit diesem Abstandsbegriff kann dann Konvergenz und damit Stetigkeit gefaßt werden.

Der Abstand zwischen zwei Punkten sollte folgende Eigenschaften haben: **Zeichnung**.

- Abstand zwischen Punkten haengt nicht von der Reihenfolge der Punkte ab,
- Abstand erfuehlt Dreiecksungleichung
- Verschiedene Punkte haben positiven Abstand.

Eine praezise Fassung gibt folgende Definition.

**DEFINITION.** Sei  $X$  eine Menge. Eine Metrik auf  $X$  ist eine Abbildung  $d : X \times X \longrightarrow [0, \infty)$  fuer die gilt:

- (M1)  $d(x, y) = d(y, x)$  fuer alle  $x, y \in X$  (Symmetrie)
- (M2)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  fuer alle  $x, y, z \in X$ . (Dreiecksungleichung)
- (M3)  $d(x, y) = 0$  genau dann wenn  $x = y$  (Nichtausgeartet)

Ein Paar  $(X, d)$  bestehend aus einer Menge  $X$  und einer Metrik  $d$  auf  $X$  heisst metrischer Raum.

**Beispiel.** Ist  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $Y$  eine Teilmenge von  $X$ , so ist auch  $(Y, d)$  ein metrischer Raum.

**Beispiele.**

- Auf  $\mathbb{R}$  definiert  $d(x, y) = |x - y|$  eine Metrik. Ähnlich definiert auf  $\mathbb{C}$  dann  $d(v, w) = |v - w|$  eine Metrik.
- Auf  $\mathbb{Z}^N$  ist die Manhattan Metrik / Blockmetrik gegeben durch

$$d(x, y) = \sum_{j=1}^N |x_j - y_j|.$$

(Zeichnung mit Bloecken)

- Auf  $\mathbb{R}^N$  (bzw.  $\mathbb{C}^N$ ) ist die  $\ell^1$  Metrik gegeben durch

$$d_1(x, y) = \sum_{j=1}^n |x_j - y_j|.$$

(Das verallgemeinert die Manhattan Metrik.)

- Auf  $\mathbb{R}^N$  (bzw.  $\mathbb{C}^N$ ) ist die  $\ell^\infty$  Metrik gegeben durch

$$d_\infty = \max\{|x_j - y_j| : j = 1, \dots, N\}.$$

- Auf der endlichen Menge  $\mathcal{A}$  (Alphabet) wird durch

$$d_D(a, b) := 1 - \delta_{a,b}$$

eine Metrik gegeben.

Auf beliebigem  $X$  ist die diskrete Metrik gegeben durch

$$d_D(x, y) := 1 \quad \text{falls } x \neq y, \quad d_D(x, y) = 0 \quad \text{falls } x = y.$$

- Sei  $\mathcal{A}$  eine endliche Menge (Alphabet). Sei

$$\mathcal{W} : \mathcal{W}_{\mathcal{A}} = \{x : \mathbb{N} \longrightarrow \mathcal{A}\} = \{\text{Folgen mit Werten in } \mathcal{A}\}.$$

- Ist  $\mathcal{A}$  das uebliche Aphabet mit Satzzeichen, so handelt es sich bei  $\mathcal{W}$  um die Menge aller 'Bücher'.

- Ist  $\mathcal{A} = \{U, C, A, G\}$ , so handelt es sich bei  $\mathcal{W}$  um die Menge aller (unendlichen) Gensequenzen.

- Ist  $\mathcal{A} = \{0, 1\}$ , so handelt es sich bei  $\mathcal{W}$  um die Menge aller (unendlichen) Computerprogramme.

Es definiert

$$d(v, w) := \sum_{j=1}^{\infty} \delta_{v_j, w_j} \frac{1}{2^j}$$

eine Metrik auf  $\mathcal{W}$ . Damit kann man dann den Abstand zwischen zwei Genen oder zwischen zwei Büchern ;-)) berechnen.

PROPOSITION. (Umgekehrte Dreiecksungleichung) Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Dann gilt

$$|d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z)$$

fuer alle  $x, y, z \in X$ .

← Ende der 5. Vorlesung. →

*Beweis.* Es gilt

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

sowie nach Vertauschen von  $y$  und  $z$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Damit folgt die Aussage.  $\square$

Auf Vektorräumen werden Metriken meist von Normen induziert. Eine Norm liefert ein Konzept von Länge eines Vektors. Normen stellen also eine Verallgemeinerung der Betragsfunktion auf mehrdimensionale Situationen dar. Der Abstand zwischen zwei Vektoren ist dann die Länge ihrer Differenz. **Zeichnung.**

**DEFINITION.** Sei  $V$  ein Vektorraum über dem Körper  $K = \mathbb{R}$  oder  $K = \mathbb{C}$ . Eine Abbildung  $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$  heißt Norm, wenn gilt

- (N1)  $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$  fuer alle  $\alpha \in K$  und  $x \in V$ .
- (N2)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  fuer alle  $x, y \in V$ .
- (N3)  $\|x\| = 0$  genau dann, wenn  $x = 0$ .

**PROPOSITION.** (Umgekehrte Dreiecksungleichung) Ist  $\|\cdot\|$  eine Norm auf  $V$ , so gilt die umgekehrte Dreiecksungleichung

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

*Beweis.* Nach Dreiecksungleichung gilt

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

und nach Vertauschen von  $x$  und  $y$  ebenso

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\|.$$

Damit folgt die Aussage leicht.  $\square$

**DEFINITION.** Sei  $V$  ein Vektorraum mit Norm  $\|\cdot\|$ . Dann heißt

$$d_{\|\cdot\|} : V \times V \rightarrow [0, \infty), (v, w) \mapsto d_{\|\cdot\|}(v, w) := \|v - w\|$$

die durch  $\|\cdot\|$  induzierte Metrik.

**Beispiele.**

- Auf  $V = \mathbb{R}$  bzw.  $V = \mathbb{C}$  wird durch  $|\cdot|$  eine Norm gegeben.
- Auf  $V = \mathbb{R}^N$  (bzw.  $V = \mathbb{C}^N$ ) wird durch  $\|x\|_1 := \sum_{j=1}^N |x_j|$  eine Norm, die sogenannte  $\ell^1$ -Norm definiert. Die induzierte Metrik ist die  $\ell^1$  Metrik.
- Auf  $V = \mathbb{R}^N$  (bzw.  $V = \mathbb{C}^N$ ) wird durch  $\|x\|_\infty := \max\{|x_j| : j = 1, \dots, N\}$  eine Norm definiert, die sogenannte  $\ell^\infty$ -Norm. Die induzierte Metrik ist die  $\ell^\infty$  Metrik.

Jedes Skalarprodukt liefert eine Norm (und damit eine Metrik).



PROPOSITION. Sei  $V$  ein Vektorraum über  $K = \mathbb{R}$  oder  $K = \mathbb{C}$ . Sei  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow K$  ein Skalarprodukt. Dann ist

$$\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty), \|x\| := \langle x, x \rangle^{1/2}$$

eine Norm.

*Beweis.* Wir zeigen die Dreiecksungleichung. Die übrigen Aussagen folgen einfach. Es gilt nach Cauchy Schwarz Ungleichung:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**Beispiel - bekannteste Metrik und Norm.** Die euklidische Metrik auf  $\mathbb{R}^N$  bzw.  $\mathbb{C}^N$  ist gegeben durch

$$d_2(x, y) = \left( \sum_{j=1}^N |x_j - y_j|^2 \right)^{1/2}.$$

Sie wird durch das Standardskalarprodukt

$$\langle x, y \rangle := \sum_{j=1}^N x_j \overline{y_j}$$

bzw. die dazugehörige Norm

$$\|x\|_2 := \left( \sum_{j=1}^N |x_j|^2 \right)^{1/2}$$

induziert.

**Beispiel - Der Vektorraum  $\ell^2$ .** Wir betrachten die Menge

$$\ell^2 = \{x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C} : \sum |x(j)|^2 < \infty\}.$$

Dann ist  $\ell^2$  ein Untervektorraum des Raumes aller komplexwertigen Funktionen auf  $\mathbb{N}$ . Für beliebige  $x, y \in \ell^2$  ist

$$\sum_{j=1}^{\infty} x(j) \overline{y(j)}$$

absolut konvergent und durch

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \ell^2 \rightarrow \mathbb{C}, \langle f, g \rangle := \sum_{j=1}^{\infty} f(j) \overline{g(j)}$$

wird ein Skalarprodukt auf  $\ell^2$  definiert.

Wir zeigen zunächst, dass es sich um einen Unterraum handelt: Sei  $x, y \in \ell^2$  und  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Dann gilt

- $\alpha x \in \ell^2$ : klar.
- $x + y \in \ell^2$ : Es gilt

$$|x(j) + y(j)|^2 \leq 2|x(j)|^2 + 2|y(j)|^2.$$

Damit folgt die Aussage sofort.

Wir zeigen nun, dass die Summe absolut konvergiert: Es gilt

$$|x(j)\overline{y(j)}| \leq \frac{1}{2}(|x(j)|^2 + |y(j)|^2).$$

Damit folgt die Aussage.

Nun folgt leicht, dass  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  ein Skalarprodukt ist.

Ein nuetzliches Konzept zur weiteren Untersuchung (und zur Visualisierung von Konvergenz) sind Kugeln und Umgebungen bzw. offene Mengen.

**DEFINITION.** (*Kugel*) Sei  $(X, d)$  metrischer Raum und  $x \in X$ . Dann heisst fuer  $r \geq 0$

$B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$  abgeschlossene Kugel um  $x$  mit Radius  $r$

$U_r(x) := \{y \in X : d(x, y) < r\}$  offene Kugel um  $x$  mit Radius  $r$ .

**Beispiele.**

- Sei  $\mathbb{R}$  mit der Metrik  $d(x, y) = |x - y|$  versehen. Dann ist  $x \in \mathbb{R}$  und  $r > 0$  die Kugel  $U_r(x) = (x - r, x + r)$ . Entsprechend ist  $B_r(x) = [x - r, x + r]$ . **Zeichnung.**
- Sei  $\mathbb{C}$  mit der Metrik  $d(x, y) = |x - y|$  versehen. Dann ist fuer  $x \in \mathbb{C}$  und  $r > 0$  die Kugel  $U_r(x)$  gegeben durch den (offenen) Kreis um  $x$  mit Radius  $r$ . Entsprechend ist  $B_r(x)$  der volle Kreis um  $x$  mit Radius  $r$ . **Zeichnung.**
- Sei  $X = \mathbb{R}^2$  mit der Euklidischen Metrik  $d_2$  versehen. Dann ist fuer  $x = 0$  und  $r > 0$  die Kugel  $U_r(x)$  ( $B_r(x)$ ) gegeben durch den offenen (vollen) Kreis um 0 mit Radius  $r$ .
- Sei  $X = \mathbb{R}^2$  mit  $d = d_\infty$ . Dann ist fuer  $x = 0$  und  $r > 0$  die offenen Kugel  $U_r(x)$  gegeben durch...
- Sei  $X = \mathbb{R}^2$  mit  $d = d_1$ . Dann ist fuer  $x = 0$  und  $r > 0$  die offenen Kugel  $U_r(x)$  gegeben durch...
- Sei  $X$  eine beliebige Menge und  $d = d_D$ . Dann ist fuer  $r = 1/2$  die offene Kugel...

Metriken erlauben es, den Begriff der Konvergenz von Folgen zu definieren.

**DEFINITION.** (*Konvergenz im metrischen Raum*) Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Eine Folge  $(x_n)$  in  $X$  heisst konvergent gegen  $x \in X$ , wenn gilt

$$d(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Wir schreiben dann  $x_n \rightarrow x$  oder  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  und nennen  $x$  Grenzwert der Folge  $(x_n)$ .

**Bemerkung.** Grenzwert einer Folge ist eindeutig. ( $x_n \rightarrow x$ ,  $x_n \rightarrow y$  impliziert  $d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) \rightarrow 0 \dots$ ).

**LEMMA.** Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $(x_n)$  eine Folge in  $X$  und  $x \in X$ . Dann gilt  $x_n \rightarrow x$  genau dann, wenn es zu jeder offenen nichtleeren Kugel  $K$  um  $x$  ein  $n_K \in \mathbb{N}$  gibt mit  $x_n \in K$  fuer alle  $n \geq n_K$ .

*Beweis.* Eine offene nichtleere Kugel um  $x$  hat die Form  $K = U_r(x)$  mit  $r > 0$ . Damit folgt die Aussage sofort.  $\square$

**FOLGERUNG.** (*Stetigkeit von Metrik und Norm*)

- Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Gilt  $x_n \rightarrow x$  und  $y_n \rightarrow y$ , so folgt  $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$ .
- Sei  $V$  ein Vektorraum mit Norm  $\|\cdot\|$  und zugehöriger Metrik  $d \dots$ . Gilt  $x_n \rightarrow x$  so folgt  $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ .

*Beweis.* Das folgt jeweils aus der umgekehrten Dreiecksungleichung:  
Zum ersten Punkt:

$$\begin{aligned} |d(x_n, y_n) - d(x, y)| &= |d(x_n, y_n) - d(x_n, y) + d(x_n, y) - d(x, y)| \\ &\leq |d(x_n, y_n) - d(x_n, y)| + |d(x_n, y) - d(x, y)| \\ \text{(Umgek. } \Delta\text{-Ugl)} &\leq d(y_n, y) + d(x_n, x). \end{aligned}$$

Zum zweiten Punkt: Nach der umgekehrten Dreiecksungleichung gilt

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\|.$$

Damit folgt die Aussage sofort.  $\square$

Wir untersuchen nun Konvergenz in den oben gegebenen Beispielen.  
**Beispiele.**

**Konvergenz in  $\mathcal{A}$ .** Sei  $\mathcal{A}$  eine beliebige Menge mit der diskreten Metrik  $d_D$ . Dann gilt  $x_n \rightarrow x$  genau dann, wenn ein  $N$  existiert mit  $x_n = x$  fuer alle  $n \geq N$ .

**Konvergenz in  $\mathcal{W}_{\mathcal{A}}$ :** Sei  $\mathcal{W}_{\mathcal{A}}$  wie oben mit der Metrik

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_D(x(k), y(k))}{2^k}.$$

Dann gilt  $x_n \rightarrow x$  genau dann, wenn fuer jedes  $k \in \mathbb{N}$  gilt  $x_n(k) \rightarrow x(k)$  bzgl.  $d_D$  auf  $\mathcal{A}$  (d.h. wenn fuer jedes  $k \in \mathbb{N}$  schliesslich  $x_n(k) = x(k)$  gilt).

Bew.  $\implies$ : Sei  $k \in \mathbb{N}$  beliebig. Offenbar gilt

$$d_D(x_n(k), x(k)) \leq 2^k d(x_n(k), x(k)).$$

Damit folgt die Aussage sofort.

$\impliedby$ : Betrachte  $L \in \mathbb{N}$  beliebig. Dann gibt es ein  $n_L$  mit  $x_n(k) = x(k)$  fuer alle  $k = 1, \dots, L$ , falls  $n \geq n_L$ . Damit gilt dann fuer solche  $n$

$$d(x_n, x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_D(x_n(k), x(k))}{2^k} = \sum_{k=L+1}^{\infty} \frac{d_D(x_n(k), x(k))}{2^k} \leq \sum_{k=L+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^L}.$$

Da  $L$  beliebig war, folgt die gewuenschte Konvergenz.

←  
Ende der 6. Vorlesung

**Konvergenz in  $\mathbb{R}^N$  bzw.  $\mathbb{C}^N$ .** Sei  $x^{(n)} = (\xi_1^{(n)}, \dots, \xi_N^{(n)})$  eine Folge in  $\mathbb{R}^N$  und  $x = (\xi_1, \dots, \xi_N) \in \mathbb{R}^N$ . Dann gilt:

$$x^{(n)} \xrightarrow{d_1} x \iff \xi_j^{(n)} \rightarrow \xi_j \text{ f\u00fcr jedes } j = 1, \dots, N. \text{ (Bew: \dots)}$$

$$x^{(n)} \xrightarrow{d_\infty} x \iff \xi_j^{(n)} \rightarrow \xi_j \text{ f\u00fcr jedes } j = 1, \dots, N. \text{ (Bew: \dots)}$$

$$x^{(n)} \xrightarrow{d_2} x \iff \xi_j^{(n)} \rightarrow \xi_j \text{ f\u00fcr jedes } j = 1, \dots, N. \text{ (Bew: \dots)}$$

Das ist kein Zufall. Es gilt vielmehr folgender bemerkenswerter Satz.

**THEOREM.** (*Äquivalenz aller Normen im  $\mathbb{R}^N$  bzw.  $\mathbb{C}^N$* ) Ist  $\|\cdot\| : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, \infty)$  eine Norm, so gibt es  $c, C \geq 0$  mit

$$\|x\| \leq C\|x\|_1 \text{ und } \|x\|_1 \leq c\|x\|$$

fuer alle  $x \in \mathbb{R}^N$ . Entsprechendes gilt in  $\mathbb{C}^N$ .

*Beweis.* Wir zeigen zunächst die erste Ungleichung: Sei  $(e_j)$  die Standardbasis im  $\mathbb{R}^N$ . Dann gilt also

$$x = (\xi_1, \dots, \xi_N) \sum_{j=1}^N \xi_j e_j.$$

Dann folgt

$$\|x\| = \left\| \sum_{j=1}^N \xi_j e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^N |\xi_j| \|e_j\| \leq C \sum_{j=1}^N |\xi_j| = C\|x\|_1$$

mit

$$C := \max\{\|e_j\| : j = 1, \dots, N\}.$$

Wir zeigen nun die zweite Ungleichung. Wir nehmen an, dass sie nicht gilt. Dann existiert also zu jedem  $n \in \mathbb{N}$  ein  $x_n$  mit

$$\|x_n\|_1 > n\|x_n\|.$$

Ohne Einschränkung gelte  $\|x_n\|_1 = 1$  fuer alle  $n \in \mathbb{N}$ . Dann folgt also

$$\|x_n\| \leq \frac{1}{n}.$$

Damit folgt sofort

$$x_n \rightarrow 0 \text{ bzgl. } \|\cdot\|.$$

Weiterhin sind wegen

$$1 = \|x_n\|_1 = \sum_{j=1}^N \|\xi_j^{(n)}\|$$

die Folgen  $(\xi_j^{(n)})_n$  fuer jedes  $j \in \{1, \dots, N\}$  beschaenkt. Daher koennen wir nach Bolzano Weierstrass ohne Einschr aenkung annehmen, dass  $x_n$  bzgl.  $\|\cdot\|_1$  konvergiert gegen ein  $x = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ . (Genauer:  $(\xi_1^{(n)})_n$  beschr ankt, also gibt es nach BW eine konvergente Teilfolge. Ohne Einschr aenkung sei die Folge  $(\xi_1^{(n)})_n$  selber konvergent. Betrachte nun  $(\xi_2^{(n)})_n$ . Diese Folge ist beschr ankt. Also gibt es nach nach BW eine konvergente Teilfolge. Ohne Einschr aenkung sei die Folge  $(\xi_2^{(n)})_n$  selber konvergent....) Dann gilt

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^N \|\xi_j\| = \lim \|x_n\|_1 = 1.$$

Insbesondere gilt  $x \neq 0$ . Weiterhin folgt aus  $x_n \rightarrow x$  bzgl.  $\|\cdot\|_1$  und der schon bewiesenen Ungleichung  $\|\cdot\| \leq C\|\cdot\|_1$  auch  $x_n \rightarrow x$  bzgl.  $\|\cdot\|$ . Damit folgt wegen  $x \neq 0$  sofort

$$\|x_n\| \rightarrow \|x\| \neq 0.$$

Das ist ein Widerspruch zu  $\|x_n\| \leq \frac{1}{n}$ . □

Wir kommen nun noch zu einem fundamentalen Konzept, das spaeter von grosser Bedeutung sein wird.

**DEFINITION.** (*Cauchy Folge*) Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Eine Folge  $(x_n)$  in  $X$  heisst *Cauchy-Folge*, wenn zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $n_\varepsilon > 0$  existiert mit

$$d(x_n, x_m) \leq \varepsilon$$

fuer alle  $n, m \geq n_\varepsilon$ . Ein metrischer Raum heisst *vollstaendig*, wenn jede Cauchy Folge konvergiert.

**PROPOSITION.** Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Dann ist jede konvergente Folge eine Cauchy-Folge.

*Beweis.* Sei die Folge  $(x_n)$  in  $X$  konvergent gegen  $x$ . Es gilt

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m).$$

Damit folgt die Aussage leicht. □

**DEFINITION.** (*Vollstaendigkeit*) Ein metrischer Raum heisst *vollstaendig*, wenn jede Cauchy Folge in ihm konvergiert.

**Bemerkung.** Vollstaendigkeit h angt von der Metrik ab und nicht nur von der Topologie (siehe Uebung).

**Beispiel - vollst andiger R aume.**

- Die Raum  $\mathbb{R}$  mit der (euklidischen Metrik)  $d(x, y) = |x - y|$  ist vollständig. Bew. Analysis I.
- Die Raum  $\mathbb{C}$  mit der (euklidischen Metrik)  $d(x, y) = |x - y|$  ist vollständig. Bew. Analysis I.
- Der Raum  $\mathbb{R}^N$  mit der Euklidischen Metrik ist vollstaendig. Bew: Sei  $(x_n)$  eine Cauchy Folge bzgl.  $d_2$  und  $x_n = (\xi_1^{(n)}, \dots, \xi_N^{(n)})$ . Wegen

$$|\xi_j^{(n)} - \xi_j^{(m)}| \leq \left( \sum_{k=1}^N |\xi_k^{(n)} - \xi_k^{(m)}|^2 \right)^{1/2} = d_2(x_n, x_m)$$

ist dann  $(\xi_j^{(n)})$  eine Cauchy Folge in  $\mathbb{R}$  fuer jedes  $j = 1, \dots, N$ . Damit existiert also nach dem im ersten Beispiel diskutieren fuer jedes  $j = 1, \dots, N$  ein  $\xi_j \in \mathbb{R}$  mit  $\xi_j^{(n)} \rightarrow \xi_j \in \mathbb{R}$  d.h.

$$|\xi_j^{(n)} - \xi_j| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Fuer  $x = (\xi_1, \dots, \xi_N)$  gilt dann also

$$d_2(x_n, x) = \left( \sum_{k=1}^N |\xi_k^{(n)} - \xi_k|^2 \right)^{1/2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Damit konvergiert also  $(x_n)$  gegen  $x$ .

**Wichtig.** Tatsächlich haben auf dem  $\mathbb{R}^N$  aufgrund des Satzes von der Aequivalenz aller Normen alle von Normen induzierten Metriken dieselben Cauchy-Folgen und dieselben konvergenten Folgen. Insbesondere ist also der Raum  $\mathbb{R}^N$  mit jeder von einer Norm induzierten Metrik vollstaendig.

- Der Raum  $\mathbb{C}^N$  mit der Euklidischen Metrik ist vollständig. Bew. Wie fuer  $\mathbb{R}^N$ .
- Der Raum  $M^{N \times N}$  der  $N \times N$  Matrizen ueber  $\mathbb{R}$  (ueber  $\mathbb{C}$ ) ist vollstaendig bzgl. der durch die Norm (!)

$$\|A\| := \sup\{\|Ax\|_2 : \|x\|_2 \leq 1\}$$

induzierten Metrik.

Bew. Es handelt sich um den Vektorraum  $\mathbb{R}^{N^2}$  auf dem alle Normen aequivalent sind. Es reicht also zu zeigen, dass  $\|\cdot\|$  eine Norm ist. Das folgt aus den Betrachtungen der Übung.

- Sei  $X$  eine beliebige Menge und  $d_D$  die diskrete Metrik auf  $X$ . Dann ist  $(X, d_D)$  vollstaendig.

Bew. Sei  $(x_n)$  eine Cauchy Folge. Dann gilt fuer alle genuegend grossen  $n$  und  $m$   $d_D(x_n, x_m) \leq 1/2$ . Damit gilt fuer alle genuegend grossen  $n$  und  $m$  also  $x_n = x_m$ . Es gibt also ein  $x \in X$  mit  $x_n = x$  fuer alle genuegend grossen  $n$ . Damit folgt die Konvergenz von  $(x_n)$  gegen  $x$ .

- Sei  $\mathcal{A}$  endlich und  $\mathcal{W}$  der Raum der Wöerer ueber  $\mathcal{A}$  mit der Metrik  $d(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{d_D(x(j), y(j))}{2^j}$ . Dann ist  $\mathcal{W}$  vollstaendig.

Bew. Sei  $(x_n)$  eine Cauchy-Folge. Wegen

$$d_D(x_n(j), x_m(j)) \leq 2^j d(x_n, x_m)$$

ist dann  $(x_n(j))_n$  fuer jedes feste  $j \in \mathbb{N}$  eine Cauchy-Folge bzgl.  $d_D$ . Also existiert nach dem schon bewiesenen zu jedem  $j \in \mathbb{N}$  ein  $x_j$  mit

$$x_n(j) \rightarrow x_j.$$

Dann gilt also  $x_n \rightarrow x$  fuer  $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}, j \mapsto x_j$ .

- $\ell^2$  ist vollstaendig. Bew. Nicht hier.

### Beispiele - unvollständiger Räume

- Das Interval  $(0, 1)$  mit der Euklidischen Metrik ist nicht vollstaendig. (Uebung: Finden Sie eine Metrik auf  $(0, 1)$ , so dass  $(0, 1)$  vollstaendig ist und eine bzgl. dieser Metrik konvergente Folge auch bzgl der Euklidischen Metrik konvergiert und zwar gegen denselben Grenzwert.)
- Die Menge  $\mathbb{Q}$  mit der Euklidischen Metrik ist nicht vollstaendig.

## 2. Etwas Topologie metrischer Räume

Neben dem Konzept der Kugel um einen Punkt gibt es auch noch das Konzept der Umgebung eines Punktes, um die Naehel zweier Punkte zu untersuchen. Der Vorteil der Umgebungen ueber Kugeln liegt darin, dass sie mit dem Anwenden von Funktionen besser verträglich sind. Es gibt nun Mengen, die Umgebung jedes ihrer Punkte sind. Solche Mengen spielen eine besondere Rolle. Das untersuchen wir nun.

**DEFINITION.** (*Umgebung*) Sei  $(X, d)$  metrischer Raum und  $x \in X$ . Dann heisst eine Menge  $V$  Umgebung von  $x$ , wenn ein  $r > 0$  existiert mit  $U_r(x) \subset V$  (oder äquivalent, wenn ein  $r' > 0$  existiert mit  $B_{r'}(x) \subset V$ .)

**Bemerkung.** Es ist also  $V$  Umgebung von  $x$ , es eine Obermenge einer Kugel um  $x$  ist, d.h. wenn um  $x$  herum noch etwas 'Platz in  $V$  ist'. Die Elemente von  $V$  sind dann in gewisser Weise 'nahe' an  $x$ .

**Beispiel.** In einem metrischen Raum sind  $U_r(x)$  und  $B_r(x)$  Umgebungen von  $x$  fuer jedes  $r > 0$ .

**DEFINITION.** (*Offene und abgeschlossene Mengen*) Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Dann heisst eine Teilmenge  $U$  von  $X$  offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist d.h. wenn zu jedem  $x \in U$  ein  $r_x > 0$  existiert mit  $U_{r_x}(x) \subset U$ . Eine Teilmenge  $A$  von  $X$  heisst abgeschlossen, wenn  $X \setminus A$  offen ist. Die Familie aller offenen Mengen auf  $X$

heisst die durch  $d$  induzierte Topologie und wird mit  $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$  bezeichnet.

**Bemerkung.** Nicht jede Teilmenge eines metrischen Raumes ist offen oder abgeschlossen. Auch kann es Teilmengen geben, die offen und abgeschlossen sind.

← Ende der 7. Vorlesung. →

**Bemerkung.** Eine Menge  $U$  ist genau dann eine Umgebung von  $x$ , wenn es eine offene Menge  $U$  gibt mit  $x \in U \subset V$ .

**Beispiele.** Jede offene Kugel ist offen. Jede abgeschlossene Kugel ist abgeschlossen.

Bew. Zur Offenheit von  $U_r(x)$ : Diese folgt aus der Dreiecksungleichung: Ist  $y \in U_r(x)$ , so gilt  $d(y, x) < r$ . Damit folgt nach Dreiecksungleichung / Zeichnung mit  $s := r - d(x, y) > 0$  also

$$U_s(y) \subset U_r(x).$$

(Denn fuer  $v \in U_s(y)$  gilt  $d(v, x) \leq d(v, y) + d(y, x) < s + d(y, x) = r$ .)

Zur Abgeschlossenheit von  $B_r(x)$ : Es ist die Offenheit des Komplementes zu zeigen. Diese folgt wieder aus der Dreiecksungleichung: Sei  $y \notin B_r(x)$ . Dann gilt also  $d(x, y) > r$ . Damit gilt nach Dreiecksungleichung / Zeichnung fuer  $s := d(x, y) - r$  also

$$U_s(y) \subset X \setminus B_r(x).$$

(Denn fuer  $v \in U_s(y)$  gilt  $d(v, x) \geq d(y, x) - d(v, y) > d(y, x) - s = r$ .)

Da  $y \in X \setminus B_r(x)$  beliebig war folgt die Behauptung.

**LEMMA.** (*Charakterisierung Konvergenz*)  $(X, d)$  metrischer Raum,  $(x_n)$  Folge in  $X$ ,  $x \in X$ . Dann sind äquivalent:

- (i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$
- (ii) Fuer alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$  mit  $x_n \in U_\varepsilon(x)$  fuer alle  $n \geq n_\varepsilon$
- (iii) Fuer jede Umgebung  $U$  von  $x$  existiert ein  $n_U \in \mathbb{N}$  mit  $x_n \in U$  fuer alle  $n \geq n_U$ .
- (iv) Fuer jede offene Menge  $V$  mit  $x \in V$  existiert ein  $n_V \in \mathbb{N}$  mit  $x_n \in V$  fuer alle  $n \geq n_V$ .

**Bemerkung.**

- Alle vier Aussagen geben eine praezise Version davon, dass die  $(x_n)$  dem Punkt  $x$  beliebig nahe kommen, wenn  $n$  beliebig gross wird.
- Natuerlich koennte man in (i) auch  $U_\varepsilon$  durch  $B_\varepsilon$  ersetzen, da  $U_\varepsilon \subset B_\varepsilon$  und  $B_{\varepsilon/2} \subset U_\varepsilon$  gilt.

*Beweis.* (iv)  $\implies$  (iii): Jede Umgebung von  $x$  enthaelt eine offene Menge  $V$  mit  $x \in V$ .

(iii)  $\implies$  (ii): Es ist  $U_\varepsilon(x)$  eine Umgebung von  $x$ .



(ii) $\implies$  (i): Sei  $\varepsilon > 0$ . Zu zeigen:  $d(x_n, x) < \varepsilon$  fuer alle genuegend grossen  $n$ . Das ist klar nach Definition von  $d \rightarrow 0$  und  $U_\varepsilon(x)$ .

(i) $\iff$  (iv). Sei  $V$  eine offene Menge mit  $x \in V$ . Dann existiert ein  $\varepsilon > 0$  mit  $U_\varepsilon(x) \subset V$ . Wegen (i) gibt es ein  $n_\varepsilon > 0$  mit  $d(x_n, x) < \varepsilon$  fuer  $n \geq n_\varepsilon$ . Dann gilt fuer solche  $n$  also

$$x_n \in U_\varepsilon(x) \subset V.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

Das System aller offenen Mengen in einem metrischen Raum hat einige bemerkenswerte Eigenschaften.

**PROPOSITION.** *Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum mit von  $d$  erzeugter Topologie  $\mathcal{T}$ . Dann gilt:*

- (T1) *Es gehoeren  $\emptyset$  und  $X$  zu  $\mathcal{T}$ .*
- (T2) *Gehören  $V_1, \dots, V_n$  zu  $\mathcal{T}$ , so auch  $V := \bigcap_{j=1}^n V_j$ . 'Endliche Schnitte offener Mengen sind offen.'*
- (T3) *Ist  $I$  eine Menge und gehoeren  $V_\alpha, \alpha \in I$ , zu  $\mathcal{T}$ , so auch  $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha$ . 'Beliebige Vereinigungen offener Menge sind offen.'*

*Beweis.* Es sind (T1) und (T3) einfach nachzuweisen. Nun zu (T2): Seien  $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{T}$  und  $V := \bigcap_{j=1}^n V_j$ . Fuer  $x \in V$  gilt  $x \in V_j$  fuer alle  $j$ . Wegen  $V_j \in \mathcal{T}$  existieren also  $r_j > 0$  mit  $U_{r_j}(x) \subset V_j$ . Sei

$$r := \min\{r_j : j = 1, \dots, n\} > 0.$$

Dann gilt

$$U_r(x) \subset U_{r_j}(x) \subset V_j$$

fuer alle  $j = 1, \dots, n$  und daher

$$U_r(x) \subset V.$$

Das beweist (T2).  $\square$

### **Bemerkung.**

- Ist  $X$  eine beliebige Menge und  $\mathcal{T}$  ein Familie von Teilmengen von  $X$ , die die Eigenschaften (T1), (T2) und (T3) hat, so heisst  $\mathcal{T}$  eine Topologie und  $(X, \mathcal{T})$  ein topologischer Raum.
- Auf topologischen Räumen kann man Konvergenz, Umgebung, Stetigkeit etc definieren. Im allgemeinen wird man aber nicht mehr alles auf Folgen zurueckführen können, sondern wird sogenannte Netze brauchen. Alle in dieser Vorlesung gegebenen Formulierungen mit Folgen nutzen also die spezielle Struktur eines metrischen Raumes. Die Formulierungen mit offenen Mengen und Umgebungen sind auch im allgemeinen gueltig. Daher rührt auch ihre Relevanz.
- Im allgemeinen ist der Schnitt von abzählbar vielen offenen Mengen nicht mehr offen. Bsp. Sei  $U_n = U_{1/n}(0)$  in  $\mathbb{R}$  mit der Euklidischen Metrik. Dann gilt  $\bigcap U_n = \{0\}$ .

FOLGERUNG. Ist  $(X, d)$  ein metrischer Raum, so sind beliebige Schnitte von abgeschlossenen Mengen abgeschlossen.

*Beweis.* Das folgt durch Komplementbildung □

FOLGERUNG. Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $A \subset X$  abgeschlossen und  $U \subset X$  offen. Dann ist  $U \setminus A$  offen und  $A \setminus U$  abgeschlossen.

*Beweis.* Es gilt  $U \setminus A = U \cap (X \setminus A)$  und  $A \setminus U = A \cap (X \setminus U)$ . Damit folgen die Aussagen dann aus dem schon bewiesenen. □

Eine Teilmenge eines metrischen Raumes ist im allgemeinen weder offen noch abgeschlossen. Man kann einer Menge aber jeweils abgeschlossene und offene Menge 'machen'.

DEFINITION.  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Dann heisst:

$$M^\circ := \bigcup_{U \subset M, U \text{ offen}} U \text{ das Innere oder der offene Kern von } M$$

$$\overline{M} := \bigcap_{M \subset A, A \text{ abgeschlossen}} A \text{ der Abschluss oder die abgeschlossene Huelle von } M$$

$$\partial M := \overline{M} \setminus M^\circ \text{ der Rand von } M.$$

**Bemerkung.**

- Es ist  $M^\circ$  die grösste offene Teilmenge, die in  $M$  enthalten ist (da Vereinigung von offenen Mengen offen sind.) Insbesondere stimmt jede offene Menge mit ihrerem Inneren ueberein.
- Es ist  $\overline{M}$  die kleinste abgeschlossene Menge, die  $M$  enthaelt. Insbesondere stimmt jede abgeschlossene Menge mit ihrer Huelle ueberein.
- Es gilt (siehe Uebung):

$$M^\circ = \{x \in X : M \text{ ist Umgebung von } x\} = \{x \in X : \text{es existiert } r_x > 0 \text{ mit } U_{r_x}(x) \subset M\}.$$

$$\overline{M} = \{x \in X : \text{jede Umgebung von } x \text{ enthaelt Punkt von } M\} = \{x \in X : \text{es gibt } (x_n) \text{ in } M \text{ mit } x_n \rightarrow x\}.$$

$$\partial M = \{x \in X : \text{fuer jede Umgebung } U \text{ von } x \text{ gilt } U \cap M \neq \emptyset \text{ und } U \cap X \setminus M \neq \emptyset\}.$$

**Beispiele.**

- Betrachte  $\mathbb{K}^m$  mit der Euklidischen Metrik und der induzierten Topologie. Dann ist das Innere von  $B_r(x)$  gerade  $U_r(x)$  und der Abschluss von  $U_r(x)$  ist  $B_r(x)$ . (Check! Uebung.)

- Für jeden metrischen Raum gilt, dass  $U_r(x)$  enthalten ist im Inneren von  $B_r(x)$  (da  $U_r(x)$  offen) und, dass der Abschluss von  $U_r(x)$  enthalten ist in  $B_r(x)$  (da  $B_r(x)$  abgeschlossen). Diese Inklusionen können strikt sein!

Beispiele:  $X =$  abgeschlossene Einheitskugel in  $\mathbb{R}^2$ . Dann ist  $X = B_1(0)$  offen, also sein Inneres.  $X =$  abgeschlossene Einheitskugel in  $\mathbb{R}^2$  ohne eine punktierte Umgebung von  $(1, 0)$ . Dann enthält der Abschluss von  $U_1(0)$  nicht den Punkt  $(1, 0)$ . Er gehört aber zu  $B_1(0)$ .

- Sei  $\mathbb{R}$  mit der durch die Euklidische Metrik erzeugten Topologie versehen. Dann ist der Rand von  $\mathbb{Q}$  gerade  $\partial\mathbb{Q} = \overline{\mathbb{Q}} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{R} \setminus \emptyset = \mathbb{R}$  (Details: Übung).

Zum Abschluss noch eine praktische Charakterisierung von Abgeschlossenheit.

**PROPOSITION.** Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Eine Teilmenge  $A$  von  $X$  ist genau dann abgeschlossen, wenn der Grenzwert jeder (in  $X$ ) konvergenten Folge aus  $A$  wieder in  $A$  liegt.

*Beweis.* Sei  $A$  abgeschlossen und  $(x_n)$  eine Folge in  $A$  mit  $x_n \rightarrow x$ . Zu zeigen:  $x \in A$ . Wäre  $x$  nicht in  $A$ , so gehörte es zu dem offenen  $X \setminus A$ . Damit wäre also  $x_n$  für alle großen  $n$  ebenfalls in  $X \setminus A$ . Widerspruch.

Es habe  $A$  die angegebene Eigenschaft. Dann gilt also (nach Bemerkung)  $A = \overline{A}$  und damit ist  $A$  abgeschlossen.  $\square$

### 3. Konvergenz und Stetigkeit

Mithilfe des Begriffes der Konvergenz können wir nun die Stetigkeit von Abbildungen fassen. Darum geht es in diesem Abschnitt.

**DEFINITION.** Seien  $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$  metrische Räume und  $f : X_1 \rightarrow X_2$  eine Abbildung. Es heißt  $f$  stetig in  $x \in X_1$ , wenn es  $f(x_n) \rightarrow f(x)$  bzgl.  $d_2$  für jede Folge  $(x_n)$  in  $X_1$  mit  $x_n \rightarrow x$  bzgl.  $d_1$ .

**LEMMA.** Seien  $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$  metrische Räume und  $f : X_1 \rightarrow X_2$  eine Abbildung und  $x \in X_1$ . Dann sind äquivalent: **Zeichnung.**

- Für jede Folge  $(x_n)$  in  $X_1$  mit  $x_n \rightarrow x$  gilt  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .
- Für alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$  mit  $f(U_\delta(x)) \subset U_\varepsilon(f(x))$ . (Beachte: Es handelt sich um Kugeln in verschiedenen Räumen!)
- Für jede Umgebung  $V$  von  $f(x)$  existiert eine Umgebung  $U$  von  $x$  mit  $f(U) \subset V$ .
- Für jede Umgebung  $V$  von  $f(x)$  ist auch  $f^{-1}(V)$  eine Umgebung von  $x$ . (Erinnerung: Das Urbild  $f^{-1}(V)$  von  $V$  unter  $f$  ist gegeben als  $f^{-1}(V) = \{x \in X_1 : f(x) \in V\}$ )

**Bemerkung.**

- Alle vier Aussagen geben eine praezise Version davon, dass Punkte nahe an  $x$  auf Punkte nahe an  $f(x)$  abgebildet werden.
- In (ii) kann man natuerlich statt mit offenen Kugeln auch mit abgeschlossenen Kugeln argumentieren.
- Die Formulierung in (iii) und (iv) nehmen keinen direkten Bezug auf eine Metrik.
- Die Formulierung (iv) zeigt die Nuetzlichkeit des Umgebungsbegriffes ueber den Begriff der Kugel: Im allgemeinen werden die (Ur)bilder von Kugeln auch fuer 'schoene' Funktionen keine Kugeln sein. Schon bei linearen Funktionen werden aus Kugeln Ellipsen.

*Beweis.* (iv)  $\implies$  (iii): Man kann  $U = f^{-1}(V)$  setzen.

(iii)  $\implies$  (ii): Es ist  $U_\varepsilon(f(x))$  eine Umgebung von  $f(x)$ . Daher existiert nach (iii) eine Umgebung  $U$  von  $x$  mit  $f(U) \subset B_\varepsilon(f(x))$ . Da  $U$  Umgebung von  $x$  ist, existiert also ein  $\delta > 0$  mit  $U_\delta(x) \subset U$ . Damit gilt also

$$f(U_\delta(x)) \subset f(U) \subset B_\varepsilon(f(x)).$$

(ii)  $\implies$  (i):

Sei  $V$  eine Umgebung von  $f(x)$ . Dann existiert also ein  $\varepsilon > 0$  mit  $B_\varepsilon(f(x)) \subset V$ . Damit existiert nach (i) also ein  $\delta > 0$  mit

$$f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x)) \subset V.$$

Damit folgt (ii) mit  $U = B_\delta(x)$ .

(ii)  $\implies$  (i): Sei  $\varepsilon > 0$ . (Z.z.  $d_2(f(x_n), f(x)) \leq \varepsilon$  fuer groesse  $n$ .) Sei zu diesem  $\varepsilon$  ein  $\delta > 0$  gemaess (ii) gewaehlt. Wegen  $x_n \rightarrow x$  existiert ein  $n_\delta \in \mathbb{N}$  mit  $d_1(x_n, x) \leq \delta$  fuer alle  $n \geq n_\delta$ . Damit gilt dann nach (ii)  $d_2(f(x_n), f(x)) \leq \varepsilon$  fuer  $n \geq n_\delta$ .

(i)  $\implies$  (iv): Sei  $V$  eine Umgebung von  $f(x)$ . Angenommen: Es ist  $f^{-1}(V)$  keine Umgebung von  $x$ . Dann gilt also  $U_\delta(x) \subset f^{-1}(V)$  fuer kein  $\delta > 0$ . Daher gibt es also (mit  $\delta = 1/n$ ) zu jedem  $n \in \mathbb{N}$  eine  $x_n \in U_{1/n}(x)$  mit  $f(x_n) \notin V$ . Dann gilt aber  $x_n \rightarrow x$  und  $f(x_n)$  konvergiert nicht gegen  $f(x)$ . Das ist ein Widerspruch.  $\square$

←  
Ende der 8. Vorlesung.

Stetigkeit ist verträglich mit den 'üblichen' Operationen.

**PROPOSITION.** Seien  $(X_j, d_j)$ ,  $j = 1, 2, 3$ , metrische Räume und  $f : X_1 \rightarrow X_2$ ,  $g : X_2 \rightarrow X_3$  gegeben. Ist  $f$  stetig in  $x \in X_1$  und  $g$  stetig in  $f(x)$ , so ist  $g \circ f : X_1 \rightarrow X_3$  stetig in  $x$ .

*Beweis.* Das folgt aus der Folgencharakterisierung der Stetigkeit wie folgt:  $x_n \rightarrow x$  impliziert,  $f(x_n) \rightarrow f(x)$  (da  $f$  stetig in  $x$ ) und das impliziert  $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x))$  da  $g$  stetig in  $f(x)$ ).  $\square$

PROPOSITION. Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$  seien stetig in  $x \in X$ . Dann sind auch  $f + g : X \rightarrow \mathbb{C}$  und  $fg : X \rightarrow \mathbb{C}$  stetig in  $x$ .

*Beweis.* Das folgt sofort aus der Folgencharakterisierung der Stetigkeit  $\square$

PROPOSITION. Ist  $(X, d)$  ein metrischer Raum und sind  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  stetig (in  $p \in X$ ), so sind auch  $\max\{f, g\}$ ,  $\min\{f, g\}$  und  $|f|$  stetig (in  $p \in X$ ).

*Beweis.* (Uebung)  $\square$

DEFINITION. Seien  $(X_1, d_1)$ ,  $(X_2, d_2)$  metrische Räume und  $f : X_1 \rightarrow X_2$  eine Abbildung. Dann heißt  $f$  stetig, wenn es in jedem Punkt von  $X_1$  stetig ist.

THEOREM. (Charakterisierung Stetigkeit) Seien  $(X_1, d_1)$ ,  $(X_2, d_2)$  metrische Räume und  $f : X_1 \rightarrow X_2$  eine Abbildung. Dann sind äquivalent:

- (i)  $f$  ist stetig.
- (ii) Die Urbilder offener Mengen unter  $f$  sind offen, d.h. für jedes  $V \in \mathcal{T}_2$  gehört  $f^{-1}(V)$  zu  $\mathcal{T}_1$ .

**Bemerkung.** Dieser Satz allein rechtfertigt schon die Einführung des Konzeptes der offenen Menge.

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii): Sei  $V \in \mathcal{T}_2$  beliebig und  $U := f^{-1}(V)$ . Zu zeigen:  $U$  ist Umgebung von jedem  $x \in U$ . Sei also  $x \in U$  beliebig. Dann folgt  $f(x) \in V$ . Da  $V$  offen ist, ist es eine Umgebung von  $f(x)$  und damit folgt nach (i) die Existenz einer Umgebung  $U_x$  von  $x$  mit

$$f(U_x) \subset V.$$

Damit folgt also  $x \in U_x \subset U$  (nach Definition von  $U$ ). Damit ist  $U$  Umgebung von  $x$ .

(ii)  $\implies$  (i): Zu zeigen:  $f$  ist stetig in jedem  $x \in X_1$ . Sei also  $x \in X_1$  beliebig. Sei  $V$  eine Umgebung von  $f(x)$ . Dann existiert also eine offene Menge  $W$  mit

$$f(x) \in W \subset V.$$

Nach (ii) ist dann  $U := f^{-1}(W)$  offen. Weiterhin gilt nach Definition  $x \in U$ . Damit ist also  $U$  eine Umgebung von  $x$  mit  $f(U) \subset W \subset V$ .  $\square$

**Beispiel.** Alle linearen Funktionen  $A : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$  sind stetig.

Bew. Uebung.

Zum Abschluss des Abschnittes diskutieren wir noch eine Anwendung, naemlich **Stetigkeit und Produkträume**. Seien  $(X_j, d_j)$ ,  $j = 1, \dots, N$  metrische Räume und sei

$$X := X_1 \times \dots \times X_N = \{(\xi_1, \dots, \xi_N) : \xi_j \in X_j\}$$

ihr Produkt. Ähnlich wie man  $\mathbb{R}^N$  mittels der Euklidischen Metrik von  $\mathbb{R}$  metrisiert, kann man dann auch den Raum  $X$  metrisieren. So ist zum Beispiel

$$d(\xi_1, \dots, \xi_N), (\eta_1, \dots, \eta_N) := \sum_{j=1}^N d_j(\xi_j, \eta_j)$$

eine Metrik auf  $X$ . Es gilt dann offenbar

$$x_n = (\xi_1^{(n)}, \dots, \xi_N^{(n)}) \rightarrow x = (\xi_1, \dots, \xi_N)$$

beueglich  $d$  genau dann, wenn  $\xi_j^{(n)} \rightarrow \xi_j$  bzgl  $d_j$  fuer jedes  $j = 1, \dots, N$ . Alternativ kann man zu jeder Norm  $\|\cdot\|$  auf  $\mathbb{R}^N$  eine Metrik  $e_{\|\cdot\|}$  auf  $X$  einfuehren durch

$$e_{\|\cdot\|}(\xi_1, \dots, \xi_N), (\eta_1, \dots, \eta_N) = \|(d_1(\xi_1, \eta_1), \dots, d_N(\xi_N, \eta_N))\|.$$

Es ist dann  $d$  gerade die zur  $\ell^1$ -Norm gehoerige  $e$ -Metrik. Aufgrund der Aquivalenz aller Normen im  $\mathbb{R}^N$ , gibt es dann fuer jede Norm  $\|\cdot\|$  Konstanten  $c, C > 0$  mit

$$cd \leq e_{\|\cdot\|} \leq Cd.$$

Darum spielt es fuer die Untersuchungen von konvergenter Folgen bzw Cauchy-Folgen keine Rolle, welche dieser Metrik wir tatsaechlich verwenden.

Es ist (Uebung)  $(X, d)$  genau dann vollstaendig, wenn  $(X_j, d_j)$  vollstaendig ist fuer jedes  $j = 1, \dots, N$ .

Fuer Stetigkeit von Funktionen erhalten wir im Zusammenhang mit Produkträumen folgendes.

Sei  $(Z, e)$  ein metrischer Raum und  $(X, d)$  der obige Produktraum. Dann ist  $f : X \rightarrow Z$  stetig genau dann, wenn aus  $\xi_j^{(n)} \rightarrow \xi_j$ ,  $j = 1, \dots, N$  folgt  $f((\xi_1^{(n)}, \dots, \xi_N^{(n)})) \rightarrow f(\xi_1, \dots, \xi_N)$ .

Es ist  $f : Z \rightarrow X$ ,  $f(z) = (f_1(z), \dots, f_N(z))$  genau dann stetig, wenn jede einzelne Komponente  $f_j : Z \rightarrow X_j$  stetig ist.

### Beispiele.

- Ist  $(Z, e)$  ein beliebiger metrischer Raum, so ist  $e : Z \times Z \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. (Bew. Die entsprechende Aussage fuer Folgenkonvergenz wurde oben schon gezeigt.)
- Es sind  $+$  :  $\mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  und  $\cdot$  :  $\mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  stetig. Entsprechendes gilt auf  $\mathbb{R}$ . (Bew. Uebung).

#### 4. Kompaktheit

In diesem Abschnitt lernen wir ein fundamentales Konzept der Topologie kennen naemlich das Konzept der Kompaktheit. Kompaktheit ist eine ausgesprochen nützliche Eigenschaft (verlangt aber eine etwas abstrakte Definition).

**DEFINITION.** Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Eine Teilmenge  $K \subset M$  heisst kompakt, wenn jede Folge  $(x_n)$  in  $K$  ein Teilfolge  $(x_{n_k})$  besitzt, die gegen einen Grenzwert aus  $K$  konvergiert.

**Bemerkung.**

- Das so definierte Konzept ist auch als Folgenkompaktheit bekannt. In metrischen Räumen stimmt es mit anderen Konzepten von Kompaktheit ueberein (s.u.). Da uns nur metrische Räume interessieren, werden wir nicht zwischen Folgenkompaktheit und Kompaktheit unterscheiden.
- Der Fall  $K = X$  in obiger Definition ist natuerlich möglich. In Anwendungen hat man es aber oft mit der Situation zu tun, das  $X$  nicht kompakt ist, man sich aber fuer die kompakten Mengen in  $X$  interessiert.

**Beispiele.**

- Sei  $I = [a, b]$  ein abgeschlossenes beschränktes Intevall in  $\mathbb{R}$ . Dann ist  $I$  kompakt. (Bew. Nach Bolzano/Weierstrass hat jede Folge in  $I$  eine (in  $\mathbb{R}$ ) konvergente Teilfolge. Da das Intervall abgeschlossen ist, liegt der Grenzwert der Teilfolge in  $I$ ).
- Sei  $A$  eine abgeschlossene bzgl. der Euklidischen Metrik beschaenkte Menge in  $\mathbb{R}^N$  (oder  $\mathbb{C}^N$ ). Dann ist  $A$  kompakt. (Bew. Im wesentlichen haben wir kuerzlich mitbewiesen, als es um die Aequivalenz aller Normen im  $\mathbb{R}^N$  ging. Argumente skizzieren! Wir werden es unten noch einmal beweisen.

Kompaktheit ist eine nuetzliche Eigenschaft, wie die folgenden Resultate zeigen.

**THEOREM.** Sei  $(K, d)$  kompakter metrischer Raum und  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann nimmt  $f$  Minimum und Maximum an (d.h...)

**THEOREM.** Sei  $(K, d)$  ein kompakter metrischer Raum und  $(Y, e)$  ein metrischer Raum und  $f : K \rightarrow Y$  stetig. Dann ist  $f$  gleichmaessig stetig (d.h...)

**THEOREM.** Sei  $(K, d)$  ein kompakter metrischer Raum und  $(Y, e)$  ein metrischer Raum und  $f : K \rightarrow Y$  stetig. Dann ist  $f(K)$  komapkt.

**Bemerkung.**

- Das ist einer der beiden einzigen globalen Saetze ueber stetige Funktionen.

- Anders als bei den Betrachtungen zur Stetigkeit, geht es hier um die Bilder (und nicht die Urbilder) von  $f$ .

PROPOSITION. Sei  $(X, d)$  metrischer Raum. Ist  $K \subset X$  kompakt und  $A \subset K$  abgeschlossen, so ist  $A$  kompakt.

*Beweis.* Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $A$ . Dann ist  $(x_n)$  eine Folge in  $K$ . Daher hat also  $(x_n)$  eine in  $K$  konvergente Teilfolge. Da  $A$  abgeschlossen ist, liegt der Grenzwert der Teilfolge sogar in  $A$ .  $\square$

PROPOSITION. Sei  $(X, d)$  metrischer Raum und  $K \subset X$  kompakt. Dann ist  $K$  abgeschlossen.

*Beweis.* Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $K$ , die gegen  $x \in X$  konvergiert. Aufgrund der Kompaktheit enthaelt  $(x_n)$  eine Teilfolge, die gegen ein  $y \in K$  konvergiert. Dann muss aber gelten  $x = y \in K$ .  $\square$

THEOREM. (Automatische Stetigkeit der Inversen) Sei  $(K, d)$  ein kompakter metrischer Raum und  $(L, e)$  ein metrischer Raum und  $f : K \rightarrow L$  sei bijektiv und stetig. Dann ist die inverse Abbildung  $g = f^{-1} : L \rightarrow K$  stetig.

*Beweis.* Zu zeigen  $g^{-1}(U)$  offen fuer jedes offene  $U \subset K$ . Es reicht zu zeigen:  $g^{-1}(A)$  abgeschlossen fuer jedes abgeschlossene  $A \subset K$ . Ist  $A \subset K$  abgeschlossen, so ist  $A$  kompakt. Daher ist auch

$$g^{-1}(A) = f(A)$$

kompakt, also nach voriger Proposition abgeschlossen.  $\square$

Wir kommen nun zur konzeptuellen Untersuchung und Charakterisierung von Kompaktheit.

DEFINITION. Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Eine Teilmenge  $B \subset X$  (z.B.  $B = X$ ) heisst total beschaenkt, wenn zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $N \in \mathbb{N}$  und  $x_1, \dots, x_N \in X$  (aequivalent  $x_1, \dots, x_N \in B$ ) existieren mit

$$B \subset \bigcup_{k=1}^N B_\varepsilon(x_k).$$

### Bemerkung.

- Statt mit abgeschlossenen Kugeln koennte man auch offenen Kugeln arbeiten.
- Wir wissen schon, dass jede Metrik  $d$  zu einer Metrik  $e$  aequivalent ist, in der der ganze Raum eine beschaenkte Menge ist (Z.B.  $e = \frac{d}{1+d}$ ). Daher ist Beschaenktheit einer Menge keine besonders kanonische Eigenschaft. Das Konzept der total Beschaenktheit ersetzt das Konzept der Beschaenktheit. Ist ein Raum bzgl. zweier aequivalentener Metriken vollstaendig, so haben beide Metriken dieselben total beschaenkten Mengen (s.u.).



**Beispiel - Total beschränkte Mengen im  $\mathbb{R}^N$  bzw.  $\mathbb{C}^N$ .** Sei  $\mathbb{R}^N$  mit der Euklidischen Metrik versehen. Dann ist ein  $B \subset \mathbb{R}^N$  genau dann total beschränkt, wenn es beschränkt ist.

Bew.  $\implies$ : Sei  $B$  beschränkt. Betrachte zu  $\rho > 0$  das Gitter  $\Gamma_\rho := (\rho\mathbb{Z})^N$ . Dann schneidet  $B$  aufgrund der Beschränktheit (und des archimedischen Axioms) nur endlich viele Maschen des Gitters. Jede dieser Maschen kann mit einer Kugel vom Radius  $N\rho$  überdeckt werden. Damit folgt die gewünschte Implikation (da  $\rho > 0$  beliebig klein gemacht werden kann).

$\impliedby$ : Das ist klar.

**Bemerkung.** Eine total beschränkte Menge muss nicht vollständig sein. Bsp:  $(0, 1)$  mit der üblichen Euklidischen Metrik.

←  
Ende 9. Vorlesung.

Für die folgenden Betrachtungen werden noch zwei Stücke Notation von Nutzen sein.

**Notation.** Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum.

- Ist  $(x_n)$  eine Folge in  $X$  und  $B$  eine Teilmenge von  $X$ , so sagen wir, dass in  $B$  unendlich viele Folgenglieder liegen, wenn die Menge  $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in B\}$  unendlich viele Elemente hat.
- Ist  $B$  eine Teilmenge von  $X$  und sind  $U_\alpha$ ,  $\alpha \in I$  Teilmengen von  $X$  so sagen wir, dass die  $U_\alpha$  die Menge  $B$  überdecken, wenn  $B \subset \cup_{\alpha \in I} U_\alpha$  gilt.

Wir erinnern an den Satz von Bolzano / Weierstrass. Dieser besagt, dass eine Menge  $I$  in  $\mathbb{R}$  genau dann beschränkt ist, wenn jede Folge eine konvergente Teilfolge hat. (Hier ist die schwere Richtung die eigentliche Aussage des Satzes von Bolzano / Weierstrass und die andere Richtung ist klar). Die total beschränkten Menge lassen sich mit folgender Variante des Satzes von Bolzano/Weierstrass charakterisieren.

**LEMMA.** (*Charakterisierung total beschränkt*). Sei  $(M, d)$  ein metrischer Raum und  $B \subset M$ . Dann sind äquivalent:

- (i) *Es ist  $B$  total beschränkt.*
- (ii) *Jede Folge in  $B$  hat eine Teilfolge, die eine Cauchy Folge ist.*

*Beweis.* (i) $\implies$ (ii): Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $B$ . Wir überdecken nun  $B$  durch endlich viele Kugeln vom Radius 1. In einer von diesen Kugeln müssen dann unendlich viele Folgenglieder von  $(x_n)$  liegen.

Bezeichne den Schnitt dieser Kugel mit  $B$  als  $B_1$ . Wir überdecken nun  $B_1$  (das als Teilmenge des total beschränkten  $B$  ebenfalls total beschränkt ist) durch endlich viele Kugeln vom Radius  $1/2$ . Der Schnitt einer dieser Kugeln mit  $B_1$  muss dann unendlich viele Folgenglieder von  $(x_n)$  enthalten. Nenne diesen Schnitt  $B_2$ . Induktiv können wir so eine Folge von Mengen  $B_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , konstruieren mit

- $B \supset B_1 \supset \dots \supset B_{n-1} \supset B_n$
- $\sup_{x,y \in B_n} d(x,y) =: \text{diam} B_n \leq \frac{1}{2^n}$ ,
- Jedes  $B_n$  enthaelt unendlich viele Folgeglieder.

(Vgl. Intervallhalbierungsverfahren zum Beweis des Satzes von Bolzano / Weierstrass im ersten Semester). Aufgrund der dritten Eigenschaft koennen wir dann eine Teilfolge  $(x_{n_k})$  von  $(x_n)$  konstruieren mit  $x_{n_k} \in B_k$  fuer alle  $k \in \mathbb{N}$ . Aufgrund der ersten beiden Eigenschaften handelt es sich um eine Cauchy Folge.

(ii) $\implies$ (i): Angenommen  $B$  ist nicht total beschraenkt. Dann existiert also ein  $\varepsilon > 0$  so dass  $B$  nicht mit endlich vielen Kugeln mit dem Radius  $\varepsilon$  ueberdeckt werden kann. Dann koennen wir induktiv eine Folge  $(x_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , in  $B$  von Kugelmittelpunkten konstruieren mit

$$x_{n+1} \notin \cup_{k=1}^n B_\varepsilon(x_k).$$

$n = 1$  : Waehle  $x_1$  beliebig.

$n \implies n + 1$ : Es wird  $B$  nicht von  $\cup_{k=1}^n B_\varepsilon(x_k)$  ueberdeckt nach Annahme.

Die Elemente dieser Folge erfuellen

$$d(x_n, x_k) \geq \varepsilon$$

fuer alle  $n, k \in \mathbb{N}$  mit  $n \neq k$ . Daher kann diese Folge keine Teilfolge haben, die eine Cauchy Folge ist. Widerspruch zu (ii).  $\square$

Damit koennen wir nun Kompaktheit charakterisieren.

**THEOREM.** (*Charakterisierung Kompaktheit*). Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $K \subset X$ . Dann sind aequivalent:

- Es ist  $K$  total beschraenkt und vollstaendig.
- Jede Folge in  $K$  hat eine Teilfolge, die in  $K$  konvergiert.

*Beweis.* Das folgt leicht aus dem vorigen Lemma.

(i) $\implies$ (ii): Da  $K$  total beschraenkt ist, hat nach dem vorigen Lemma jede Folge in  $K$  eine Teilfolge, die Cauchy Folge ist. Aufgrund der Vollstaendigkeit von  $K$  konvergiert diese dann in  $K$ .

(ii) $\implies$ (i): Nach (ii) hat insbesondere jede Folge in  $K$  eine Teilfolge, die Cauchy Folge ist. Daher ist nach dem Lemma also die Menge  $K$  total beschraenkt. Noch zu zeigen:  $K$  vollstaendig. (Hier kommt das einzig neue im Beweis, das nicht schon aus dem vorigen Lemma folgt.) Sei  $(x_n)$  eine Cauchy Folge in  $K$ . Dann enthaelt  $(x_n)$  nach (ii) eine gegen ein  $x \in K$  konvergente Teilfolge  $(x_{n_k})$ . Damit ist (nach Standardschluessen) die Folge  $(x_n)$  selber konvergent gegen  $x$ . Denn es gilt

$$d(x, x_n) \leq d(x, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x_n).$$

Es konvergiert nun  $(d(x, x_{n_k}))$  gegen 0, da  $x_{n_k} \rightarrow x$  und es wird  $d(x_{n_k}, x_n)$  beliebig klein fuer  $k, n$  gross, da es sich um eine Cauchy Folge handelt.

$\square$

Wir erinnern im Zusammenhang mit Vollstaendigkeit von Teilmengen noch an folgenden Zusammenhang.

**LEMMA.** *Sei  $(X, d)$  ein vollständiger metrischer Raum. Sei  $A$  eine Teilmenge von  $X$ . Dann ist  $A$  abgeschlossen (in  $X$ ) genau dann, wenn der metrische Raum  $(A, d)$  vollstaendig ist.*

*Beweis.* Sei  $A$  abgeschlossen. Sei  $(x_n)$  eine Cauchy-Folge in  $(A, d)$ . Dann ist  $(x_n)$  eine Cauchy Folge in  $X$ . Damit konvergiert  $(x_n)$  in  $X$  gegen ein  $x$ . Da  $A$  abgeschlossen ist, gehoert  $x$  zu  $A$ .

Sei  $(A, d)$  vollständig. Sei  $(x_n)$  eine gegen  $x \in X$  konvergente Folge in  $A$ . Zu zeigen  $x \in A$ : Dann ist  $(x_n)$  eine Cauchy Folge in  $X$  und damit auch in  $A$ . Daher hat  $(x_n)$  einen Grenzwert in  $A$ . Dieser muss dann mit  $x$  uebereinstimmen. □

**Beispiel - Kompaktheit in  $\mathbb{R}^N$  bzw.  $\mathbb{C}^N$ .** In  $\mathbb{R}^N$  bzw.  $\mathbb{C}^N$  ist eine Menge total beschraenkt genau dann, wenn sie beschraenkt ist. Sie ist vollstaendig, genau dann, wenn sie abgeschlossen ist. Damit erhalten wir folgendes Resultat: Ein  $K \subset \mathbb{R}^N$  ist kompakt genau dann, wenn es abgeschlossen und beschränkt ist.

Eine Variante der Betrachtungen von  $\mathbb{R}^N$  führt auf folgende Charakterisierung von Totaler Beschränktheit mittels Kompaktheit.

**FOLGERUNG.** *Sei  $(M, d)$  ein vollstaendiger metrischer Raum. Sei  $A \subset M$ . Dann sind äquivalent:*

- (i)  *$A$  ist total beschraenkt.*
- (ii) *Es ist  $\overline{A}$  kompakt.*

*Beweis.* Man sieht leicht, dass eine Menge  $A$  von  $X$  total beschränkt ist genau dann wenn  $\overline{A}$  total beschränkt ist. Damit können wir wie folgt weiterschliessen:

Ist  $\overline{A}$  kompakt, so ist es also total beschraenkt. Dann ist auch  $A$  total beschraenkt.

Sei umgekehrt  $A$  total beschraenkt. Dann ist auch  $\overline{A}$  total beschraenkt (einfach) und vollstaendig (als abgeschlossene Menge eines vollstaedigen Raumes). Daher ist  $\overline{A}$  kompakt. □

**DEFINITION.** *Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Eine Menge  $A$  in  $X$  heisst relativ kompakt, wenn ihr Abschluss kompakt ist.*

Wir kommen nun zu einer weiteren Charakterisierung von Kompaktheit. Diese lässt sich auch fuer allgemeine topologische Räume geben.

**THEOREM.** *Sei  $(M, d)$  ein metrischer Raum und  $K \subset M$ . Dann sind äquivalent:*

- (i) Jede Folge in  $K$  hat eine in  $K$  konvergente Teilfolge.  
(ii) Jede offenen Ueberdeckung von  $K$  hat eine endliche Teilueberdeckung. (Das heisst: Zu allen  $U_\alpha$ ,  $\alpha \in A$ , offen mit  $K \subset \cup U_\alpha$  existiert  $N \in \mathbb{N}$  und  $\alpha_1, \dots, \alpha_N$  mit  $K \subset \cup_{j=1}^N U_{\alpha_j}$ .) 'K ist ueberdeckungskompakt'.

**Bemerkung.**

- Die Eigenschaft (ii) kann auch als Definition von Kompaktheit genommen werden. Man spricht dann von Ueberdeckungskompaktheit (oder der Heine-Borel Eigenschaft). Der Satz besagt dann, dass in metrischen Räumen Ueberdeckungskompaktheit aequivalent zu Folgenkompaktheit ist.
- In der Eigenschaft (ii) wird kein Bezug auf die Metrik genommen sondern nur auf die erzeugte Topologie. Insbesondere haben also zwei Metriken, die dieselbe Topologie erzeugen, dieselben kompakten Mengen.

*Beweis.* (ii)  $\implies$  (i): Sei  $(x_n)$  eine Folge in  $K$ . Angenommen  $(x_n)$  enthaelt keine konvergente Teilfolge. Dann hat  $(x_n)$  also keinen Haeufungspunkt. Dann existiert zu jedem  $x \in K$  also ein  $\delta_x > 0$  so dass in  $U_{\delta_x}(x)$  nur endlich viele Folgeglieder liegen. Dann ist  $U_{\delta_x}(x)$  eine offene Ueberdeckung von  $K$  und hat also eine endliche Teilueberdeckung

$$U_{\delta_{p_j}}(p_j), \quad j = 1, \dots, N.$$

Da jedes  $U_{\delta_{p_j}}$  nur endlich viele Folgeglieder enthaelt, gibt es also insgesamt nur endlich viele Folgeglieder. Das ist ein Widerspruch.

(i)  $\implies$  (ii): Sei  $U_\alpha$  eine offene Ueberdeckung von  $K$ . Wir gehen in drei Schritten vor.

*Schritt 1:* Es gibt ein  $\delta > 0$ , so dass fuer jedes  $x \in K$  ein  $\alpha_x \in A$  existiert mit  $x \in U_\delta(x) \subset U_{\alpha_x}$ . 'Jede  $\delta$ -Kugel liegt in einem  $U_\alpha$ '.

Bew. Angenommen nein! Dann gibt es also zu jedem  $n \in \mathbb{N}$  (fuer  $\delta = 1/n$ ) ein  $x_n \in K$  sodass  $U_{1/n}(x_n)$  nicht in  $U_\alpha$  enthalten ist fuer alle  $\alpha \in A$ . Aufgrund von (i) hat  $(x_n)$  eine konvergente Teilfolge. Ohne Einschraenkung sei  $x_n \rightarrow x \in K$ . Dann gibt es ein  $\alpha \in A$  mit  $x \in U_\alpha$ . Da  $U_\alpha$  offen ist, ist dann auch  $U_\delta(x) \subset U_\alpha$  fuer ein geeignetes  $r > 0$ . Fuer hinreichend grosse  $n$  ist dann aber  $d(x_n, x) < r/2$  und  $1/n < r/2$  also

$$U_{1/n}(x_n) \subset U_{r/2}(x_n) \subset U_r(x) \subset U_\alpha.$$

Das ist ein Widerspruch zur Konstruktion der  $(x_n)$ .

*Schritt 2:* Zu  $\delta > 0$  aus Schritt 1, gibt es ein  $N \in \mathbb{N}$  und  $x_1, \dots, x_N \in K$  mit  $K \subset \cup_{j=1}^N U_\delta(x_j)$ .

Bew. Nach (i) und der Charakterisierung von Kompaktheit, ist  $K$  total beschaenkt. Damit folgt Schritt 2 (fuer jedes  $\delta > 0$ ).

*Schritt 3:* Es gilt (ii).

Bew. Seien  $\delta > 0$  und  $x_1, \dots, x_N$  aus Schritt 2 gegeben. Dann gilt also

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N U_\delta(x_j).$$

Nach Schritt 1 ist jedes  $U_\delta(x_j)$  in einem  $U_{\alpha_j}$  enthalten und (ii) folgt.  $\square$

←—————→  
Ende 10. Vorlesung

**PROPOSITION.** *Seien  $(X, d)$  und  $(Y, e)$  metrische R aume und  $K \subset X$  und  $L \subset Y$  kompakt. Dann ist  $K \times L \subset X \times Y$  kompakt.*

*Beweis.* Sei  $(x_n, y_n)$  eine Folge in  $K \times L$ . Dann ist  $(x_n)$  eine Folge in  $K$ . Damit hat  $(x_n)$  eine in  $K$  gegen ein  $x \in K$  konvergente Teilfolge  $(x_{n_k})$ . Dann ist  $(y_{n_k})$  eine Teilfolge in  $L$ . Daher hat es eine gegen ein  $y \in L$  konvergente Teilfolge  $(y_{m_k})$ . Dann gilt

$$x_{m_k} \rightarrow x \quad \text{und} \quad y_{m_k} \rightarrow y.$$

Damit konvergiert  $(x_{m_k}, y_{m_k})$  gegen  $(x, y) \in K \times L$ .  $\square$

**Bemerkung.** Alternativ hier noch ein Ueberdeckungsbeweis: Sei  $W_\alpha$ ,  $\alpha \in A$ , eine offene Ueberdeckung von  $K \times L$ .

Der Beweis wird nun in drei Schritten gefuehrt. (Zeichnung)

Schritt 1: Es gibt zu jedem  $(x, y) \in K \times L$  ein  $\alpha(x, y) \in A$  und Umgebungen  $U_{(x,y)}$  von  $x$  und  $V_{(x,y)}$  von  $y$  mit

$$(x, y) \in U_{(x,y)} \times V_{(x,y)} \subset W_{\alpha(x,y)}.$$

Bew. Das folgt aus der Ueberdeckungseigenschaft unter Definition der Produkttopologie.

Schritt 2: Fuer festes  $x \in K$  ist  $(V_{(x,y)})_{y \in L}$  eine offene Ueberdeckung von  $L$ . Also gibt es  $y_1(x), \dots, y_{N(x)}(x)$  mit

$$L \subset v_{(x,y_1(x))} \cup \dots \cup V_{(x,y_{N(x)}(x))}.$$

Setze nun

$$U_x := U_{(x,y_1(x))} \cap \dots \cap U_{(x,y_{N(x)}(x))}.$$

Schritt 3: Aufgrund der Kompaktheit von  $K$  gibt  $x_1, \dots, x_M$  in  $K$  mit

$$K \subset U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_M}.$$

Damit ueberdecken dann die endlich vielen

$$W_{\alpha(x_j, y_k(x_j))}, \quad j = 1, \dots, M, k = 1, \dots, N(x_j)$$

die Menge  $K \times L$ .

## 5. Zusammenhang

In diesem Abschnitt diskutieren wir ein weiteres topologisches Konzept, naemlich Zusammenhang.

**DEFINITION.** Ein metrischer Raum  $(X, d)$  heisst zusammenhaengend, wenn er nicht in zwei offene disjunkte nichtleere Teilmengen zerlegt werden kann (d.h. wenn aus  $X = U \cup V$  mit  $U, V$  offen,  $U \cap V = \emptyset$  folgt  $U = X$  oder  $V = X$ ). Eine Teilmenge  $A$  eines metrischen Raumes heisst zusammenhaengend, wenn  $(A, d)$  als metrischer Raum zusammenhaengend ist.

**Zeichnung.**

**Bemerkung.** Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $A \subset X$  eine Teilmenge. Ist dann  $U$  eine Teilmenge des metrischen Raumes  $(A, d)$  so ist  $U$  offen (im metrischen Raum  $(A, d)$ ) genau dann, wenn es eine offene Menge  $U'$  in  $(X, d)$  gibt mit  $U = A \cap U'$ . **Zeichnung.** (Bew. Es gilt offenbar

$$U_r^A(x) := \{a \in A : d(a, x) < r\} = U_r^X(x) \cap A.$$

Damit folgt die Aussage leicht.)

Hier ist das Hauptergebnis ueber stetige Funktionen auf Zusammenhaengenden Mengen.

**THEOREM.** Seien  $(X, d)$  und  $(Y, e)$  metrische Raeume und  $(X, d)$  zusammenhaengend und  $f : X \rightarrow Y$  stetig, dann ist  $f(X)$  zusammenhaengend.

*Beweis.* Seien  $U, V$  disjunkte offene Mengen in  $(f(X), d)$  mit  $U \cup V = f(X)$ . Dann sind aufgrund der Stetigkeit von  $f$  also

$$U_X := f^{-1}(U), \quad V_X := f^{-1}(V)$$

offene disjunkte Mengen in  $X$  mit  $X = U_X \cup V_X$ . Da  $X$  zusammenhängend ist, folgt  $U_X = \emptyset$  oder  $V_X = \emptyset$ . Das liefert die Behauptung.  $\square$

**Bemerkung.** Wie wir schon erwaeht hatten, gibt es eigentlich nur zwei globale Saetze zu stetigen Funktionen. Diese besagen:

- Stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt.
- Stetige Bilder zusammenhaengender Mengen sind zusammenhaengend.

**Beispiel - zusammenhaengenden Mengen in  $\mathbb{R}$ .** Wir untersuchen nun noch die Struktur der zusammenhaengende Mengen in  $\mathbb{R}$ . Das wird ein strukturelles Verstaendnis des Zwischenwertsatzes liefern.

**THEOREM.** Die zusammenhaengenden Mengen in  $\mathbb{R}$  sind gerade die Intervalle.

*Beweis.* Sei  $I \subset \mathbb{R}$  zusammenhängend. Zu zeigen: Mit  $x, y \in I$  gehört auch jeder Punkt zwischen  $x$  und  $y$  zu  $I$ .

Sei ohne Einschränkung  $x < y$ . Betrachte  $p$  mit  $x < p < y$ . Angenommen  $p \notin I$ . Dann bilden  $U := (-\infty, p) \cap I$  und  $V := (p, \infty) \cap I$  eine offene disjunkte Zerlegung von  $I$  in nichtleere Mengen. Widerspruch.

Sei nun  $I \subset \mathbb{R}$  ein Intervall. Sei  $I = U \cup V$  eine Zerlegung von  $I$  in offene disjunkte Mengen. Betrachte die charakteristische Funktion

$$1_U : I \longrightarrow \mathbb{R},$$

mit  $1_U(x) = 1$  falls  $x \in U$  und  $1_U(x) = 0$  sonst. Dann sind die Urbilder von beliebigen Mengen in  $\mathbb{R}$  unter  $1_U$  offenbar entweder  $\emptyset$  oder  $U$  oder  $V$  oder  $I$ . Damit ist  $1_U$  stetig. Da  $1_U$  nur Werte in  $\{0, 1\}$  annimmt, folgt nach dem Zwischenwertsatz, dass  $1_U$  konstant sein muss.  $\square$

**DEFINITION.** (Wegzusammenhängend) Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Dann heißt  $(X, d)$  wegzusammenhängend, wenn zu beliebigen  $x, y \in X$  eine stetige Abbildung  $\gamma : [0, 1] \longrightarrow X$  existiert mit  $\gamma(0) = x$ ,  $\gamma(1) = y$ . Ein solches  $\gamma$  heißt dann Weg von  $x$  nach  $y$ .

**Beispiel.** Eine  $C \subset \mathbb{R}^N$  heißt konvex, wenn mit  $x, y \in C$  auch die Verbindungsstrecke  $V = \{tx + (1-t)y : 0 \leq t \leq 1\}$  zwischen  $x$  und  $y$  zu  $C$  gehört. Jede konvexe Menge in  $\mathbb{R}^N$  ist offenbar wegzusammenhängend (Klar!?). Insbesondere ist jede Kugel in  $\mathbb{R}^N$  wegzusammenhängend.

**PROPOSITION.** Ist  $(X, d)$  ein wegzusammenhängender metrischer Raum,  $(Y, e)$  ein metrischer Raum und  $f : X \longrightarrow Y$  stetig, so ist  $(f(X), e)$  wegzusammenhängend.

*Beweis.* Das ist klar. **Zeichnung.** (Ein Weg zwischen  $f(x)$  und  $f(y)$  wird gerade durch  $f \circ \gamma$  gegeben, wobei  $\gamma$  ein Weg von  $x$  nach  $y$  ist).  $\square$

**FOLGERUNG.** Ist  $(X, d)$  wegzusammenhängend, so ist  $(X, d)$  zusammenhängend.

*Beweis.* Sei  $X = U \cup V$  mit  $U, V$  offen und disjunkt. Angenommen  $U \neq \emptyset$  und  $V \neq \emptyset$ . Dann gibt es also  $x \in U$  und  $y \in V$ . Da  $(X, d)$  wegzusammenhängend ist, gibt es einen Weg  $\gamma$  von  $x$  nach  $y$ . Dann ist  $I := [0, 1] = \gamma^{-1}(U) \cup \gamma^{-1}(V)$  eine Zerlegung in offene (in  $I$ ) disjunkte nichtleere Teilmengen. Das ist ein Widerspruch.  $\square$

Im allgemeinen gilt die Umkehrung nicht. In speziellen Fällen aber gilt eine Umkehrung. Das wird im folgenden Theorem behandelt.

**THEOREM.** Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  (bzw.  $U \subset \mathbb{C}^N$ ) offen und zusammenhängend. Dann ist  $U$  auch wegzusammenhängend.

*Beweis.* Sei  $p \in U$  beliebig. Sei  $C_p$  die Menge der  $x \in U$  fuer die eine stetige Kurve  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  existiert mit  $\gamma(0) = p$  und  $\gamma(1) = x$ . Dann gilt: Sei  $R_p := U \setminus C_p$ .

- $C_p$  ist offen, da  $U$  offen ist und jede Kugel wegzusammenhaengend. **Zeichnung**
- $R_p$  ist offen, da  $U$  offen ist und jede Kugel wegzusammenhaengend. **Zeichnung**

Da  $U$  zusammenhaengend ist und  $C_p \neq \emptyset$  gilt, folgt nun  $R_p = \emptyset$ .  $\square$

## 6. Anwendungen - Der Banachsche Fixpunktsatz

In diesem Abschnitt lernen wir den Banachschen Fixpunktsatz kennen, der an vielen Stellen nuetzlich sein kann. Wir skizzieren kurz eine Anwendung (Erzeugung von Fraktalen), bei der kompakte Mengen und Metriken eine grosse Rolle spielen.

**THEOREM.** (*Banachsche Fixpunktsatz*) Sei  $(X, d)$  ein vollstandiger metrischer Raum und  $f : X \rightarrow X$  gegeben. Gibt es eine ein  $0 < c < 1$  mit

$$d(f(x), f(y)) \leq cd(x, y)$$

fuer alle  $x, y \in X$ , so existiert ein eindeutiges  $p \in X$  mit  $f(p) = p$ . Ist  $x \in X$  beliebig und  $(x_n)$  induktiv definiert durch

$$x_0 := x, \text{ und } x_{n+1} := f(x_n)$$

(d.h.  $x_n = f \circ \dots \circ f(x)$ ), so konvergergiert  $(x_n)$  gegen  $p$ , und es gilt die apriori Abschaetzung

$$d(p, x_n) \leq c^n \frac{d(x_0, x_1)}{1 - c}.$$

←  
Ende der 11. Vorlesung.

**Bemerkung** Eine Abbildung  $f$  wie im Theorem heisst Kontraktion mit Kontraktionsfaktor  $c$ . Ein  $p$  wie im Theorem heisst Fixpunkt von  $f$ .

*Beweis.* Wir zeigen Eindeutigkeit, Existenz und die Apriori-Abschaetzung.

*Eindeutigkeit.* Seien  $x, y \in X$  mit  $f(x) = x$  und  $f(y) = y$  geben. Dann gilt

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq cd(x, y).$$

Wegen  $c < 1$  und  $d \geq 0$  folgt  $d(x, y) = 0$ .

*Existenz.* Sei  $x \in X$  beliebig und  $x_n$  wie in der Aussage des Theorem. Dann gilt (Induktion)

$$d(x_j, x_{j+1}) \leq c^j d(x_0, x_1)$$



fuer alle  $j \in \mathbb{N}$  und damit fuer  $n < m$

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq \sum_{j=n}^{m-1} d(x_j, x_{j+1}) \\ &\leq \sum_{j=n}^{m-1} c^j d(x_0, x_1) \\ &\leq c^n d(x_0, x_1) \sum_{j=0}^{m-n-1} c^j \\ &\leq c^n d(x_0, x_1) \frac{1}{1-c}. \end{aligned}$$

Damit ist also  $(x_n)$  eine Cauchy Folge. Aufgrund der Vollstaendigkeit konvergiert dann  $(x_n)$  und fuer den Grenzwert  $p$  gilt

$$d(p, f(p)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, f(x_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_{n+1}) = 0.$$

Damit ist  $p$  ein Fixpunkt.

*Abschaetzung.* Schliesslich gilt aufgrund des schon gezeigten

$$d(p, x_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_m, x_n) \leq c^n d(x_0, x_1) \frac{1}{1-c}.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**Anwendung - Hausdorffmetrik.** Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Wir werden eine Abstandsfunktion auf den (kompakten) Teilmengen von  $(X, d)$  einfuehren und damit die Menge der kompakten Teilmengen zu einem metrischen Raum machen.

Fuer eine Teilmenge  $A$  von  $X$  und  $x \in X$  definiert man

$$d(x, A) := \inf\{d(x, a) : a \in A\}.$$

Aufgrund der Dreiecksungleichung gilt dann (einfach!)

$$d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$$

fuer alle  $x, y \in X$ . Damit ist also fuer gegebenes  $A$  die Abstandsfunktion

$$d_A := d(\cdot, A) : X \longrightarrow \mathbb{R}$$

stetig auf  $X$ . Ist  $A$  abgeschlossen, so gilt weiterhin

$$d(x, A) = 0 \iff x \in A.$$

( $\implies$ :  $x \notin A$  impliziert  $U_r(x) \cap A = \emptyset$  da  $A$  abgeschlossen ist. Damit folgt  $d(x, A) \geq r$ .  $\impliedby$ : klar).

Ist  $A$  kompakt, so gibt es ein  $a \in A$  mit  $d(x, A) = d(x, a)$  und man kann das Infimum durch ein Minimum ersetzen (da die stetig Funktion  $d(x, \cdot) : K \longrightarrow \mathbb{R}$  ihr Minimum annimmt). Sind  $K, L$  kompakte

Teilmengen von  $X$ , so koennen wir nun  $d_K$  und  $d_L$  auf  $L$  bzw  $K$  untersuchen. Diese Funktionen sind stetig (s.o.) und nehmen also auf  $L$  bzw.  $K$  ihr Maximum.

- Es gilt  $\max_K d_L := \max\{d(x, L) : x \in K\} \leq \varepsilon$  genau dann, wenn zu jedem  $x \in K$  ein  $y \in L$  existiert mit  $d(x, y) \leq \varepsilon$ . **Zeichnung.**

- Es gilt  $\max_L d_K := \max\{d(K, y) : y \in L\} \leq \varepsilon$  genau dann, wenn zu jedem  $y \in L$  ein  $x \in K$  existiert mit  $d(x, y) \leq \varepsilon$ . **Zeichnung.**

Fuer kompakte Teilmengen  $K, L$  von  $X$  definiert man dann den Hausdorffabstand

$$d_H(K, L) := \max\{\max_K d_L, \max_L d_K\}.$$

Damit gilt  $d_H(K, L) \leq \varepsilon$  genau dann, wenn zu jedem  $x \in K$  ein  $y_x \in L$  existiert mit  $d(x, y_x) \leq \varepsilon$  und umgekehrt zu jedem  $y \in L$  ein  $x_y \in K$  existiert mit  $d(x_y, y) \leq \varepsilon$ .

**THEOREM.** *Ist  $(X, d)$  ein vollstaendiger metrischer Raum, so ist die Menge  $\mathcal{K}(X)$  der kompakten Teilmengen von  $X$  mit der Hausdorffmetrik  $d_H$  ein vollstaendiger metrischer Raum.*

*Beweis.* Beweis nicht hier. (Evtl. in Uebung).  $\square$

**FOLGERUNG.** *(Erzeugung von Fraktalen) Ist  $(X, d)$  ein vollstaendiger metrischer Raum und  $F : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathcal{K}$  eine Kontraktion. Dann gibt genau eine kompakte Menge  $K$  in  $X$  mit  $F(K) = K$ .*

*Beweis.* Das folgt sofort aus dem Banachschen Fixpunktsatz und dem vorangegangenen Theorem.  $\square$

Eine kleine Rechnung zeigt folgende interessante Eigenschaft der Hausdorffmetrik.

**PROPOSITION.**

$$d_H(A \cup B, C \cup D) \leq \max\{d_H(A, C), d_H(B, D)\}.$$

**Anwendung.** Sei  $X = \mathbb{R}$  mit der Euklidischen Metrik und

$$F : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}, \quad F(K) = \frac{1}{3}K + (2/3 + \frac{1}{3}K).$$

Dann ist gilt (kleine Rechnung)

$$d_H(F(L), F(K)) \leq \frac{1}{3}d(K, L).$$

Damit hat also  $F$  nach dem Banachschen Fixpunktsatz einen Fixpunkt  $C$  und fuer  $C$  gilt

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} F \circ \dots \circ F(K)$$

fuer jedes kompakte  $K$  in  $\mathbb{R}$ .

Wir 'bestimmen' den Fixpunkt auf zwei Arten, naemlich durch Wahl von  $K_0 = [0, 1]$  und  $K_0 = \{0\}$ . **Zeichnung.**

Der Fixpunkt ist die uns aus dem ersten Semester schon vertraute Cantormenge.

## Differenzierbarkeit im Höherdimensionalen

In diesem Kapitel geht es um Funktionen von Teilmengen des  $\mathbb{R}^N$  nach  $\mathbb{R}^M$ . Dabei werden  $\mathbb{R}^N$  und  $\mathbb{R}^M$  als metrische Räume mit der Euklidischen Metrik aufgefasst. Ein wesentlicher Inhalt dieses Kapitels ist die Untersuchung von Differenzierbarkeit solcher Funktionen. Anschaulich bedeutet die Differenzierbarkeit von  $f$ , dass sich  $f$  gut durch eine lineare Abbildung, seine Ableitung, approximieren lässt.

### 1. Zum Aufwärmen: Stetigkeit von Funktionen von $\mathbb{R}^N$ nach $\mathbb{R}^M$

Es geht um Funktionen von Teilmengen  $U$  des  $\mathbb{R}^N$  nach  $\mathbb{R}^M$  (mit geeigneten  $N$  und  $M$ ). Den Fall  $N = M = 1$  haben wir im vergangenen Semester schon untersucht.

Eine Funktion  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  lässt sich offenbar schreiben als  $f(x) = (f_1(x), \dots, f_M(x))$  mit  $f_j : U \rightarrow \mathbb{R}$ . Es ist  $f$  stetig, genau dann, wenn jedes  $f_j$  stetig ist (siehe Übung). Einige spezielle Situationen haben eigene Namen:

- Ist  $U \subset \mathbb{R}$  ein Intervall, so heisst  $\gamma : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  eine Kurve.  
**Zeichnung.**

Beispiel: Es ist  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^M, t \mapsto p + tv$  eine stetige Kurve (für gegebenes  $p \in \mathbb{R}^M$  und  $v \in \mathbb{R}^M$ ).

- Ist  $U \subset \mathbb{R}^N$ , so heisst  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  eine skalare Funktion.  
**Zeichnung.**

Beispiel: Es sind die Koordinatenfunktionen  $\pi_j : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}, (\xi_1, \dots, \xi_N) \mapsto \xi_j$  stetige skalare Funktionen.

- Ist  $U \subset \mathbb{R}^N$ , so heisst  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^N$  ein Vektorfeld auf  $U$ .  
**Zeichnung.**

Beispiel: Es liefert die Identität  $id : U \rightarrow \mathbb{R}^N, x \mapsto x$ , ein stetiges Vektorfeld.

Hält man für  $f : U \subset \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$  alle Variablen bis auf eine - z.B. die  $j$ -te fest, so erhält man die *partiellen Funktionen*

$$t \mapsto f(\xi_1, \dots, \xi_{j-1}, t, \xi_{j+1}, \dots, \xi_N).$$

Genauer definiert man mit der Standard Normalbasis  $(e_j)$  im  $\mathbb{R}^N$  zu  $p \in U$  und jedem  $j \in \{1, \dots, N\}$  die sogenannte partielle Funktion

$$f_{p,j} : \{t \in \mathbb{R} : p + te_j \in U\} \rightarrow \mathbb{R}^M, f_{p,j}(t) := f(p + te_j).$$

Dann heisst  $f$  *partiell stetig in  $p$* , wenn  $f_{p,j}$  stetig ist fuer alle  $j = 1, \dots, N$ . Gilt das fuer alle  $p \in U$ , so heisst  $f$  *partiell stetig*.

Allgemeiner kann man zu jedem Einheitsvektor  $e \in \mathbb{R}^N$  und jedem  $p \in U$  die Funktion

$$f_{p,e} : \{t \in \mathbb{R} : p + te \in U\} \longrightarrow \mathbb{R}^M, f_{p,e}(t) := f(p + te),$$

definieren. Dann heisst  $f$  *richtungsstetig in  $p$* , wenn fuer alle Einheitsvektoren  $e \in \mathbb{R}^N$ , die Funktion  $f_{p,e}$  stetig ist. Gilt dies fuer alle  $p \in U$ , so heisst  $f$  *richtungsstetig*.

Offenbar gilt folgende Proposition. (Uebung)

**PROPOSITION.**  $f$  stetig (in  $p$ )  $\implies f$  richtungsstetig (in  $p$ )  $\implies f$  partiell stetig (in  $p$ ).

*Beweis.* Die Funktionen  $f_{p,e}$  koennen als Verknuepfung von  $f$  mit geeigneten Kurven  $\gamma$  dargestellt werden.  $\square$

**Bemerkung.** Die Umkehrung ist aber nicht wahr. (Uebung)

←  
Ende der 12. Vorlesung

Schliesslich erinnern wir zum Abschluss noch an das Konzept des Grenzwertes (vgl. Analysis I, bzw. Betrachtungen zu metrischen Raeumen): Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^M$  gegeben. Sei  $p \in \bar{U}$  (d.h.  $p$  ist Grenzwert einer Folge in  $U$ ). Dann hat  $f$  bei  $p$  den Grenzwert  $c \in \mathbb{R}^M$  geschrieben als

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = c$$

genau dann, wenn gilt

- $f(x_n) \rightarrow c$  fuer jede Folge  $(x_n)$  in  $U$  mit  $x_n \rightarrow p$ .

bzw. aequivalent, wenn gilt

- zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein  $\delta > 0$  existiert mit  $|f(x) - c| \leq \varepsilon$  fuer alle  $x \in U$  mit  $|x - p| \leq \delta$ .

Entsprechend schreibt man  $\lim_{x \rightarrow p, x \neq p} f(x) = c$ , falls fuer die Einschraenkung  $f|_{U \setminus \{p\}}$  von  $f$  auf  $U \setminus \{p\}$  gilt

$$\lim_{x \rightarrow p} f|_{U \setminus \{p\}}(x) = c.$$

## 2. Definition der Ableitung und einfache Eigenschaften

Es geht um lineare Approximationen. Die Ableitung ist die lineare Approximation.

Aus dem ersten Semester wissen wir, dass fuer  $f : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$  und  $p \in (a, b)$  aequivalent sind:

- $f'(p) := \lim_{x \rightarrow p} (f(x) - f(p))/(x - p)$  existiert.
- Es gilt  $f(x) = f(p) + c(x - p) + \varphi(x)$  mit  $\varphi(x)/(x - p) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow p$ .

In diesem Fall heisst  $f$  differenzierbar in  $p$ . Wir werden das nun auf höherdimensionale Situationen verallgemeinern. Dabei gehen wir von der im zweiten Punkt praesentierten Variante aus (da die Division durch  $x - p$  im höherdimensionalen keinen Sinn hat).

DEFINITION. Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  gegeben. Sei  $p \in U$ . Dann heisst  $f$  in  $p$  differenzierbar, wenn eine lineare Abbildung  $L : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$  existiert mit

$$f(x) = f(p) + L(x - p) + \varphi_p(x),$$

sodass für den Fehler

$$\varphi_p(x) = f(x) - f(p) - L(x - p)$$

gilt

$$\frac{\varphi_p(x)}{|x - p|} \rightarrow 0, x \rightarrow p.$$

In diesem Fall heisst  $L$  Ableitung von  $f$  in  $p$  und man schreibt  $Df(p) = L$ . Ist  $f$  in jedem  $p \in U$  differenzierbar, so heisst  $f$  auf ganz  $U$  differenzierbar.

### Bemerkung.

- Ist  $f$  differenzierbar in  $p$ , so wird es also 'sehr gut' durch die linear (affine) Funktion

$$f(p) + L(\cdot - p)$$

approximiert.

- Die Offenheit von  $U$  kommt ins Spiel, da wir  $f$  von allen 'Seiten' approximieren koennen wollen. Das werden wir spaeter im Konzept der Richtungsableitung noch genauer machen (s.u.).
- Im Falle einer Funktion von  $U \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist die lineare Abbildung  $L$  gerade durch eine Zahl gegeben (lineare Abbildung von  $\mathbb{R}$  nach  $\mathbb{R}$ ). Diese Zahl ist die uns schon aus dem ersten Semester bekannte Ableitung.

PROPOSITION. In der Situation der Definition ist  $L$  eindeutig.

Beweis. Es gebe  $L_1$  und  $L_2$  mit

$$f(x) = f(p) + L_1 \cdot (x - p) + \varphi_1(x)$$

$$f(x) = f(p) + L_2 \cdot (x - p) + \varphi_2(x)$$

und  $\varphi_j(x)/|x - p| \rightarrow 0, x \rightarrow p, j = 1, 2$ . Dann gilt

$$(L_1 - L_2)(x - p) = \varphi_1(x) - \varphi_2(x) = \frac{\varphi_1(x) - \varphi_2(x)}{|x - p|} |x - p|$$

Betrachtet man  $x = p + hy$  mit  $h \in \mathbb{R}, h \neq 0$  und  $y \in \mathbb{R}^N$ , so gilt also

$$(L_1 - L_2)(hy) = \frac{\varphi_1(x) - \varphi_2(x)}{|hy|} |hy|$$

und damit

$$(L_1 - L_2)y = \frac{\varphi_1(x) - \varphi_2(x)}{|hy|} \frac{|hy|}{h} \rightarrow 0.$$

Also ( $h \rightarrow 0$ )

$$(L_1 - L_2)y = 0.$$

Da  $y$  beliebig war, folgt  $L_1 = L_2$ .  $\square$

**Beispiel - Lineare Funktion.** Sei  $A : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$  linear,  $a \in \mathbb{R}^M$  und  $q \in \mathbb{R}^N$  gegeben. Dann ist die Funktion

$$f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M, f(x) = a + A(x - q)$$

differenzierbar und es gilt  $Df(x) = A$  fuer alle  $x \in \mathbb{R}^N$ .

Bew. Es gilt  $f(x) - f(p) = A(x - p)$ , also

$$f(x) = f(p) + A(x - p) + 0.$$

Damit folgt die Differenzierbarkeit (mit  $L = A$  und  $\varphi = 0$ ).

**THEOREM.** (*Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit*) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  gegeben. Ist  $f$  in  $p$  differenzierbar, so ist es dort auch stetig.

*Beweis.* Es gilt (fuer  $x \neq p$ )

$$f(x) = f(p) + L(x - p) + \varphi(x) = f(p) + L(x - p) + \frac{\varphi(x)}{|x - p|} |x - p|.$$

Damit sieht man, dass rechte Seite gegen  $f(p)$  konvergiert fuer  $x \rightarrow p$ .  $\square$

Wir haben nun die Ableitung  $L$  charakterisiert. Als Nächstes soll es darum gehen, wie man diese lineare Funktion berechnet.

**THEOREM.** (*Berechnen der Ableitung*) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  differenzierbar in  $p \in U$ . Dann existieren die partiellen Ableitungen

$$D_j f_i(p) := \partial_j f_i(p) := \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p) := \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{1}{h} (f_i(p + h e_j) - f_i(p))$$

für  $i = 1, \dots, M$ ,  $j = 1, \dots, N$  und die Ableitung  $L$  wird bzgl. der Standardbasen in  $\mathbb{R}^N$  bzw.  $\mathbb{R}^M$  durch die Jacobi-Matrix / Differentialmatrix

$$\left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p) \right)_{i,j} = (\dots).$$

gegeben.

**Bemerkung.** Die partielle Ableitung von  $f_i$  nach  $x_j$  in  $p$  ist also gerade die 'gewöhnliche' Ableitung der partiellen Funktion

$$t \mapsto f_i(p + t e_j).$$

*Beweis.* Nach Voraussetzung gilt

$$f(x) = f(p) + L(x - p) + \varphi(x)$$

mit  $\frac{\varphi(x)}{|x-p|} \rightarrow 0$  und  $L = (L_{i,j})$ . Wir setzen  $x = p + he_j$  und betrachten die  $i$ -te Komponente. Fuer diese gilt

$$f_i(p + he_j) = f_i(p) + (L(he_j))_i + \varphi_i(x).$$

Das impliziert

$$f_i(p + he_j) - f_i(p) = h(L_{i,j}) + \varphi_i(x).$$

Damit folgt nach Division durch  $h$  also

$$\frac{f_i(p + he_j) - f_i(p)}{h} = L_{i,j} + \frac{\varphi_i(p + he_j)}{h}$$

Wegen  $\frac{|\varphi_i(p+he_j)|}{|h|} = \frac{|\varphi_i(p+he_j)|}{|x-p|} \rightarrow 0, h \rightarrow 0$ , folgt

$$\frac{f_i(p + he_j) - f_i(p)}{h} \rightarrow L_{i,j}, h \rightarrow 0.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

### Bemerkung.

- Die partiellen Ableitungen werden gebildet, indem man alle Variablen bis auf eine festhaelt und dann nach dieser einen so ableitet, wie wir es im ersten Semester gelernt haben.
- Der Satz beschreibt, wie man die Ableitung von  $f$  ausrechnet, wenn man schon weiss, dass  $f$  differenzierbar ist. Der Satz besagt NICHT, dass  $f$  differenzierbar ist, wenn die partiellen Ableitungen existieren (und das ist im allgemeinen auch falsch (siehe Uebung)).

**Notation.** Ist  $f : U \subset \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  partiell differenzierbar in  $p \in U$ , so nennt man den Vektor  $(\partial_1 f(p), \dots, \partial_N f(p))^t$  den Gradienten von  $f$  in  $p$  und schreibt ihn als  $\nabla f(p)$ . Ist  $f$  differenzierbar, so ist also  $Df(p) = \nabla f(p)^t$ .

### Beispiele.

- $f : U \subset \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $p$ . Dann ist:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(p) + Df(p)(x - p) + \varphi(x) \\ &= f(p) + \langle \nabla f(p), x - p \rangle + \varphi(x) \end{aligned}$$

mit  $\varphi(x)/|x - p| \rightarrow 0, x \rightarrow p$ .

- Sei  $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^N$  gegeben. Dann ist  $\gamma$  differenzierbar in  $t_0 \in (a, b)$  genau dann, wenn

$$\gamma'(t_0) := \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{1}{t - t_0} (\gamma(t) - \gamma(t_0))$$

existiert (Uebung). Dann gilt

$$\gamma(t) = \gamma(t_0) + \gamma'(t_0)(t - t_0) + \varphi(t)$$

mit  $\varphi(t)/(t - t_0) \rightarrow 0, t \rightarrow t_0$ . Insbesondere haben wir für  $\gamma(t) = t_0 + vt$ ,

$$\gamma'(t) = v.$$



Tatsächlich kann man in diesem Fall auch  $\gamma : [a, b] \rightarrow U$  betrachten und die Ableitung von  $\gamma$  in  $a$  bzw.  $b$  durch den obigen Grenzwert definieren (wenn der Grenzwert existiert) (vgl. Übung).

- Ist  $f : \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x|$ , so gilt (Übung)

$$\partial_j f(x) = \frac{x_j}{|x|}, \text{ also } \nabla f(x) = \frac{x}{|x|}$$

Tatsächlich (s.u.) ist  $f$  in diesem Fall differenzierbar.

Wir lernen als nächstes einige Rechenregeln für die Ableitung kennen.

← Ende der 13. Vorlesung →

**THEOREM.** (Kettenregel) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$ ,  $V \subset \mathbb{R}^M$  offen und  $f : U \rightarrow V$ ,  $g : V \rightarrow \mathbb{R}^L$  gegeben. Sind  $f$  in  $p$  und  $g$  in  $f(p)$  differenzierbar, so ist  $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^L$  differenzierbar in  $p$ , und es gilt

$$D(g \circ f)(p) = Dg(f(p))Df(p).$$

Insbesondere gilt

$$D(g \circ f)_{ij}(p) = \partial_j(g \circ f)_i = \sum_{k=1}^M \partial_k g_i(f(p)) \partial_j f_k(p).$$

**Bemerkung.** Ableitung der Komposition ist also die Komposition der Ableitungen. Diese Komposition wird auf der Ebene von Matrizen durch das Produkt der Matrizen gegeben. Die Reihenfolge der Matrizen ist dabei natürlich wichtig.

*Beweis.* Es reicht die erste Aussage zu zeigen. Das 'Insbesondere' folgt dann durch Einsetzen. Mit  $q = f(p)$  gilt nach Voraussetzung:

$$f(x) = f(p) + Df(p)(x - p) + \varphi_f(x)$$

mit  $\frac{\varphi_f(x)}{|x-p|} \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow p$  und

$$g(y) = g(q) + Dg(q)(y - q) + \varphi_g(y)$$

mit  $\frac{\varphi_g(y)}{|y-q|} \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow q$

also gilt für  $h(x) = g(f(x))$  (mit weiterhin  $f(p) = q$ )

$$\begin{aligned} h(x) &= \underbrace{g(f(p))}_{h(p)} + Dg(f(p))(f(x) - f(p)) + \varphi_g(f(x)) \\ &= h(p) + Dg(f(p))(Df(p)(x - p) + \varphi_f(x)) + \varphi_g(f(x)) \\ &= h(p) + Dg(f(p))Df(p)(x - p) + Dg(f(p))\varphi_f(x) + \varphi_g(f(x)) \\ &= h(p) + Dg(f(p))Df(p)(x - p) + \varphi(x) \end{aligned}$$

mit

$$\varphi(x) = Dg(f(p))\varphi_f(x) + \varphi_g(f(x)) =: T(x) + S(x).$$

Es bleibt zu zeigen, dass gilt

$$\frac{\varphi(x)}{|x-p|} \rightarrow 0, x \rightarrow p.$$

Das machen wir nun: Es gilt

$$\frac{T(x)}{|x-p|} = \frac{1}{|x-p|} Dg(f(p))\varphi_f(x) = \underbrace{Dg(f(p))}_{\text{beschränkt}} \underbrace{\frac{\varphi_f(x)}{|x-p|}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0.$$

Fuer den zweiten Term gilt

$$\frac{S(x)}{|x-p|} = \frac{1}{|x-p|} \varphi_g(f(x)) = \frac{\varphi_g(f(x))}{|f(x)-f(p)|} \frac{|f(x)-f(p)|}{|x-p|}$$

falls  $f(x) \neq f(p)$ . (Falls  $f(x) = f(p)$  gilt  $\varphi_g(f(x)) = \varphi_g(f(p)) = 0$  und es ist nichts zu zeigen.) Nun gilt aber

$$\frac{\varphi_g(f(x))}{|f(x)-f(p)|} \rightarrow 0, x \rightarrow p \quad (\text{da } f(x) \rightarrow f(p) \text{ für } x \rightarrow p)$$

und es bleibt

$$\frac{|f(x)-f(p)|}{|x-p|} \leq \frac{|Df(p)(x-p) + \varphi_f(x)|}{|x-p|} \leq \frac{|Df(p)(x-p)|}{|x-p|} + \frac{|\varphi_f(x)|}{|x-p|}$$

beschränkt für  $x \rightarrow p$ . Damit folgt

$$\frac{|T(x) + S(x)|}{|x-p|} \rightarrow 0, x \rightarrow p.$$

Das beendet den Beweis. □

**Beispiel.** Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $\gamma : (a, b) \rightarrow U$  differenzierbar in  $t_0$  und  $f : U \subset \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $\gamma(t_0)$ . Dann ist  $f \circ \gamma$  differenzierbar und es gilt

$$(f \circ \gamma)'(t) = \sum_{k=1}^N \partial_k f(\gamma(t_0)) \gamma'_k(t_0) = \langle \nabla f(\gamma(t_0)), \gamma'(t_0) \rangle.$$

Fuer  $\gamma : [a, b] \rightarrow U$  gilt eine entsprechende Formel auch in  $a$  bzw.  $b$ , wenn  $\gamma$  in  $a$  bzw.  $b$  differenzierbar ist (s.o.).

**Beispiel.**  $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^{N+1}$ ,  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_N(t), t)$ .  
 $F : \mathbb{R}^{N+1} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, t) \mapsto F(x, t)$ , differenzierbar. Dann gilt

$$(F \circ \gamma)'(t) = \sum_{k=1}^N \partial_k F(\gamma(t_0)) \gamma'_k(t_0) + \partial_{N+1} F(\gamma(t_0)).$$

(Das wird manchmal unter dem Begriff der totalen Ableitung von  $F$  gefasst.)

**Beispiel.**  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar,  $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = g(|x|)$ .  
 Dann ist  $f$  in  $x \neq 0$  differenzierbar, und es gilt  $Df(p) = g'(|p|) \frac{1}{|p|} p$ .  
 (Hier haben wir die weiter unten bewiesene Differenzierbarkeit der Betragsfunktion in  $p \neq 0$  benutzt.)

**THEOREM.** (*Produktregel*) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $p \in U$ . Dann ist auch  $fg : U \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $p$ , und es gilt

$$D(fg)(p) : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto g(p)\langle \nabla f(p), y \rangle + f(p)\langle \nabla g(p), y \rangle.$$

Insbesondere ist also

$$\partial_j(gf)(p) = f(p)(\partial_j g)(p) + g(p)\partial_j f(p)$$

für alle  $j = 1, \dots, N$ .

*Beweis.* Es reicht die erste Aussage zu beweisen. Die 'Insbesondere'-Aussage folgt dann durch Einsetzen von  $e_j$ .

Nach Voraussetzung gilt

$$f(x) = f(p) + Df(p)(x - p) + \varphi_f(x)$$

mit  $\varphi_f(x)/|x - p| \rightarrow 0, x \rightarrow p$ , und

$$g(x) = g(p) + Dg(p)(x - p) + \varphi_g(x)$$

mit  $\varphi_g(x)/|x - p| \rightarrow 0, x \rightarrow p$ . Damit folgt

$$g(x)f(x) = g(p)f(p) + (Dg(p)(x - p))f(p) + g(p)Df(p)(x - p) + \varphi,$$

wobei  $\varphi$  aus Termen besteht, die mindestens den Faktor  $\varphi_f(x)$  bzw.  $\varphi_g(x)$  oder zweimal den Faktor  $(x - p)$  enthalten. Also gilt

$$\frac{\varphi(x)}{|x - p|} \rightarrow 0, x \rightarrow p$$

und die Aussage folgt.  $\square$

Wir gehen nun noch auf eine geometrische Deutung des Gradienten ein. Dazu benötigen wir noch ein Konzept.

**DEFINITION** (Richtungsableitung). Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben. Sei  $p \in U$  und  $e$  ein beliebiger Einheitsvektor in  $\mathbb{R}^N$ . Sei  $\delta > 0$  mit  $p + te \in U$  für  $t \in (-\delta, \delta)$ . Sei  $g : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}, g(t) = f(p + te)$ . Ist  $g$  differenzierbar in 0, so heißt der Grenzwert

$$\partial_e f(p) := g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}(g(t) - g(0)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}(f(p + te) - f(p))$$

die Richtungsableitung von  $f$  in  $p$  in Richtung  $e$ . **Zeichnung.**

**LEMMA** (Geometrische Deutung Gradient). Sei  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $p$ . Dann gilt:

- Es ist  $\nabla f(p)$  senkrecht auf der Konstanzfläche  $M := \{y : f(y) = f(p)\}$  (d.h. ist  $\gamma : I \rightarrow M$  stetig differenzierbar, mit  $\gamma(0) = p$ , so gilt  $\langle \gamma'(0), \nabla f(p) \rangle = 0$ . **Zeichnung.** (siehe unten)
- Es gilt  $\partial_e f(p) = \langle \nabla f(p), e \rangle$  für alle  $e \in \mathbb{R}^N$ .

- Ist  $\nabla f(p) \neq 0$ , so zeigt  $\nabla f(p)$  in die Richtung in der  $f$  am stärksten wächst (d.h. die Richtungsableitung von  $f$  in der Richtung von  $\nabla f(p)$  ist maximal unter den Richtungsableitungen).

← Ende der 14. Vorlesung

**Bemerkung.** Da  $f$  differenzierbar ist, gilt  $f(q) = f(p) + t\langle \nabla f(p), q - p \rangle + \text{kleiner Fehler}$ . Für die Funktion  $q \mapsto f(p) + \langle \nabla f(p), (1-p) \rangle$  sind die entsprechenden Aussagen des Lemma klar.

*Beweis.* Nach der Kettenregel gilt für jedes differenzierbare  $\gamma : (-\delta, \delta) \rightarrow U$  mit  $\gamma(0) = p$

$$\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(0) = \langle \nabla f(p), \gamma'(0) \rangle.$$

Mit  $\gamma(t) = p + te$  folgt also

$$\partial_e f(p) = \frac{d}{dt} f \circ \gamma(t_0) = \langle \nabla f(p), e \rangle.$$

Das beweist den zweiten Punkt.

Ist andererseits  $\gamma$  eine Kurve mit Werten in  $M$  so gilt also  $f \circ \gamma = \text{constant}$  und es folgt (mit obigem)

$$0 = \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t) = \langle \nabla f(p), \gamma'(0) \rangle.$$

Das beweist den ersten Punkt.

Für jeden Richtungsvektor  $e$  gilt

$$|\partial_e f(p)| = |\langle \nabla f(p), e \rangle| \leq |\nabla f(p)|$$

und für  $e = \frac{1}{|\nabla f(p)|} \nabla f(p)$  gilt dann

$$|\partial_e f(p)| = |\langle \nabla f(p), \frac{1}{|\nabla f(p)|} \nabla f(p) \rangle| = \frac{1}{|\nabla f(p)|} |\nabla f(p)|^2 = |\nabla f(p)|.$$

Damit folgt die letzte Aussage.  $\square$

**Beispiel.** Sei  $f : \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ ,  $f(x) = |x|$ . Dann gilt  $Df(x) = \nabla f(x) = \frac{1}{|x|}x$ . Das ist in der Tat der Einheitsvektor in Richtung des stärksten Anstieges von  $f$ . **Zeichnung.** (Konstanzflächen sind Sphären).

Bisher haben wir unter der Annahme der Differenzierbarkeit von  $f$  gearbeitet. Hier lernen wir nun ein (d a s) Kriterium kennen, das die Differenzierbarkeit von  $f$  liefert.

**THEOREM.** (Stetigkeit der partiellen Ableitung impliziert Differenzierbarkeit) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  gegeben. Existieren die partiellen Ableitungen

$$\partial_j f_i(q) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(q) = \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{1}{h} (f_i(q + he_j) - f_i(q))$$

für alle  $q \in U$ ,  $i = 1, \dots, M$ ,  $j = 1, \dots, N$  und sind stetig in  $p \in U$ , so ist  $f$  differenzierbar in  $p$ .

**Bemerkung.** In der Situation des Theorem ist die Ableitung natürlich durch die Jacobimatrix / Differentialmatrix  $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p)\right)_{i,j}$  gegeben.

*Beweis.* Sei  $L$  die durch die Matrix  $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p)\right)_{i,j}$  induzierte Abbildung. Zu zeigen:

$$\frac{1}{|x-p|} |f(x) - f(p) - L(x-p)| \rightarrow 0, x \rightarrow p.$$

Wir zeigen: Zu jedem  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$  mit

$$\frac{1}{|x-p|} |f(x) - f(p) - L(x-p)| \leq \varepsilon$$

für alle  $|x-p| \leq \delta$ . Sei also  $\varepsilon > 0$  gegeben.

Wir setzen

$$t = (\tau_1, \dots, \tau_N) := x - p.$$

Für  $i = 1, \dots, M$  ist dann die  $i$ -te Komponente von  $f(x) - f(p) - L(x-p)$  gegeben durch

$$f_i(x) - f_i(p) - \sum_{j=1}^N \partial_j f_i(p) \tau_j.$$

Aufgrund der Stetigkeit der  $\partial_j f_i$  existiert ein  $\delta > 0$  mit

$$|\partial_j f_i(x) - \partial_j f_i(p)| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{M \cdot N}} \quad (*)$$

für alle  $x \in U$  mit  $|x-p| < \delta$ . Sei nun  $x \in U_\delta(p)$  und

$$t = (\tau_1, \dots, \tau_N) := x - p$$

und

$$t_j := (\tau_1, \dots, \tau_j, 0, \dots, 0) = \sum_{l=1}^j \tau_l e_l, \quad t_0 = 0$$

für  $j = 0, \dots, N$ . Dann gilt (Teleskopsumme)

$$f_i(x) - f_i(p) = \sum_{j=1}^N (f_i(p+t_j) - f_i(p+t_{j-1})). \quad (T)$$

**Zeichnung.** Nach dem 1-dimensionalen Mittelwertsatz der Differentialrechnung existieren  $\sigma_{j,i}$  zwischen 0 und  $\tau_j$  mit

$$f_i(p+t_j) - f_i(p+t_{j-1}) = f_i(p+t_{j-1} + \tau_j e_j) - f_i(p+t_{j-1}) = \tau_j \partial_j f_i(p+t_{j-1} + \sigma_{j,i} e_j)$$

für  $j = 1, \dots, N$ ,  $i = 1, \dots, M$ . Mit (\*) folgt dann

$$|f_i(p+t_j) - f_i(p+t_{j-1}) - \tau_j \partial_j f_i(p)| \leq |\tau_j| |\partial_j f_i(p+t_{j-1} + \sigma_{j,i} e_j) - \partial_j f_i(p)| \stackrel{(*)}{\leq} |x-p| \frac{\varepsilon}{\sqrt{MN}}.$$

Mit (T) und dieser Abschätzung folgt

$$|f_i(x) - f_i(p) - \sum_{j=1}^N \partial_j f_i(p) \tau_j| \leq \sum_{j=1}^N |f_i(p+t_j) - f_i(p+t_{j-1}) - \tau_j \partial_j f_i(p)| \leq |x-p| \frac{\varepsilon}{\sqrt{M}}.$$

Damit ergibt sich für  $x$  mit  $|x-p| < \delta$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(p) - L(x-p)|^2 &= \sum_{i=1}^M |f_i(x) - f_i(p) - \sum_{j=1}^N \partial_j f_i(p) \tau_j|^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^M \left| |x-p| \frac{\varepsilon}{\sqrt{M}} \right|^2 \\ &\leq |x-p|^2 \varepsilon^2. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\frac{1}{|x-p|} |f(x) - f(p) - L(x-p)| \leq \varepsilon.$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**DEFINITION.** Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  gegeben. Existieren für alle  $p \in U$  die partiellen Ableitungen

$$\partial_j f_i(p) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p) := \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{1}{h} (f_i(p + h e_j) - f_i(p))$$

für  $i = 1, \dots, M$ ,  $j = 1, \dots, N$  und sind stetig in  $p \in U$ , so heißt  $f$  stetig differenzierbar (auf  $U$ ).

Wir schließen diesen Abschnitt mit einer Diskussion von Mittelwertsätzen ab.

**THEOREM.** (Mittelwertsatz) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar, und seien  $x, y \in U$  mit  $x + t(y-x) \in U$  für  $t \in [0, 1]$  gegeben. Dann existiert ein  $\vartheta \in (0, 1)$ , sodass

$$f(y) - f(x) = Df(x + \vartheta(y-x))(y-x).$$

**Bemerkung.**

- Ist  $U$  konvex, so gilt  $x + t(y-x) \in U$  für alle  $x, y \in U$  (und umgekehrt). Da alle Kugeln konvex sind, gilt der obige Satz also insbesondere lokal (d.h. jedes  $x \in U$  hat eine Umgebung  $U_r(x)$ , in der der Satz gilt).
- Es ist wesentlich (siehe Übung), dass der Wertebereich von  $f$  im eindimensionalen  $\mathbb{R}$  enthalten ist.

*Beweis.* Sei  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ ,  $\gamma(t) = x + t(y-x)$  und

$$h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, h = f \circ \gamma.$$

Dann ist  $h$  stetig auf  $[0, 1]$  und nach Kettenregel differenzierbar auf  $(0, 1)$  mit

$$h'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle.$$

Der eindimensionale Mittelwertsatz liefert dann

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &= h(1) - h(0) \\ (1 - \dim MWS) &= h'(\vartheta)(1 - 0) \\ (\gamma'(t) = y - x) &= \langle \nabla f(x + \vartheta(y - x)), y - x \rangle \\ &= Df(x + \vartheta(y - x))(y - x). \end{aligned}$$

□

Der Satz hat Konsequenzen für Funktionen  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$ .

**FOLGERUNG.** Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  differenzierbar. Dann gilt:

- (a) Gilt  $|\partial_k f_i(z)| \leq C$  für alle  $z \in U$  und  $1 \leq k \leq N$ ,  $1 \leq i \leq M$ , so gilt

$$|f(y) - f(x)| \leq C\sqrt{MN}|y - x|$$

für alle  $x, y$ , deren Verbindungstrecke ganz in  $U$  liegt.

- (b) Für alle  $x, y \in U$ , deren Verbindungstrecke ganz in  $U$  liegt existiert ein  $\xi$  der Form  $x + \vartheta(y - x)$  für  $\vartheta \in (0, 1)$  mit

$$|f(y) - f(x)| \leq \|Df(\xi)\| |y - x|.$$

- (c) Ist  $U$  zusammenhängend und  $Df(x) = 0$  für alle  $x \in U$ , so folgt  $f \equiv \text{constant}$  auf  $U$ .

**Erinnerung:**  $\|L\| := \sup\{|Lx| : |x| \leq 1\}$ . Es gilt  $|Lx| \leq \|L\||x|$ .

*Beweis.* (a) Nach dem vorangehenden Mittelwertsatz gibt es  $\vartheta_i \in (0, 1)$ ,  $i = 1, \dots, d$  mit

$$|f_i(y) - f_i(x)| = |\langle \nabla f_i(x + \vartheta_i(y - x)), (y - x) \rangle| \leq \sum_{j=1}^N C|y_j - x_j| \leq C\sqrt{N}|y - x|.$$

(Hier wurde Cauchy Schwartz in der letzten Abschätzung benutzt). Damit folgt dann sofort

$$|f(y) - f(x)| = \left( \sum_{i=1}^M |f_i(y) - f_i(x)|^2 \right)^{1/2} \leq C\sqrt{NM}|y - x|.$$

(b) *Spezialfall.* Es gilt  $f_i(x) = f_i(y)$  für alle  $i \neq 1$ . Dann folgt aus obigem Mittelwertsatz

$$|f(y) - f(x)| = |f_1(y) - f_1(x)| = |\langle \nabla f_1(x + \vartheta(y - x)), (y - x) \rangle| \leq \|Df(\xi)\| |y - x|.$$

*Allgemeiner Fall.* Sei  $U$  eine Drehung, sodass  $Uf(y)$  und  $Uf(x)$  sich höchstens in der ersten Komponente unterscheiden (drehe so, dass

$f(x)$  auf die  $\xi_2$ -Achse gedreht wird und die von  $f(x), f(y)$  aufgespannte Ebene die  $\xi_1, \xi_2$  Ebene wird). Dann gilt mit  $f^* := Uf$  nach dem Spezialfall

$$|f(y) - f(x)| = |f^*(y) - f^*(x)| \leq \|Df^*(\xi)\| |y - x| = \|UDf(\xi)\| |y - x| = \|Df(\xi)\| |y - x|.$$

←  
Ende der 15. Vorlesung.

(c) Da  $U$  offen und zusammenhängend ist, ist es wegzusammenhängend. Sei nun  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  mit  $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$  gegeben. Da  $U$  offen ist und  $\gamma$  stetig, können wir ohne Einschränkung annehmen, dass  $\gamma$  stückweise linear ist, d.h. es gibt  $p = x, x_1, \dots, x_n = y \in U$ , so dass  $\gamma$  durch die Verbindungsstrecken zwischen  $x_i$  und  $x_{i+1}$  beschrieben ist. Dann gilt nach (a) oder (b)  $f(x_i) = f(x_{i+1})$ . Damit folgt die Behauptung.  $\square$

### 3. Höhere Ableitungen und der Satz von Taylor

Es heisst  $f$  stetig differenzierbar, wenn die partiellen Ableitungen aller  $f_i, i = 1, \dots, m$  existieren und stetig sind. Ist  $f$  einmal stetig differenzierbar und existieren alle ersten Ableitungen der partiellen Ableitungen  $D_j f_i$  und sind stetig, so nennt man  $f$  zweimal stetig differenzierbar und nennt die  $D_i D_j f_k$  die zweiten partiellen Ableitungen von  $f$ . Induktiv definiert man dann die  $(q + 1)$ -ten partiellen Ableitungen von  $f$  als die ersten Ableitungen der  $p$ -ten Ableitungen  $D_{i_1} \dots D_{i_q} f$  (falls existent).

DEFINITION. Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen. Die Funktion  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$  heisst  $q$ -mal stetig differenzierbar, wenn alle  $q$ -ten partiellen Ableitungen  $D_{i_1} \dots D_{i_q} f_k$  auf  $U$  existieren und stetig sind.

Es zeigt sich, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitungen keine Rolle spielt (wenn  $f$  genuegend oft stetig differenzierbar ist).

THEOREM. (Satz von Schwarz) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$ . Ist  $f$  zweimal stetig differenzierbar, so gilt fuer jedes  $p \in U, k \in \{1, \dots, M\}$  und  $i, j \in \{1, \dots, N\}$

$$D_i D_j f_k(p) = D_j D_i f_k(p).$$

Beweis. Wir können die Situation ohne Einschränkung etwas vereinfachen:

- Es genügt eine Komponente  $k \in \{1, \dots, n\}$  zu betrachten, d.h. ohne Einschränkung setzen wir  $M = 1$  voraus.
- Für  $i = j$  gibt es nichts zu beweisen
- Wir setzen ohne Einschränkung voraus  $N = 2$  und setzen  $i = 1, j = 2$  und  $N = 2$ . (Ansonsten umnummerieren.)
- Betrachte o. B. d. A.  $p = 0$



Es ist somit zu zeigen:  $D_1D_2f(0) = D_2D_1f(0)$ .

Seien  $t, s \in \mathbb{R}$ . Wir betrachten nun

$$\Delta(s, t) := (f(s, t) - f(s, 0)) - (f(0, t) - f(0, 0)) = (f(s, t) - f(0, t)) - (f(s, 0) - f(0, 0)).$$

Dann gilt fuer diesen Ausdruck also

$$\begin{aligned} \Delta(s, t) &= (f(s, t) - f(s, 0)) - (f(0, t) - f(0, 0)) \\ (g(r) = f(r, t) - f(r, 0)) &= g(s) - g(0) \\ (MWS) &= g'(s_1)(s - 0) \quad \text{für } s_1 \in (0, s) \\ (g' = \dots) &= s(D_1f(s_1, t) - D_1f(s_1, 0)) \\ (h(r) = D_1f(s_1, r)) &= s(h(t) - h(0)) \\ &= sth'(t_1) \quad \text{mit } t_1 \in (0, t) \\ &= stD_2D_1f(s_1, t_1). \end{aligned}$$

Die andere Darstellung von  $\Delta$  liefert nach analoger Rechnung dann

$$\begin{aligned} \Delta(s, t) &= (f(s, t) - f(0, t)) - (f(s, 0) - f(0, 0)) \\ &= \dots \\ &= stD_1D_2f(s_2, t_2) \quad \text{mit } s_2 \in (0, 2), t_2 \in (0, t). \end{aligned}$$

Fuer  $s, t \neq 0$  kann man dividieren und erhaelt

$$D_2D_2f(s_1, t_1) = D_1D_2f(s_2, t_2).$$

Betrachtet man nun den Grenzwert  $(s, t) \rightarrow (0, 0)$  so folgt aus der Stetigkeit der zweiten Ableitungen also

$$D_1D_2f(0, 0) = D_2D_1f(0, 0).$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**FOLGERUNG.** (*Vertauschbarkeit der partiellen Ableitungen*) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$   $p$ -mal stetig differenzierbar, so können in

$$D_{j_1}, \dots, D_{j_p}f$$

die partiellen Ableitungen beliebig vertauscht werden.

*Beweis.* Die Behauptung folgt aus dem Satz von Schwarz.  $\square$

**DEFINITION.** Für  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen und  $q \in \mathbb{N}$  sei  $\mathfrak{C}^q(U, \mathbb{R}^m)$  der Vektorraum der  $q$ -mal stetig differenzierbaren Funktionen  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Für  $f \in \mathfrak{C}^q(U, \mathbb{R}^M)$  und  $r \in \mathbb{N}$  mit  $r \leq q$  definieren wir

$$D_j^r f = \underbrace{D_j \dots D_j}_r f \quad (D_j^0 f := f)$$

Für  $\{j_1, \dots, j_q\} \in \{1, \dots, N\}^q$  bezeichne  $\alpha_i$  die Anzahl des Auftretens der Zahl  $i$  unter den  $j_k$ . Dann gilt  $f \in \mathfrak{C}^q(U, \mathbb{R}^M)$ ,  $r \leq q$

$$D_{j_1} \dots D_{j_q} f = D_1^{\alpha_1} \dots D_N^{\alpha_N} f.$$

Für Multiindizes  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}_0^N$  sei im folgenden

$$|\alpha| := \sum_{j=1}^N \alpha_j \quad \text{der Betrag/die Länge von } \alpha,$$

$$\alpha! := \prod_{j=1}^N \alpha_j! \quad \text{die Fakultät von } \alpha,$$

$$x^\alpha := \xi_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot \xi_N^{\alpha_N} = \prod_{j=1}^N \xi_j^{\alpha_j} \quad \text{mit } x = (\xi_1, \dots, \xi_N) \in \mathbb{R}^N$$

$$D^\alpha f := D_1^{\alpha_1} \dots D_N^{\alpha_N} f = \left( \prod_{j=1}^N D_j^{\alpha_j} \right) f \quad \text{mit } f \in \mathfrak{C}^p(U, \mathbb{R}^M), |\alpha| \leq q$$

**Anwendung.** (Uebung) Die Multiindexschreibweise kann anhand des *Polynomischen Satzes* verdeutlicht werden (auf einen Beweis wird an dieser Stelle verzichtet):

$$\left( \sum_{j=1}^N \xi_j \right)^k = \sum_{\alpha: |\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} x^\alpha$$

Wendet man diese Formel zum Beispiel auf  $(a+b)^3$  an, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} (a+b)^3 &= \sum_{\alpha: |\alpha|=3} \frac{3!}{\alpha!} x^\alpha = \frac{3!}{(3,0)!} x^{(3,0)} + \frac{3!}{(2,1)!} x^{(2,1)} + \frac{3!}{(1,2)!} x^{(1,2)} + \frac{3!}{(0,3)!} x^{(0,3)} \\ &= \frac{3!}{3!} a^3 b^0 + \frac{3!}{2!} a^2 b^1 + \frac{3!}{2!} a^1 b^2 + \frac{3!}{3!} a^0 b^3 = a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3 \end{aligned}$$

Mit den vorigen Resultaten und den obigen Beziehungen sind wir nun in der Lage den Taylor'schen Satz auf Funktionen von  $N$  Variablen zu übertragen.

**THEOREM (Taylor).** Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $q \geq 1$ ,  $f \in \mathfrak{C}^{q+1}(U, \mathbb{R})$  und  $p \in U$ . Dann gilt für alle  $x \in U$ , für die die Verbindungsstrecke von  $p$  und  $x$  in  $U$  liegt:

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq q} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(p) (x-p)^\alpha + R_q(x)$$

mit

$$R_q(x) = \sum_{|\alpha|=q+1} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(p + \vartheta(x-p)) (x-p)^\alpha \quad \text{mit } \vartheta \in (0, 1)$$

**Bemerkung / Verdeutlichung.** Zur Verdeutlichung geben wir dieses Resultat für  $q = 0, 1, 2$  explizit an. Sei dazu  $x = (\xi_1, \dots, \xi_N)$  und

$p = (p_1, \dots, p_N)$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned} \underline{q=0}: \quad f(x) &= f(p) + \sum_{j=1}^N D_j f(p + \vartheta(x-p))(\xi_j - \xi_{0,j}) \\ &= f(p) + \langle \nabla f(p + \vartheta(x-p)), x-p \rangle \end{aligned}$$

$$\underline{q=1}: \quad f(x) = f(p) + \sum_{j=1}^N D_j f(p)(\xi_j - \xi_{0,j}) + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^N D_j D_k f(p + \vartheta(x-p))(\xi_j - \xi_{0,j})(\xi_k - \xi_{0,k})$$

$$\underline{q=2}: \quad f(x) = f(p) + \dots$$

**Bemerkung.** Die Terme zweiter Ordnung können als quadratische Form der *Hesse-Matrix*

$$H(f)(\cdot) = H(\cdot) = (D_j D_k f(\cdot))_{j,k=1}^N$$

aufgefasst werden. Für  $q=2$  lautet dann  $f(x)$ :

$$f(x) = f(p) + \langle \nabla f(p), (x-p) \rangle + \frac{1}{2} \langle H(p)(x-p), (x-p) \rangle + R_2(x)$$

*Beweis.* Der Satz wird bewiesen durch Rückführung auf den eindimensionalen Fall. Dazu sei

↔  
Ende der 16. Vorlesung

$$\begin{aligned} y &= (\eta_1, \dots, \eta_m) := (x-p) \\ g &: [-\varepsilon, 1+\varepsilon] \rightarrow \mathbb{R} \\ g(t) &= f(p+ty) = (f \circ h)(t), \text{ mit } h(t) = p+ty \end{aligned}$$

wobei  $\varepsilon > 0$  so klein gewählt sei, dass das Gesamtstück

$$\{p+ty \mid t \in [-\varepsilon, 1+\varepsilon]\}$$

ganz in  $U$  liegt (möglich, da  $U$  offen).

Offensichtlich ist  $g$  stetig differenzierbar und mit der Kettenregel folgt

$$\begin{aligned} g'(t) &= Df(h(t))h'(t) \\ &= \sum_{j=1}^N D_j f(h(t)) \underbrace{h'_j(t)}_{\eta_j} \\ &= \sum_{j=1}^N \eta_j D_j f(p+ty) \end{aligned}$$

Ist  $q \geq 1$ , so ist auch  $g'$  stetig differenzierbar und es gilt:

$$\begin{aligned} g''(t) &= \sum_{j=1}^N \eta_j \frac{d}{dt} D_j f(p + ty) \\ &= \sum_{j=1}^N \eta_j \sum_{i=1}^N D_i D_j f(p + ty) \eta_i \\ &= \left( \sum_{j=1}^N \eta_j D_j \right)^2 f(p + ty) \end{aligned}$$

wobei der Term  $(\sum \eta_j D_j)^2$  formal auszumultiplizieren ist. Allgemeiner erht man durch induktive Anwendung des Verfahrens für  $k \leq q + 1$

$$g^{(k)}(t) = \left( \sum_{j=1}^N \eta_j D_j \right)^k f(p + ty)$$

wobei auch hier die  $k$ -te Potenz formal auszurechnen ist.

Nach dem Polynomischen Satz (siehe oben) gilt für beliebige  $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_N) \in \mathbb{R}^N$  und  $k \in \mathbb{N}$

$$\left( \sum_{j=1}^N \zeta_j \right)^k = \sum_{\alpha: |\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} z^\alpha$$

In dieser Formel ersetzen wir  $(\zeta_1, \dots, \zeta_N)$  durch  $(\eta_1 D_1, \dots, \eta_N D_N)$ . Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{1}{k!} g^{(k)}(t) &= \frac{1}{k!} \left( \sum_{j=1}^N \eta_j D_j \right)^k f(p + ty) \\ &= \left( \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} (\eta_1 D_1, \dots, \eta_N D_N)^\alpha \right) f(p + ty) \\ &= \sum_{|\alpha|=k} \frac{y^\alpha}{\alpha!} D^\alpha f(p + ty) \end{aligned}$$

Die Taylorsche Formel liefert für  $t \in [0, 1]$

$$g(t) = \sum_{k=1}^q \frac{1}{k!} g^{(k)}(0) t^k + \widetilde{R}_q(t)$$

mit  $\widetilde{R}_q(t) = \frac{1}{(q+1)!} t^q g^{(q)}(\vartheta t)$  mit  $0 < \vartheta < 1$ . Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(1) = \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} g^{(k)}(0) + \widetilde{R}_q(1) \\ &= \sum_{k=0}^q \sum_{|\alpha|=k} \frac{(x-p)^\alpha}{\alpha!} D^\alpha f(p) + \widetilde{R}_q(1) \\ &= \sum_{|\alpha| \leq q} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(p) (x-p)^\alpha + R_q(x) \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} R_q(x) &= \widetilde{R}_q(1) = \frac{1}{(q+1)!} g^{(q+1)}(\vartheta) \\ &= \sum_{|\alpha|=q+1} \frac{y^\alpha}{\alpha!} D^\alpha f(p + \vartheta y) \\ &= \sum_{|\alpha|=q+1} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(p + \vartheta(x-p)) (x-p)^\alpha \end{aligned}$$

Das liefert die gewünschte Aussage.  $\square$

#### 4. Extrema von Funktionen

Wie im eindimensionalen Fall werden wir Kriterien für (lokale) Extrema von Funktionen mehrerer Veränderlicher (im Inneren eines Gebietes  $U$ ) angeben.

**DEFINITION** (Extrema im mehrdimensionalen Fall). Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  gegeben,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  und  $p \in U$ . Dann hat  $f$  in  $p$  ein lokales  $\begin{matrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{matrix}$ , falls ein  $\delta > 0$  existiert, sodass gilt

$$f(x) \underset{\leq}{\overset{\geq}{\approx}} f(p)$$

für alle  $x \in U$  mit  $|x-p| < \delta$ . Es hat  $f$  in  $p$  ein strenges lokales  $\begin{matrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{matrix}$ , falls ein  $\delta > 0$  existiert, sodass gilt

$$f(x) \underset{\leq}{\overset{\geq}{\prec}} f(p)$$

für alle  $x \in U$  mit  $0 < |x-p| < \delta$ .

#### Bemerkung.

**THEOREM.** (Notwendige Kriterien für Extrema) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $p \in U$  und die Funktion  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  sei differenzierbar in  $p$ . Hat  $f$  in  $p$  ein lokales Maximum bzw. Minimum, so gilt

$$\nabla f(p) \equiv 0$$

*Beweis.* Da  $f$  bei  $p$  differenzierbar ist, sind die Funktionen

$$g_j : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_j(t) = f(p + te_j)$$

in  $t = 0$  differenzierbar fuer jedes  $j = 1, \dots, N$ . Außerdem haben sie bei 0 ein Extremum. Damit folgt

$$g'_j(0) = 0 = \frac{\partial}{\partial x_j} f(p).$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

**Bemerkung.** Ist  $M \subset \mathbb{R}^N$  beliebig und  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar im Inneren von  $M$ , so liefert dieses Theorem eine notwendige Bedingung fuer Extremwerte im Inneren von  $M$ . Das Verhalten von  $f$  auf dem Rand muss dann natuerlich noch getrennt untersucht werden.

**Erinnerung.** Eine  $N \times N$  Matrix  $A$  heißt positiv definit, falls fuer alle  $x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$  gilt

$$\langle Ax, x \rangle > 0.$$

Sie heisst positiv semidefinit, wenn fuer alle  $x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$  gilt

$$\langle Ax, x \rangle \geq 0.$$

Durch Diagonalisieren von  $A$  sieht man leicht, dass gilt

$$\langle Ax, x \rangle = \lambda_m \|x\|^2$$

mit  $\lambda_m :=$  kleinste Eigenwert von  $A$ , wobei Gleichheit gilt fuer  $x$  aus dem Eigenraum zu  $\lambda_m$ . Damit folgt, dass  $A$  positiv (semi)definit istk, genau dann, wenn die Eigenwerte von  $A$  strikt positiv bzw. nichtnegativ sind. Entsprechend definiert man negative (semi)definite Matrizen.

**THEOREM.** (*Kriterien für Extrema*) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$  und  $p \in U$ . Dann gilt:

- (*Notwendiges Kriterium*) Hat  $f$  bei  $p$  ein (lokales)  $\begin{matrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{matrix}$ , so gilt  $\nabla f(p) = 0$  und die Hesse-Matrix  $(D_k D_j f(p))_{j,k=1}^N$  ist  $\begin{matrix} \text{negativ} \\ \text{positiv} \end{matrix}$  semidefinit.
- (*Hinreichendes Kriterium*) Gilt  $\nabla f(p) = 0$  und die Hesse-Matrix ist  $\begin{matrix} \text{negativ} \\ \text{positiv} \end{matrix}$  definit in  $p$ , so hat  $f$  ein striktes lokales  $\begin{matrix} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{matrix}$  in  $p$ .

**Bemerkung.** Obiges Theorem liefert im eindimensionalen Fall gerade die uns schon bekannte Charakterisierung.

*Beweis.* Wir zeigen zunaechst die notwendige Bedingung: Nach obigen Satz gilt  $\nabla f(p) = 0$ . Angenommen  $H(p)$  ist nicht negativ semidefinit, dann existiert ein  $y \in \mathbb{R}^N$ ,  $|y| = 1$  und  $\langle H(p)y, y \rangle > 0$ . Da  $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$  ist, existiert ein  $\delta > 0$  mit

$$\langle H(p)y, y \rangle > 0$$

fuer alle  $x \in U$  mit  $|x - p| < \delta$ .

Dann folgt mit dem Satz von Taylor für alle  $t \in (0, \delta]$

$$\begin{aligned} f(p + ty) &= f(p) + 0 + \sum_{|\alpha|=2} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(p + \vartheta ty) t^{|\alpha|} y^\alpha \\ &= f(p) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N t^2 D_i D_j f(p + \vartheta ty) \eta_i \eta_j \\ &= f(p) + \frac{1}{2} t^2 \langle H(p + \vartheta ty) y, y \rangle \\ &> f(p) \end{aligned}$$

Wir zeigen nun die hinreichende Bedingung:

Sei  $Df(p) = 0$  und  $(D_i D_j f(p))_{i,j}$  negativ definit, dann gilt also mit  $y = (\eta_1, \dots, \eta_m)$

$$0 > \sum_{i,j=1}^N D_i D_j f(p) \eta_i \eta_j = \langle H(f)(p) y, y \rangle$$

für alle  $y$  mit  $y \neq 0$ .

Da die Abbildung

$$S^N = \{y \in \mathbb{R}^N : |y| = 1\} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \langle H(f)(p) y, y \rangle$$

stetig ist, nimmt sie auf dem kompakten  $S^N$  ihr Maximum an. Es gibt also ein  $\lambda > 0$  mit  $\langle H(f)(p) y, y \rangle \leq -\lambda$  für alle  $y$  mit  $|y| = 1$ . Da alle  $D_i D_j f$  stetig sind, existiert ein  $\delta > 0$  mit

$$|D_i D_j f(x) - D_i D_j f(p)| \leq \frac{\lambda}{2N^2}$$

für alle  $x \in U$  mit  $|x - p| < \delta$ . Damit folgt

$$\begin{aligned} \langle H(f)(x) y, y \rangle &= \sum_{i,j=1}^N D_i D_j f(x) \eta_i \eta_j \\ &= \sum_{i,j=1}^N (D_i D_j f(x) - D_i D_j f(p)) \eta_i \eta_j + \langle H(f)(p) y, y \rangle \\ &\geq \frac{\lambda}{2} - \lambda = -\frac{\lambda}{2} \end{aligned}$$

für alle  $y$  mit  $|y| = 1$ ,

$$\Rightarrow \langle H(f)(x) y, y \rangle \leq -\frac{\lambda}{2} |y|^2$$

für alle  $|y| \neq 0$ ,

$$\Rightarrow \langle H(f)(x) y, y \rangle < 0$$

für alle  $y \neq 0$  und  $x$  mit  $|x - p| < \delta$ .

Mit dem Satz von Taylor folgt also

$$f(x) = f(p) + Df(p)(x - p) + \frac{1}{2} \langle H(f)(p + \vartheta(x - p))(x - p), (x - p) \rangle$$

für ein  $\vartheta \in (0, 1)$ , also

$$f(x) - f(p) < 0$$

für  $|x - p| < \delta$ ,  $x \neq p$ .

$\Rightarrow f$  hat in  $p$  ein striktes Maximum.

Die Aussage über Minima folgt analog (z. B.  $f$  durch  $-f$  ersetzt)  $\square$

**Bemerkung.**

- Der Beweis nutzt:  $A$  nahe  $B \Rightarrow \langle Ay, y \rangle$  nahe  $\langle By, y \rangle$
- Der Beweis zeigt:  $A$  negativ definit, größter Eigenwert ist  $-\lambda$ ,  
 $B$  nahe  $A$ ,  $B$  symmetrisch  $;\Rightarrow$  größter Eigenwert von  $B$  ist  
nahe  $-\lambda$ ,

←  
Ende der 17. Vorlesung



## Implizite Funktionen und lokale Invertierbarkeit

In diesem Abschnitt untersuchen wir (lokale) Lösbarkeit von Gleichungen der Form

$$F(x, y) = 0$$

nach  $x$  bzw.  $y$  bei gegebenen  $y$  bzw.  $x$ .

Wir beginnen mit einer Diskussion von lokaler Invertierbarkeit. Zur Einstimmung betrachten wir zwei Spezialfälle.

**Beispiel.** Sei  $I$  ein Intervall in  $\mathbb{R}$  und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann hat  $f$  eine Umkehrfunktion genau dann wenn  $f$  streng monoton ist. Das ist eine gute Charakterisierung aber unter Umständen nicht einfach zu prüfen. Ist  $f$  stetig differenzierbar, so wird die Lage einfacher: Ist  $f'(p) \neq 0$  so ist  $f$  lokal invertierbar. (Denn dann hat  $f'$  in der Nähe von  $p$  festes Vorzeichen und ist damit nach dem Mittelwertsatz streng monoton.) Die (lokale) Inverse  $g$  ist stetig diffbar mit

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

mit  $f(x) = y$ .

**Beispiel.** Sei  $L$  eine lineare Abbildung von  $\mathbb{R}^N$  nach  $\mathbb{R}^N$  und  $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N, f(x) = a + Lx$ . Dann ist  $f$  invertierbar genau dann, wenn  $L$  invertierbar ist. In diesem Fall gilt für die Umkehrabbildung  $g$  also

$$g : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N, g(y) = -L^{-1}a + L^{-1}y.$$

Insbesondere ist  $g$  stetig diffbar mit

$$Dg(y) = Df(x)^{-1}.$$

In beiden Fällen gilt also: Ist  $f$  stetig diffbar und  $Df(x)$  invertierbar, so ist  $f$  lokal invertierbar und seine Umkehrabbildung ist stetig diffbar mit  $Dg(y) = Df(x)^{-1}$ . Tatsächlich gilt folgender allgemeiner Satz.

**THEOREM.** (*Satz über die Umkehrfunktion*) Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^N$  stetig diffbar,  $p \in U$ ,  $q := f(p)$  und  $Df(p)$  invertierbar. Dann gibt es eine offene Umgebung  $V$  von  $p$  eine offene Umgebung  $W$  von  $q$  so dass folgendes gilt:

- $f|_V : V \rightarrow W$  ist bijektiv,
- die Umkehrabbildung  $g := (f|_V)^{-1} : W \rightarrow V$  ist stetig diffbar,

- fuer alle  $x \in V$  ist  $Df(x)$  invertierbar und es gilt  $Dg(y) = Df(x)^{-1}$  fuer  $y = f(x)$ .

*Zeichnung.*

**Bemerkung.**

- Ist die Umkehrfunktion  $g$  von  $f$  diffbar, so folgt mit  $g \circ f = id$  aus der Kettenregel, dass

$$1 = Dg(y)Df(x)$$

fuer  $y = f(x)$ . Die Invertierbarkeit von  $Df(x)$  und die Formel fuer  $Dg(y)$  sind also Konsequenzen der Diffbarkeit von  $g$ .

- In einer Dimension gilt: Ist  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diffbar mit  $Df(x) = f'(x) \neq 0$ , so hat also  $f'$  festes Vorzeichen,  $f$  ist streng monoton und damit auf ganz  $\mathbb{R}$  invertierbar. Wir zeigen nun an zwei Beispielen, dass in beliebigen Dimensionen globalen Invertierbarkeit i. a. nicht gilt, auch wenn  $Df$  ueberall invertierbar ist.

**Beispiel.** Sei  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ,  $f(\xi_1, \xi_2) = (\xi_1^2 - \xi_2^2, 2\xi_1\xi_2)$ . Dann gilt

$$Df(\xi_1, \xi_2) = (2\xi_1 \quad -2\xi_2, 2\xi_2 \quad 2\xi_1).$$

Also  $\det Df(\xi_1, \xi_2) = 4(\xi_1^2 + \xi_2^2) \neq 0$ . Damit ist  $Df$  ueberall invertierbar. Aber es ist  $f$  nicht injektiv, denn es gilt  $f(-\xi_1, -\xi_2) = f(\xi_1, \xi_2)$ . (Setzt man  $z = \xi_1 + i\xi_2$ , so ist  $f(\xi_1, \xi_2) = (\Re z^2, \Im z^2)$ . Es handelt sich also bei  $f$  um die komplexe Quadratfunktion und bei  $Df$  um die Multiplikation mit  $2z$ .)

**Beispiel.** Sei  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(\xi_1, \xi_2) = e^{\xi_1}(\cos \xi_2, \sin \xi_2)$ . Dann ist  $f$  nicht injektiv. Aber die Ableitung ist ueberall invertierbar: Es ist  $Df(\xi_1, \xi_2) = e^{\xi_1}(\cos \xi_2 - \sin \xi_2, \sin \xi_2 \quad \cos \xi_2)$ . Also ist  $\det Df = e^{2\xi_1} \neq 0$ . Aber es ist  $f(\xi_1, \xi_2) = f(\xi_1, \xi_2 + 2\pi)$ . (Setzt man  $z = \xi_1 + i\xi_2$  so ist  $f(z) = (\Re e^z, \Im e^z)$ . Es handelt sich also um die komplexe Exponentialfunktion und ihre Ableitung.)

Zur Vorbereitung auf den Beweis des Satzes beweisen wir zwei Resultate.

**LEMMA.** Sei  $A : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$  linear. Dann sind äquivalent:

- Es ist  $A$  invertierbar.
- Es gibt ein  $C > 0$  mit  $|Ax| \geq C|x|$  fuer alle  $x \in \mathbb{R}^N$
- Es ist 0 nicht Eigenwert von  $A$ .

In diesem Fall kann  $C = \frac{1}{\|A^{-1}\|}$  gewaehlt werden.

*Beweis.* (i)  $\implies$  (ii): Sei  $y = Ax$ . Dann gilt nach (i) also  $x = A^{-1}y$ . Damit folgt

$$|x| \leq \|A^{-1}\| |y|.$$

Das liefert dann

$$|y| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} |x|.$$

(ii) $\implies$  (iii): Das ist klar.

(iii) $\implies$  (i): Nach (iii) ist  $A$  injektiv. Damit ist es bijektiv.  $\square$

**PROPOSITION.** Sei  $h : B_R(0) \subset \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^N$  stetig und differenzierbar in  $U_R(0)$  und

$$\psi : U_R(0) \longrightarrow \mathbb{R}, \psi(x) = |h(x)|^2.$$

Hat  $\psi$  ein Extremum  $p$  in  $U_R$ , so gilt  $Dh^t h(p) = 0$ . Insbesondere verschwindet also  $h$  in  $p$ , wenn  $Dh$  auf ganz  $U_R(0)$  invertierbar ist.

*Beweis.* Das folgt direkt durch Bilden des Gradienten:

$$0 = \partial_j \psi(p) = \partial_j \sum_{k=1}^N h_k(p)^2 = 2 \sum_{k=1}^N N \partial_j h_k(p) \cdot h_k(p).$$

$\square$

### Bemerkung.

- Die Aussage ist bemerkenswert, weil auf den Funktionswert im Extremum geschlossen werden kann (und nicht nur auf den Gradienten).
- (Uebung) Ist  $h : \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbar mit
  - $Dh(x)$  invertierbar fuer alle  $x \in \mathbb{R}^N$ ,
  - $|h| \rightarrow \infty$  fuer  $x \rightarrow \infty$ ,
 so gibt es ein  $x \in \mathbb{R}^N$  mit  $h(x) = 0$ .

Wir kommen nun zum Beweis des Satzes ueber die Umkehrfunktion.

*Beweis.* Wir setzen

$$\lambda := \frac{1}{2} \|Df(p)^{-1}\|^{-1} > 0.$$

Es ist  $\lambda$  die einzige relevante Groesse in unserem Beweis!

Da  $f$  stetig differenzierbar ist, existiert ein  $\tilde{\delta} > 0$  mit

$$\|Df(x) - Df(p)\| \leq \lambda$$

fuer alle  $x \in U$  mit  $|x - p| \leq \tilde{\delta}$ . Da  $U$  offen ist, gibt es ein  $\delta > 0$  mit  $\delta < \tilde{\delta}$  und  $U_\delta(p) \subset U$ . Setze

$$V := U_\delta(p) \subset U.$$

Dann gilt also

$$\|Df(x) - Df(p)\| \leq \lambda \quad (*)$$

fuer alle  $x \in V$ .

Zwischenbehauptung: Fuer alle  $x, x' \in V$  gilt  $|f(x) - f(x')| \geq \lambda |x - x'|$ .

Bew. ZB: Sei  $\varphi(x) = f(x) - Df(p)(x - p) - f(p)$ , also

$$f(x) = f(p) + Df(p)(x - p) + \varphi(x).$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 |f(x) - f(x')| &= |Df(p)(x - x') + \varphi(x) - \varphi(x')| \\
 (\Delta - Ugl) &\geq |Df(p)(x - x')| - |\varphi(x) - \varphi(x')| \\
 (\text{Lemma}) &\geq 2\lambda|x - x'| - |\varphi(x) - \varphi(x')| \\
 (!) &\geq 2\lambda|x - x'| - \lambda|x - x'| \\
 &= \lambda|x - x'|.
 \end{aligned}$$

(!: Das folgt aus dem Mittelwertsatz:

$$\begin{aligned}
 |\varphi(x) - \varphi(x')| &\leq \|D\varphi(\xi)\| |x - x'| \\
 &= \|Df(\xi) - Df(p)\| |x - x'| \\
 (\xi \in V, \text{Def } V) &\leq \lambda|x - x'|.
 \end{aligned}$$

Nach diesen Vorbereitungen koennen wir nun die Aussagen des Satzes (in anderer Reihenfolge) beweisen.

*Behauptung.* Fuer alle  $x \in V$  ist  $Df(x)$  invertierbar.

Bew. Es gilt

$$\begin{aligned}
 |Df(x)y| &\geq |Df(p)y| - |(Df(x) - Df(p))y| \\
 (\text{Lemma, Def. } V, \lambda) &\geq 2\lambda|y| - \lambda|y| \\
 &= \lambda|y|
 \end{aligned}$$

Damit folgt die Aussage nach dem Lemma zur Invertierbarkeit.

*Behauptung.*  $W := f(V)$  ist offen.

Bew. Sei  $y' := f(x') \in W$  beliebig. Sei  $\delta' := \delta - |x' - p|$ ,  $\varepsilon := \frac{\lambda}{2}\delta'$ . Wir zeigen  $U_\varepsilon(y') \subset W$ . **Zeichnung.**

Sei also  $z \in U_\varepsilon(y')$  beliebig. Damit folgt also

$$z \in U_{\frac{\lambda r}{2}}(y') \quad (*)$$

fuer ein  $0 < r < \delta'$ . Wir betrachten

$$\psi : B_r(x') \longrightarrow [0, \infty), \psi(x) = |f(x) - z|^2.$$

Da  $\psi$  (offenbar) stetig ist, nimmt es auf dem kompakten  $B_r(x')$  sein Minimum an. (Wir muessen zeigen, dass dieses Minimum 0 ist.) Wir zeigen nun, dass das Minimum im Inneren angenommen wird: Fuer  $x$  auf dem Rand von  $B_r(x')$  gilt  $|x - x'| = r$  und damit

$$\begin{aligned}
 \psi(x) = |f(x) - z|^2 &\geq (|f(x) - f(x')| - |y' - z|)^2 \\
 (\text{ZB, } (*)) &\geq (\lambda r - \frac{1}{2}\lambda r)^2 \\
 &= (\frac{1}{2}\lambda r)^2.
 \end{aligned}$$

Fuer den Mittelpunkt  $x'$  von  $B_r(x')$  gilt aber

$$\psi(x') = |f(x') - z|^2 = |y' - z|^2 \stackrel{(*)}{<} \left(\frac{1}{2}\lambda r\right)^2.$$

Damit wird also das Minimum im Inneren von  $B_r(x')$  angenommen. Dann muss aber nach dem vorigen Lemma (mit  $h = f - z$ ) fuer den entsprechenden Punkt  $x_m$  gelten

$$0 = Df(x_m)^t(f(x_m) - z).$$

Da  $Df(x_m)$  invertierbar ist (nach vorigen Behauptung) folgt also  $f(x_m) - z = 0$ . Das liefert die gewuenschte Offenheit.

*Behauptung.*  $f : V \rightarrow W$  ist bijektiv.

Bew. Nach Definition von  $W$  ist  $f$  surjektiv. Nach ZB ist  $f$  injektiv.

*Behauptung.* Es ist  $g = (f|_V)^{-1}$  differenzierbar mit  $Dg(y) = Df(x)^{-1}$  fuer  $f(x) = y$ .

Bew. Wir betrachten nur den Punkt  $y = q = f(p)$ . (In den anderen Punkten von  $V$  koennen analoge Betrachtungen gemacht werden, da Differenzierbarkeit eine lokale Eigenschaft ist.) Sei  $\varepsilon = \frac{\lambda}{2}\delta$  wie oben zu  $x' = p$  gewaehlt. Dann gilt also  $U_\varepsilon(q) \subset W$ ,  $U_\delta(p) \subset V$ . **Zeichnung.** Fuer  $y \in \mathbb{R}^N$  mit  $|y| < \varepsilon$  gilt dann

$$g(q + y) = p + x$$

mit  $|x| < \delta$  und

$$|y| = |(y + q) - q| = |f(p + x) - f(p)| \stackrel{ZB}{\geq} \lambda|x| \quad (**).$$

Wegen

$$f(p + x) = f(p) + Df(p)x + \varphi_f(p + x)$$

d.h.

$$q + y = q + Df(p)x + \varphi_f(p + x) \quad (***)$$

mit

$$\frac{\varphi_f(p + x)}{|x|} \rightarrow 0, x \rightarrow 0$$

←————→  
Ende der 18. Vorlesung

folgt dann

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{|y|} |g(q+y) - g(q) - Df(p)^{-1}y| &= \frac{1}{|y|} |x - Df(p)^{-1}y| \\
 &= \frac{1}{|y|} |Df(p)^{-1}(Df(p)x - y)| \\
 (***) &= \frac{1}{|y|} |Df(p)^{-1}\varphi_f(p+x)| \\
 &\leq \frac{1}{|y|} \|Df(p)^{-1}\| |\varphi_f(p+x)| \\
 (***) &\leq \frac{1}{\lambda|x|} |\varphi_f(p+x)| \\
 &\rightarrow 0, |y| \rightarrow 0 \stackrel{(***)}{\iff} |x| \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

In der bisherigen Diskussion haben wir versucht, die Gleichung

$$g(x, y) = f(x) - y = 0$$

bei gegebenen  $y$  nach  $x$  aufzulösen, d.h.  $x$  als Graph einer Funktion von  $y$  darzustellen. Wir fragen nun, wie weit das fuer allgemeine Funktionen  $g$  moeglich ist. Dazu vertauschen wir die Rollen von  $x$  und  $y$  und betrachten  $g: \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M \rightarrow \mathbb{R}^M$  und seine Nullstellenmenge

$$\mathcal{N} = \mathcal{N}(g) := \{(x, y) : g(x, y) = 0\}.$$

Die Frage lautet, ob  $\mathcal{N}$  lokal als Graph darstellbar ist d.h. ob man  $y$  als Funktion von  $x$  schreiben kann  $y = g(x)$ . Es geht also um das Auflösen der Gleichung  $g(x, y) = 0$  nach  $y$  als Funktion von  $x$ .

**Beispiel.** (Einheitskreislinie) Sei  $g: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ .

$$\mathcal{N} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Dann gilt:**Zeichnung.**

$$\mathcal{N} \cap \{y > 0\}: \text{Oberer Halbkreis } y = \sqrt{1 - x^2}.$$

$$\mathcal{N} \cap \{x < 0\}: \text{Linker Halbkreis } x = -\sqrt{1 - y^2}.$$

$$\mathcal{N} \cap \{y < 0\}: \text{Unterer Halbkreis } y = -\sqrt{1 - x^2}.$$

$$\mathcal{N} \cap \{x > 0\}: \text{Rechter Halbkreis. } x = \sqrt{1 - y^2}.$$

Die Gleichung kann also lokal nach  $x$  bzw  $y$  aufgelöst werden. Das Auflösen nach  $y$  ist dabei in Bereichen mit  $\partial_y g(x, y) = 2y \neq 0$  moeglich und das Auflösen nach  $x$  in Bereichen mit  $\partial_x g(x, y) = 2x \neq 0$ .

**Beispiel.** (Hohenlinien einer Landkarte) Sei  $g: \text{Landkarte} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(p) = \text{Hoehe von } p \text{ ueber dem Meeresspiegel}$ . Sei fuer  $c \in \mathbb{R}$

$$\mathcal{N}_c := \{p \in \text{Landkarte} : g(p) - c = 0\}.$$

Dann ist  $\mathcal{N}_c$  gerade die Hohenlinie zu  $c$ . **Zeichnung**

**Notation.** Fuer  $z \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$  schreiben wir  $z = (x, y)$  mit  $x \in \mathbb{R}^N$  und  $y \in \mathbb{R}^M$ . Ist  $W \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$  offen und  $g : W \rightarrow \mathbb{R}^M$  diffbar, so setzen wir

$$D_x g(z) := (\partial_j g_i(z))_{i=1, \dots, M, j=1, \dots, N} = \text{Matrixmalen}$$

$$D_y g(z) := (\partial_{j+N} g_i(z))_{i=1, \dots, M, j=1, \dots, M} = \text{Matrixmalen.}$$

Damit gilt dann also

$$Dg(z) = (D_x g(z) \ D_y g(z)).$$

**Wichtig.**  $D_y g(z)$  ist eine quadratische Matrix ( $M \times M$  Matrix).

**THEOREM.** (*Satz ueber implizite Funktionen*) Sei  $W \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$  offen und  $g : W \rightarrow \mathbb{R}^M$  stetig diffbar. Sei

$$\mathcal{N} := \{(x, y) \in W : g(x, y) = 0\}.$$

Ist  $z_0 := (p, q) \in \mathcal{N}$  und  $D_y g(z_0)$  invertierbar, so existieren offene Umgebungen  $U$  von  $p$  und  $V$  von  $q$  und ein stetig diffbares  $f : U \rightarrow V$  mit

$$\mathcal{N} \cap (U \times V) = \text{Graph von } f = \{(x, f(x)) : x \in U\}$$

sowie  $Df(x) = -D_y g(x, f(x))^{-1} D_x g(x, f(x))$ .

Kurz: Ist  $g(p, q) = 0$  und  $D_y g(p, q)$  invertierbar, so kann man die Lösung von  $g(x, y) = 0$  in einer Umgebung von  $p$  als Graph darstellen.

**Zeichnung.**

*Beweis.* Wir zeigen zunaechst die Existenz von  $f$ .

Idee (vgl. Zeichnung). Nach dem Satz zur Umkehrfunktion ist um  $(p, q)$  herum ist jeder Punkt eindeutig durch seine  $x$  Koordinate und den Wert von  $g$  beschrieben. Daher koenen wir  $(x, g)$  als Koordinatensystem verwenden. Das liefert eine Zerlegung der Umgebung von  $(p, q)$  in Konstanzflaechen von  $g$ . Diese sind nach Konstruktion (Bilder von) Graphen.

Hier sind die Details: Sei  $G : W \rightarrow \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$ ,  $(x, y) \mapsto (x, g(x, y))$ . Dann gilt

$$G(p, q) = (p, 0)$$

sowie

$$DG(p, q) \equiv \begin{pmatrix} 1_N & 0_{NM} \\ D_x g(p, q) & D_y g(p, q) \end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$\det DG(p, q) = \det D_y g(p, q) \neq 0$$

nach unserer Voraussetzung an die Invertierbarkeit von  $D_y g(p, q)$ . Nach dem Satz ueber die Umkehrfunktion gibt es also offenen Umgebungen  $W$  von  $(p, q)$  und  $\widetilde{W}$  von  $G(p, q) = (p, 0)$ , so dass  $G : W \rightarrow \widetilde{W}$

bijektiv mit stetig diffbarer Inverser ist. Ohne Einschränkung (sonst Verkleinern) koennen wir

$$\widetilde{W} = \widetilde{U}_p \times \widetilde{U}_0$$

mit Umgebungen  $\widetilde{U}_p$  von  $p$  und  $\widetilde{U}_0$  von  $0$  annehmen. Nun koennen wir  $\widetilde{W}$  in Konstanzflaechen (der zweiten Koordinate) zerlegen (offenbar). Zurueckziehen mit  $G$  eine Zerlegung von  $\mathcal{N} \cap W$  in Konstanzflaechen von  $g$ . **Zeichnung.** Nach Konstruktion sind diese Konstanzflaechen aber gerade Graphen. Denn: Waehle Umgebung  $U$  von  $p$  und  $V$  von  $q$  mit  $U \times V \subset W$  und  $G^{-1}(U \times \{0\}) \subset U \times V$  (ggf. Verkleinern). Sei

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M &\longrightarrow \mathbb{R}^M, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto y = (0, 1_M) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \\ \iota : \mathbb{R}^N &\longrightarrow \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M, x \mapsto \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1_N \\ 0 \end{pmatrix} x. \end{aligned}$$

Dann hat

$$f = \pi \circ G^{-1} \circ \iota : U \longrightarrow V$$

die gewuenschten Eigenschaften.

- $\iota$  bildet  $U$  auf  $U \times \{0\}$  ab,  $x \mapsto (x, 0)$ .
- $G^{-1}$  bildet  $U \times \{0\}$  ab nach  $U \times V$ ,  $(x, 0) \mapsto (x, y)$  mit  $g(x, y) = 0$ .
- $\pi$  bildet  $U \times V$  nach  $V$  ab  $(x, y) \mapsto y$ , wobei fuer die in Frage kommenden  $(x, y)$  gilt  $g(x, y) = 0$ .

*Es bleibt die Ableitung zu berechnen.* Nach Kettenregel ist  $f$  differenzierbar und es gilt

$$Df(x) = D\pi(G^{-1}(\iota(x)))DG^{-1}(\iota(x))D\iota(x).$$

Es ist (beachte  $\pi, \iota$  linear):

$$D\iota = \iota, D\pi = \pi.$$

Weiterhin gilt

$$DG(x, y) \equiv \begin{pmatrix} 1_N & 0_{NM} \\ D_x g(x, y) & D_y g(x, y) \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} 1_N & 0_{NM} \\ L_1 & L_2 \end{pmatrix}$$

mit  $L_1 = D_x g(x, y)$  und  $L_2 = D_y g(x, y)$ . Damit ergibt sich das Inverse (Probe!) zu

$$DG^{-1} = \begin{pmatrix} 1_N & 0_{NM} \\ -L_2^{-1}L_1 & L_2^{-1} \end{pmatrix}.$$

Insgesamt folgt

$$Df(x) = (0, 1_M) \begin{pmatrix} 1_N & 0_{NM} \\ -L_2^{-1}L_1 & L_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1_N \\ 0 \end{pmatrix} = -L_2^{-1}L_1$$

und das ist die Behauptung.  $\square$

Eine Reihe von Kommentaren sind angemessen.



**Bemerkung.**

- Sind  $f, g$  diffbar mit  $g(x, f(x)) \equiv 0$  und  $D_y g(x, f(x))$  invertierbar, so folgt aus der Kettenregel

$$0 \equiv Dg(x, f(x)) \begin{pmatrix} 1_m \\ Df(x) \end{pmatrix} = D_x g(x, f(x)) + D_y g(x, f(x)) Df(x).$$

Damit ergibt sich die Formel fuer die Ableitung von  $f$

$$Df(x) = -D_y g(x, f(x))^{-1} D_x g(x, f(x)).$$

Auch hier folgt also die Formel fuer die Ableitung von  $f$  automatisch aus der Differenzierbarkeit von  $f$  und der Kettenregel.

- Im allgemeinen werden wir die Funktion  $f$  aus dem Satz nicht explizit bestimmen koennen. Es ist bemerkenswert, dass wir trotzdem die Ableitung von  $f$  berechnen koennen.
- Ist  $D_y g(p, q)$  nicht invertierbar, so ist i.a. eindeutiges Auflösen von  $y$  nach  $x$  in Umgebung von  $p$  nicht moeglich:

**Beispiel** (kein eindeutiges Auflösen moeglich):

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, g(x, y) = x^2 + y^2 - 1, (p, q) = (1, 0).$$

**Beispiel** (gar kein Auflösen moeglich)

$$h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, h(x, y) = x^2 + y^2, (p, q) = (0, 0).$$

- Statt  $g \equiv 0$  kann man auch  $g \equiv c$  betrachten. (Dazu ersetzt man einfach  $g$  durch  $\tilde{g} = g - c \dots$ )
- Ist  $W \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$  offen und  $g : W \longrightarrow \mathbb{R}^M$  stetig diffbar mit  $g(z_0) = 0$  und  $\text{Rang} Dg(z_0) = M$ , so kann man den Satz nach Umsortieren der Koordinaten anwenden. (Vgl. Beispiel mit Einheitskreis.)
- Wir haben den Satz ueber implizite Funktionen mittels des Satzes ueber die Umkehrfunktion gezeigt. Man kann auch umgekehrt vorgehen. Dazu betrachtet man  $g(x, y) = f(x) - y$  in einer Umgebung von  $(p, q)$  mit  $f(p) = q$  d.h.  $g(p, q) = 0$ . Ist  $D_x f(p)$  invertierbar, so ist  $D_x g(p, q)$  invertierbar und damit nach dem Satz ueber implizite Funktionen also  $x$  nahe an  $p$  als Funktion von  $y$  nahe  $q$  darstellbar. (Details: Uebung).

←—————→  
Ende der 19. Vorlesung.

## Untermannigfaltigkeiten, bedingte Extrema und all das

Untermannigfaltigkeiten sind die glatten Gebilde im Raum. Sie sind lokal Nullstellenmengen von glatten Funktionen oder äquivalent lokale Graphen. **Zeichnungen.** Kreis, Sphaere, Torus, Parabel.

**Notation.** Die Nullstellenmenge einer Funktion  $g$  bezeichnen wir weiterhin mit  $\mathcal{N}(g)$ , d.h. zu  $g : W \subset \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^L$  definieren wir

$$\mathcal{N}(g) := \{z \in W : g(z) = 0\} = \bigcap_{j=1}^L \mathcal{N}(g_j).$$

Den Graphen einer Funktion  $f$  bezeichnen wir mit  $\mathcal{G}(f)$  d.h. zu  $f : U \subset \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^M$  definieren wir

$$\mathcal{G}(f) := \{(x, f(x)) : x \in U\} \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M.$$

**DEFINITION.** Eine stetig differenzierbare Funktion  $f : U \subset \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^M$  heisst *regular in  $x$* , wenn  $Df(x)$  maximalen Rang hat. Ist die Funktion in jedem  $x \in U$  regular, so heisst sie *regulaer*.

**Bemerkung.** Ist  $f : U \subset \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^M$  regulaer, so gilt also

- falls  $M \leq N$ :  $\text{Rang} Df(x) = M$  d.h. Zeilen von  $Df(x)$  sind linear unabhaengig.
- falls  $N \leq M$ :  $\text{Rang} Df(x) = N$  d.h. Spalten von  $Df(x)$  sind linear unabhaengig.
- falls  $N = M$ :  $Df(x)$  invertierbar.

Wie man am letzten Punkt sieht, ist Regularitaet eine Verallgemeinerung von Invertierbarkeit.

**Beispiel.**

- Ist  $g : W \longrightarrow \mathbb{R}$  stetig diffbar, so ist  $g$  genau dann regular, wenn  $\nabla g(x) \neq 0$  in jedem  $x \in W$ .
- $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^M$  stetig differenzierbar. Dann ist  $F : U \longrightarrow \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$ ,  $F(x) = (x, f(x))$  regular. (Denn  $DF(x) = (1, Df(x))^t$  und damit  $\text{Rang} DF = N$ .)

**LEMMA.** Sei  $X \subset \mathbb{R}^N$ ,  $p \in X$  und  $L \leq N$ . *Aequivalent:*

- (i) Es existiert eine offene Umgebung  $W$  von  $p$  in  $\mathbb{R}^N$  und reguläres  $g : W \rightarrow \mathbb{R}^{N-L}$  mit  $X \cap W = \mathcal{N}(g)$ . (' $X$  ist lokal eine Nullstellenmenge.')
- (ii) Es existiert eine offene Umgebung  $W$  von  $p \in \mathbb{R}^N$  und eine offene Menge  $U \subset \mathbb{R}^L$  und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{N-L}$ , und eine Permutation  $P : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$  mit

$$\mathcal{N} \cap W = P\mathcal{G}(f).$$

(' $X$  ist lokal Graph.')

*Beweis.* Die Richtung (i) $\implies$ (ii) folgt aus dem Satz ueber implizite Funktionen. Die Implikation (ii) $\implies$ (i) folgt einfach durch Betrachten von  $g(x, y) = y - f(x)$  (wenn man  $P = Id$  annimmt).  $\square$

**DEFINITION.** (*Untermannigfaltigkeit*) Eine Teilmenge  $X$  von  $\mathbb{R}^N$  heisst Untermannigfaltigkeit der Dimension  $L$ , wenn sie in jedem Punkt  $p \in X$  eine der Bedingungen des vorangehenden Lemma erfuehlt.

**Bemerkung.**

- Untermannigfaltigkeiten der Dimension  $N - 1$  heissen Hyperflaechen. Sie sind also (lokal) Nullstellengebilde von reellwertigen Funktionen.
- Alle Untermannigfaltigkeiten sind lokal Schnitte von Hyperflaechen (da  $\mathcal{N}(g) = \cap_k^{N-L} \mathcal{N}(g_k)$ ).

**Beispiele.** Offenbar sind alle Graphen und alle Nullstellengebilde regulärer Funktionen also Untermannigfaltigkeiten. Insbesondere gehoeren dazu:

- Kreis ( $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ )
- Die Sphaere  $S^{N-1} := \{x \in \mathbb{R}^N : |x|^2 - 1 = 0\}$  ( $g(\xi_1, \dots, \xi_N) = \sum \xi_j^2 - 1 = 0$ .)
- Torus (Uebung)
- Parabel (Graph).

Wir fuehren nun die Tangentialflaechen und Normalen an Untermannigfaltigkeiten ein. **Zeichnung.**

**DEFINITION.** Sei  $X \subset \mathbb{R}^N$  eine Untermannigfaltigkeit und  $p \in X$ . Dann heisst

$$T_p X := \{\gamma'(0) : \gamma : (-\epsilon_\gamma, \epsilon_\gamma) \rightarrow \mathbb{R}^N, \text{ stetig diffbar}, \gamma(0) = p, \gamma(-1, 1) \subset X\}$$

der Tangentialraum von  $X$  in  $p$ . Der Normalraum  $N_p X$  von  $X$  in  $p$  ist definiert als  $N_p X := T_p X^\perp$ .

**THEOREM.** (*Beschreibung Tangentialraum und Normalraum*) Sei  $X \subset \mathbb{R}^N$  eine Untermannigfaltigkeit der Dimension  $L$ . Sei  $p \in X$  und  $W \subset \mathbb{R}^N$  offen mit

$$p \in X \cap W = \mathcal{N}(g) = \mathcal{G}(f) = \text{Bild}(F),$$

wobei  $U \subset \mathbb{R}^L$ , offen,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{N-L}$  stetig diffbar,  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^N$ ,  $F(x) = (x, f(x))$ ,  $g : W \rightarrow \mathbb{R}^{N-L}$ , stetig diffbar und regulaer. Dann gilt

$$T_p X = \text{Ker} Dg(p) = \text{Bild} DF(p_0)$$

fuer  $p = F(p_0) = (p_0, F(p_0))$ . Insbesondere gilt

$$T_p X = \bigcap_{j=1}^{N-L} \{\nabla g_j(p)\}^\perp, \quad N_p X = \text{Lin}\{\nabla g_j(p) : j = 1, \dots, N-L\}$$

sowie  $\dim T_p X = L$ ,  $\dim N_p X = N - L$ .

**Bemerkung.**

- Es zeigt  $\nabla g_i$  in Richtung des staerksten Wachstum von  $g_i$ . In Richtung von  $T_p X$  gibt es umgekehrt kein Wachstum der  $g_i$  (da Nullstellenmenge). Daher ist der Normalraum gerade durch die Gradienten der  $g_i$  aufgespannt. **Zeichnung.**
- Der Satz zeigt, dass  $T_p X$  ein Unterraum ist.

*Beweis.*  $T_p X \subset \text{Ker} Dg$ : Sei  $v \in T_p X$  beliebig und  $\gamma$  zugehoerige Kurve d.h.  $\gamma : (-1, 1) \rightarrow X$ ,  $\gamma(0) = p$ ,  $\gamma'(0) = v$ . Dann gilt  $g \circ \gamma \equiv 0$  also

$$0 = (g \circ \gamma)'(0) = Dg(\gamma(0))\gamma'(0) = Dg(p)v.$$

$\text{Bild} DF \subset T_p X$ : Sei  $w \in \mathbb{R}^L$  beliebig,  $\gamma : (-1, 1) \rightarrow X$ ,  $\gamma(t) = F(p_0 + tw)$ . Dann gilt

$$DF(p_0)w = \gamma'(0) \in T_p X.$$

Damit folgt die Aussage.

Insgesamt zeigt dies

$$\text{Bild} DF(p_0) \subset T_p X \subset \text{Ker} Dg(p).$$

Weiterhin gilt:

$$\dim \text{Ker} D(g) = L$$

(nach Dimensionsformel  $N = \dim \text{Ker} Dg + \dim \text{Bild} Dg$  und  $g$  regulaer also  $\dim \text{Bild} Dg = N - L$ )

$$\text{Rang} \text{Bild} DF(p_0) = L$$

(klar, betrachte Ableitung). Damit folgt dann

$$\text{Bild} DF(p_0) = T_p X = \text{Ker} Dg(p).$$

$T_p X = \bigcap_{j=1}^{N-L} \{\nabla g_j(p)\}^\perp$ : Das folgt sofort aus  $T_p X = \text{Ker} Dg(p)$ .

$N_p X = \text{Lin}\{\nabla g_j(p) : j = 1, \dots, N - L\}$ : Es gilt

$$\text{Lin}\{\nabla g_j(p) : j = 1, \dots, N - L\}^\perp = \bigcap_{j=1}^{N-L} \{\nabla g_j(p)\}^\perp = T_p X.$$

Damit folgt dann durch Bilden des orthogonalen Komplementes die Aussage.  $\square$

**Bemerkung/Achtung.** Die Gleichheit  $T_p X = \text{Ker} Dg = \text{Bild} DF$  ist gerade eine linearisierte Version von  $X = \text{Ker}(g) = \text{Bild} F$ . Aehnlich ist  $Df(x)$  eine linearisierte Version von  $f$ . Tatsaechlich kann man fuer  $f : U \subset \mathbb{R}^N \rightarrow V \subset \mathbb{R}^M$  die Ableitung  $Df(x)$  deuten als eine Abbildung des Tangentialraumes  $\mathbb{R}^N = T_x U$  in den Tangentialraum  $\mathbb{R}^M = T_{f(x)} V$ .

Betrachtung von Untermannigfaltigkeiten ist in vielerlei Hinsicht nuetzlich. Wir lernen jetzt eine Anwendung auf sogenannte bedingte Extrema kennen. Diese ist unter dem Namen 'Methode der Lagrange Multiplikatoren' bekannt.

**DEFINITION.** Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $X \subset U$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $p \in X$ . Es nimmt  $f$  in  $p$  ein bedingtes lokales Maximum / Minimum auf  $X$  an, wenn ein  $\delta > 0$  existiert mit

$$f(x) \leq f(p) / f(x) \geq f(p)$$

fuer alle  $x \in M$  mit  $|x - p| \leq \delta$ .

Da  $X$  i.a. nicht offen ist, koennen die bisher entwickelten Methoden zur Untersuchung von bedingten Extrema nicht angewendet werden. Wir untersuchen nun den Fall, dass  $X$  eine Nullstellenmenge ist.

**THEOREM.** Seien  $K \leq N$  aus  $\mathbb{N}$  gegeben. Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $g : U \rightarrow \mathbb{R}^K$  stetig diffbar,  $L := N - K$ , (d.h.  $K = N - L$ )

$$X := \mathcal{N}(g) = \bigcap_{i=1}^K \mathcal{N}(g_i).$$

Sei  $p$  ein regulaerer Punkt von  $g$  also  $\text{rang} Dg(p) = K$  (d.h.  $\nabla g_i(p)$ ,  $i = 1, \dots, K$ , linear unabhaengig). Sei  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diffbar. Hat  $f$  in  $p$  ein bedingtes lokales Extremum auf  $X$ , so gibt es reelle Zahlen  $\lambda_1, \dots, \lambda_K$  mit

$$\nabla f(p) = \sum_{j=1}^K \lambda_j \nabla g_j(p).$$

Ist insbesondere  $X$  ein Untermannigfaltigkeit (d.h. jeder Punkt von  $X$  ist regulaer), so gilt  $\nabla f(p) \in N_p X = T_p X^\perp$ .

**Interpretation. Zeichnung.** Haette  $\nabla f(p)$  eine Komponente in Richtung von  $T_p X$  so koennte man auf  $X$  in dieser Richtung  $e$  wandern und dabei den Wert von  $f$  wegen

$$\partial_e f(p) = \langle \nabla f(p), e \rangle$$

vergroessern und durch Wandern in Gegenrichtung verkleinern. In einem Extremum kann also  $\nabla f(p)$  keine Komponente in Richtung von  $T_p X$  haben, muss also in  $N_p X$  liegen. Es ist aber  $N_p X$  die lineare Huelle der Gradienten der  $g_i$  (nach dem vorigen Satz).

*Beweis.* Ohne Einschraenkung ist  $X$  UMK (sonst Verkleinern). Ist  $\gamma : (-\varepsilon, +\varepsilon) \rightarrow X$  eine stetig diffbare Kurve in  $X$  mit  $\gamma(0) = p$ , so hat

$$h : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}, h(t) = f(\gamma(t))$$

in 0 ein lokales Extremum. Daher muss gelten (**Zeichnung.**)

$$0 = h'(0) = \langle \nabla f(p), \gamma'(0) \rangle.$$

Da  $\gamma$  beliebige Kurve in  $X$  durch  $p$  war, folgt  $\nabla f(p) \perp T_p X$ , also  $\nabla f(p) \in N_p X$ . Nach dem vorangehenden Satz folgt die Aussage.  $\square$

**Verfahren/Methode der Lagrange Multiplikatoren.** Um die Punkte zu finden, in denen *moeglicherweise* Extrema vorliegen, hat man das Gleichungssystem (\*)

$$g_j(p) = 0, j = 1, \dots, K, \quad (K - \text{Gleichungen})$$

$$\nabla f(p) = \sum_{j=1}^K \lambda_j \nabla g_j(x) \quad (N - \text{Gleichungen})$$

nach  $p = (p_1, \dots, p_N)$  und  $(\lambda_1, \dots, \lambda_K)$  aufzuloesen. Das sind  $K + N$  Gleichungen und  $K + N$  Unbekannte.

**Bemerkung.** Man erhaelt das Gleichungssystem (\*) auch durch Betrachten von

$$F : U \times \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x, \lambda_1, \dots, \lambda_K) = f(x) - \sum_{j=1}^K \lambda_j g_j(x)$$

und Bilden des Gradienten

$$\nabla F(p, \lambda) = (\nabla f(p) - \sum_{j=1}^K \lambda_j \nabla g_j(p), g_1(p), \dots, g_K(p))$$

und Nullsetzen des Gradienten. Das ist unter dem Stichwort 'Ankoppeln der Nebenbedingungen' bekannt. Die sich ergebenden  $\lambda_j$  heissen Lagrangemultiplikatoren. In Beispielen koennen sie eine konkrete Interpretation haben (Zwangskraefte, Schattenpreise....).

**Bemerkung.** Die gesuchte Menge der bedingten Extrema und die berechnete Menge, in der (\*) gilt, koennen sehr verschieden sein: Seien

$$M_1 := \{\text{Extrempunkt von } f \text{ auf } X\}.$$

$$M_2 := \{\text{Extrempunkt von } f \text{ auf } X, \text{ in denen } Dg \text{ vollen Rang hat}\}.$$

$$M_3 := \{x \in X : (*)\}.$$

Dann gilt

$$M_1 \supset M_2 \subset M_3.$$

Es gilt:

- $M_1$  nicht leer, falls  $X$  kompakt.
- Erste Inklusion ist Gleichheit, falls  $Dg$  ueberall auf  $X$  vollen Rang hat, also  $X$  eine Untermannigfaltigkeit ist.
- Es koennen in  $M_3$  Punkte dazukommen.

**FOLGERUNG.** Sei  $U \subset \mathbb{R}^N$  offen,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diffbar und  $X \subset U$  eine kompakte Untermannigfaltigkeit. Dann nimmt  $f$  sein Maximum/Minimum auf  $X$  an und zwar in denjenigen Punkten von

$$\{p \in X : \nabla f(p) \in N_p X\}$$

in denen es maximalen / minimalen Funktionswert hat.

**Beispiel.**  $U = \mathbb{R}^2$ ,  $g(\xi_1, \xi_2) = \xi_1^2 + \xi_2^2 - 1$ ,  $X = \mathcal{N}(g) = S$ . Gesucht Extrema von  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \xi_1 + 2\xi_2$  auf  $X$ .

Da  $f$  stetig und  $X$  kompakt ist, nimmt  $f$  auf  $X$  auf jeden Fall Minimum und Maximum an. Wir berechnen nun Gradienten von  $f$  und  $g$ . Es gilt

$$\nabla f(x) = (1, 2)^t, \quad \nabla g(x) = 2(\xi_1, \xi_2)^t.$$

Insbesondere gilt  $\nabla g \neq 0$  auf ganz  $X$  und  $X$  ist eine UMK. Auflösen von (\*) liefert dann die Extrempunkte von  $f$  auf  $M$  (und moeglicherweise noch mehr Punkte). Es wird (\*) zu

$$\xi_1^2 + \xi_2^2 - 1 = 0 \quad (1, 2) - \lambda 2(\xi_1, \xi_2) = 0.$$

Auflösen liefert (nach endlicher Rechnung):

$$\lambda = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad (\xi_1, \xi_2) = \pm \left( \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right).$$

Es gilt  $f(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}) = 3/\sqrt{5}$  (Maximum) und  $f(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}) = -3/\sqrt{5}$  (Minimum).

## Etwas Integrationstheorie

Das Riemann-Integral weist eine Reihe von Problemen auf. In diesem Abschnitt lernen wir eine allgemeine Theorie der Integration kennen, die diese Probleme (groestenteils) umgeht. Grundobjekte sind (Prae)Masse und Integrale von Elementarfunktionen. Diese werden dann durch einen Vervollstaendigungsprozess zu Massen und Integralen von (messbaren) Funktionen fortgesetzt.

Genauer ist die Idee ist folgende: Sei eine Menge  $X$  gegeben.

- Ordne (geeigneten) Teilmengen  $A$  von  $X$  ein Volumen / Mass  $\mu(A)$  zu.
- Definiere Integral auf Elementarfunktionen  $f = \sum c_i 1_{A_i}$  durch  $\int f d\mu := \sum c_i \mu(A_i)$ .
- Setze fort. (Hier ist Arbeit zu leisten!)

### Probleme des Riemann-Integrals

Das Riemann-Integral weist eine Reihe von Problemen auf. Dazu gehoeren folgende:

- Viele 'schoene' Funktionen sind nicht Riemann-integrierbar. Beispiel:  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $f(x) = 0$  fuer  $x$  irrational und  $f(x) = 1$  fuer  $x$  rational. Dann ist  $f$  ueberall 0 bis auf eine abzaehlbare Menge.
- Das Riemann-Intgral ist nicht gut vertraeglich mit Grenzwerten. Es ist - im wesentlichen - nur vertraeglich mit gleichmaessiger Konvergenz. Beispiel: Sei  $\{q_n : n \in \mathbb{N}\}$  eine Abzaehlung von  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ . Sei  $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $f_n(x) = 1$  fuer  $x \in \{q_1, \dots, q_n\}$ ,  $f_n(x) = 0$  sonst. Dann ist  $(f_n)$  gleichmaessig beschaenkt, jedes  $f_n$  ist Riemann-intbar mit  $\int f_n dx = 0$ , es konvergiert  $(f_n)$  gegen  $f$  (aus dem vorigen Punkt) punktweise und  $f$  ist nicht Riemann-intbar.
- Das Riemann-Integral ist nicht stabil unter Substitutionen. Beispiel: Sei  $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$  und  $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . Sei  $f = 1_{(-\pi/2, \pi/2)}$ . Dann ist  $f$  Riemann-intbar auf  $\mathbb{R}$ , aber die aus der Substitution entstehende Funktion  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = f \circ \arctan \cdot \frac{1}{1+x^2}$  ist nur uneigentlich Riemann-intbar.



**Bemerkung.** Diese Nachteile werden in einer Dimension durch den grossen Vorteil des Riemann-Integral, die Gültigkeit des HDI, ausgeglichen. In höheren Dimensionen trifft das nicht mehr zu.

### 1. Prämaße

**DEFINITION.** Sei  $X$  eine Menge. Eine Familie  $\mathcal{R}$  von Teilmengen von  $X$  heisst Mengenring auf  $X$ , wenn gilt:

- (R1) Die leere Menge  $\emptyset$  gehoert zu  $\mathcal{R}$ .
- (R2) Mit  $A, B$  in  $\mathcal{R}$  gehoert auch  $A \cup B$  zu  $\mathcal{R}$ .
- (R3) Mit  $A, B$  in  $\mathcal{R}$  gehoert auch  $A \setminus B$  zu  $\mathcal{R}$ .

Dann schreibt man auch  $(X, \mathcal{R})$  fuer den Mengenring ueber  $X$ .

**FOLGERUNG.** Sei  $\mathcal{R}$  ein Mengenring ueber  $X$  und seien  $A, B$  in  $\mathcal{R}$ . Dann gehoert auch  $A \cap B$  zu  $\mathcal{R}$ .

*Beweis.* Es gilt  $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$ . □

**Beispiele.**

- Sei  $X$  eine beliebige Menge. Dann bildet die Menge der endlichen Teilmengen von  $X$  einen Mengenring.
- Sei  $X = \mathbb{R}$ . Dann bilden die Figuren d.h. die Vereinigungen von endlich vielen beschränkten Intervallen einen Mengenring.
- Sei  $X = \mathbb{R}^n$ . Dann bilden die Figuren d.h. die Vereinigungen von endlich vielen achsenparallelen Quadern einen Mengenring. (Es ist  $Q$  ein achsenparalleler Quader, wenn gilt  $Q = I_1 \times \dots \times I_N$  mit Intervallen  $I_j$ .)

**DEFINITION.** Sei  $\mathcal{R}$  ein Mengenring auf  $X$ . Eine Funktion  $\mu : \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty)$  heisst Praemass auf  $(X, \mathcal{R})$ , wenn gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \quad (\sigma\text{-Additivitaet})$$

fuer alle Folgen  $(A_n)$  in  $\mathcal{R}$  mit

- $A_n \cap A_m = \emptyset$  fuer alle  $n \neq m$  (' $A_n$  paarweise disjunkt')
- $\bigcup A_n \in \mathcal{R}$  (Nicht selbstverstaendlich)

**FOLGERUNG.** Sei  $\mu$  Praemass auf  $(X, \mathcal{R})$ . Dann gilt

- $\mu(\emptyset) = 0$
- $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$  fuer alle  $A, B$  aus  $\mathcal{R}$  mit  $A \cap B = \emptyset$ .

*Beweis.* Es gilt  $\emptyset = \bigcup_n \emptyset$ . Damit folgt aus der  $\sigma$ -Additivitaet

$$\mu(\emptyset) = \sum_n \mu(\emptyset).$$

Damit folgt  $\mu(\emptyset) = 0$ . Nun folgt die zweite Aussage leicht, indem man die Mengen  $A_j$  definiert durch

$$A_1 := A, A_2 := B, A_n := \emptyset, \quad n \geq 2$$

und aus der  $\sigma$ -Additivitaet schliesst

$$\mu(A \cup B) = \mu(\cup A_j) = \sum \mu(A_j) = \mu(A_1) + \mu(A_2) + 0 = \mu(A) + \mu(B).$$

Das beendet den Beweis.  $\square$

### Beispiele.

- Sei  $X$  eine beliebige Menge und  $\mathcal{R}$  der Mengenring der endlichen Teilmengen von  $X$ . Dann ist

$$\mu : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{N}_0, \mu(A) := \text{Anzahl der Elemente von } A$$

ein Praemass. Es heisst das Zaehlpraemass.

- Sei  $X = \mathbb{R}$  und  $\mathcal{R}$  der Mengenring der Figuren (d.h. der Vereinigungen von endlich vielen beschraenkten Intervallen). Fuer ein beliebiges Intervall  $I$  mit  $(a, b) \subset I \subset [a, b]$  definiert man die Intervalllaenge  $|I|$  durch

$$|I| = b - a.$$

Es laesst sich nun jedes  $A$  aus dem Mengenring als disjunkte endliche Vereinigung  $A = \cup_{j=1}^n A_j$  von beschraenkten Intervallen schreiben und durch

$$\lambda : \mathcal{R} \longrightarrow [0, \infty), \lambda(A) := \sum_{j=1}^n |A_j|$$

wird ein Praemass auf  $\mathcal{R}$  definiert (Uebung). Dieses heisst das Lebesguepraemass auf  $\mathbb{R}$ .

- Sei  $X = \mathbb{R}$  und  $\mathcal{R}$  der Mengenring der Figuren (d.h. der Vereinigungen von endlich vielen beschraenkten Intervallen). Sei  $\phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  eine nichtfallende, rechtssetige Funktion. Setze

$$\phi(x+) := \lim_{y \rightarrow x+} \phi(y) = \phi(x), \phi(x-) := \lim_{y \rightarrow x-} \phi(y).$$

Definiere nun fuer ein Intervall  $I$

$$\mu(]a, b[) = \phi(b-) - \phi(a)$$

$$\mu(]a, b]) = \phi(b) - \phi(a)$$

$$\mu([a, b[) = \phi(b-) - \phi(a-)$$

$$\mu([a, b]) = \phi(b) - \phi(a-).$$

(d.h. es wird [ uebersetzt in  $-$  und  $]$  in  $+$ ).

Es laesst sich nun jedes  $A$  aus dem Mengenring als disjunkte endliche Vereinigung  $A = \cup_{j=1}^n A_j$  von beschraenkten Intervallen schreiben und durch

$$\mu = \mu_\phi : \mathcal{R} \longrightarrow [0, \infty), \mu(A) := \sum_{j=1}^n \mu(A_j)$$

wird ein Praemass auf  $\mathcal{R}$  definiert (Uebung). Es heisst das Stieltjes-Praemass zu  $\phi$ .

Bemerkung: Setzt man  $\phi = id$ , so erhaelt man gerade das Lebesguepraemass.

- Sei  $X = \mathbb{R}^N$  und  $\mathcal{R}$  der Mengenring der Figuren (d.h. der Vereinigungen von endlich vielen achsenparallelen Quadern). Fuer einen Quader  $I$  mit

$$(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_N, b_N) \subset I \subset [a_1, b_1] \times \cdots [a_N, b_N]$$

sei

$$|I| := \prod_{j=1}^N (b_j - a_j).$$

Es laesst sich nun jede Figur  $A$  in disjunkte Quader zerlegen  $A = \cup_{j=1}^n I_j$  und durch

$$\lambda : \mathcal{R} \longrightarrow [0, \infty), \lambda(A) = \sum_{j=1}^n |I_j|$$

wird ein Praemass auf  $\mathcal{R}$  definiert. Dieses heisst das Lebesguepraemass auf  $\mathbb{R}^N$ .

## 2. Integrale von Elementarfunktionen

### 3. Integrale

### 4. Die großen Saetze